

疫痧二症合編卷之三

松江李林馥啟賢氏重校

諸城劉奎松峯著輯

男劉秉錦濯西纂述

福山劉嗣宗南瑛參校

雜疫

葡萄疫

小兒多患此症。以受四時不正之氣。鬱於皮膚。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在遍體頭面。乃為痧症。和毒傳胃。牙根出血。久則必至腐損。初起宜服羚羊角散。清熱涼血。久則胃脾湯。滋益其內。又有牙根腐爛者。人中白散。

加羚羊角散 此方銀花羌活僵蠶生地皆可酌入。

羚羊角末

防風

麥冬 去心

元參

知母 酒炒

黃芩

牛蒡子 炒研

甘

草節 金銀花

淡竹葉十餘片煎服。

胃脾湯

此湯必實有不足之症方可用。初起切勿輕投。

白朮土炒

茯神

陳皮

遠志 去心

麥冬 去心

沙參

五味子 研

甘草

節

虛弱自汗者去沙參加參芪。

人中白散

治小兒走馬牙疳。牙齦腐爛黑臭。

人中白

尿壺中白鹽煨一兩

兒茶 五錢

黃柏

薄荷

青黛 各三錢

冰片

五釐

共

為細末先用溫湯漱淨。吹藥於疳上。日六七次。吹藥涎從外流者吉。內收者凶。

捻頸瘟

其症喉痺失音頸大腹脹如蝦蟆者是也宜荆防敗毒散
荆防敗毒散

荆芥 防風 羌活 獨活 前胡 桔梗 柴胡 枳殼 麩炒

茯苓 人參 甘草 薑蔥煎食遠服發冷倍用蔥

蝦蟆瘟

其症咽喉腫痛涕唾稠粘甚則往來寒熱身痛拘急大便秘結有類傷寒亦與捻頸
瘟相似但以不腹脹為異治法涼散和解攻下敗毒隨症施治無不獲愈方俱散見
各醫書本門不多贅其治療捷法於初起時用手在病人兩臂自肩項極力將其中
凝滯癘氣惡血趕至手腕數次用帶子將手腕扎住不令惡血走散用針刺少商穴
并十指近甲蓋薄肉正中處捻出惡血則愈少商穴在大指外邊以面
患處口啣鹽水用力吮啞俟其皮色紅紫成片則愈或用針將項下一挑手捻針孔
出血密密挑捻愈

大頭瘟外科門亦此症有陰陽有可汗不可汗者

其症發於頭上并腦後項腮頰與目赤腫而痛發熱症似傷寒治療散見各醫書本
門茲不多贅用前刺法亦妙



大力子丸 兼治啞瘡

元參 連翹去隔 甘草 桔梗 川大黃生熟 石膏蝦研 川連酒炒

荊芥 防風 羌活 大力子研 為末作丸或姜煎服亦可。

又方 蠶蠶二兩 大黃二兩 薑汁丸彈子大蜜水和服一丸。

又方 普濟消毒散 見醫方集解專治大頭瘟初起。

又方 大頭瘟生疔瘡及喉閉並將疔瘡刺出血即愈。

瓜瓢瘟

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲

生犀飲

黃土五錢 犀角二錢 蒼朮油浸 川連 芥山茶一撮 流水煎入金汁和

服日三夜二虛加人參鹽水炒 大便結加大黃 渴加花粉 表熱去蒼朮黃

土加桂枝性熱加別解表宜當 便膿血去蒼朮倍黃土加黃柏使便滑人中黃代金汁。

楊梅瘟 形似楊梅

其症偏身紫皰忽發出徽倉者是也用清熱解毒湯下人中黃丸并刺破出血徽音

著濕 變色。

清熱解毒湯

芥音介 山名鏐 音滂削 也

瓢音羊 瓜中實



南京中醫藥大學

南京中醫藥大學圖書館

川連酒洗 黃芩酒洗 生地 白芍酒洗 石膏研服 知母鹽酒炒 人參 甘草 升

麻 葛根 羌活 日三服夜二服薑煎

人中黃丸

大黃三兩浸 蒼朮油炒 桔梗 滑石各一兩 人參 川連酒洗 防風各五錢 香附

兩半薑汁浸生用 人中黃二兩如無坑垢代之 神麴糊為丸清熱解毒湯送 如氣虛用四君

子湯送 如血虛四物湯送 痰甚二陳湯送 熱甚童便送

錦按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛邪也

疔瘡瘟

其症發硃如熅偏身流走旦發夕死三稜針刺入委中三分出血並服人中黃散中

穴在兩腿屈盤當中對膝蓋

人中黃散

人中黃 一兩 明雄 硃砂各一兩共為末薄荷桔梗湯下二錢日三夜二

消毒丸 治時疫疔瘡惡症

大黃 牡蠣煨 僵蠶泡法 各一兩

共為末煉蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

軟腳瘟



焮音翠
燒也

硝礬多
而明雄
太少宜
五錢訛
作五分
耶

其症便清泄白。足腫難移。即濕宜蒼朮白虎湯。即白虎湯加蒼朮

絞腸瘟

其症腸鳴乾嘔。或水瀉。氣不通則探吐之。宜雙解散。有陰陽二症。

陰痧 腹痛。手足冷。身上有紅點。用燈草蘸油點著。將紅點焮之。

陽痧 腹痛。手

足暖。以針刺少商穴。並十指尖近甲處。刺法見前。此刺法治諸中霍亂咽喉等病俱效。

陰陽水方。滾水盃一。冷水盃一。對服立愈。或加白鹽少許妙。

觀音救苦丹。磨點眼角二三次。兼治咽喉之症。含麥大一碗化咽一切腫毒惡瘡蛇蝎傷津研擦患處。

火硝兩一 白礬兩四 黃丹兩二 硃砂明確各五。以上二方兼治陰陽二痧。

共細研勻化開。候稍冷。搓成小錠。磁器收貯。聽用。氣出

地漿 於南牆背陰處掘一坑。入涼水一罐。繳之。再候澄清。取飲。

又方 生明礬錢末二 冷水滾水各半盃調服。

又方 萊菔片二 水二三桶熬湯。以甕貯之。令病人澆洗。稍冷。全身入甕中泡透。或

稍愈。且毋遽出效。

雙解散。即防風通聖散。去麻黃加桂枝。澁瀉加薑製半夏。

防風 荆芥 薄荷 麻黃 白朮土炒 川芎酒洗 當歸酒洗 白芍酒炒 連翹

隔去 山梔炒 黃芩 石膏煨 桔梗 甘草 滑石末 芒硝 大黃生熟



醫方集解之雙解散。減去硝黃。引用生薑葱煎。以上四方。專治陽痧。

鷓鴣瘟

其症兩腮腫脹。憎寒惡熱。外用亦小。蓋柏葉共搗爛。水醋調敷。內用薄荷濃煎湯服之。

龍鬚瘟

其症喉硬。舌強。並牽耳中。急以針刺喉上橫七針。豎七針。硃砂不拘多少蜜一匙。入燒酒和勻灌之。

羊頭瘟

其症昏沈不食。用芋頭燒灰存性研。黃酒送下。

蟹子瘟

其症喉痛發熱。惡心。痛連腮頰。頭亦痛。喉旁有疙瘩四散。紅絲如蟹爪。壓舌針挑之。要挑爪不可挑頂。每爪上挑一針。令血出。旋以硃砂末搽之。再含咽醋少許。即愈。如刺當中頂。即為傷蟹蓋。必出膿不食而危。

版腸瘟

刮出紫疙瘩六個。即難治。其症初發。如傷寒熱病。三四日小腹脹滿。不治數日即死用麻一縷。如指粗先自兩肩頭刮至手腕。刮出紫疙瘩。針刺破。擠去惡血。又自兩大腿跟刮至兩足跟。有紫疙瘩。刺破去。

惡血俱男先左又自咽窩刮至臍下刺法如前即時汗愈。

脇痛瘟一名結肋瘟甚惡不治數日即死

其症但脇肋痛羅白切片蘸燒酒刮痛處出痧即愈未愈用豆油一大盃銅杓熬三分之一服之愈又法青布包黑磐蘸燒酒刮痧又法烙香油厚餅盤口太來熱熱痛處冷即易可用三四餅餅棄勿食忌生冷

刺蜚瘟痧

其症壯熱煩悶偏身痛如蜚刺所傷俗名蜚刺瘟以痧治之林月溪患時疫壯熱口渴胸腹迷悶手摩之如蜚刺傷痛偏體皆然因放腿灣痧二十餘針毒血成流用山甲天蟲角刺加活血順氣藥稍飲之而痊

地前瘟痧

刺法見
上瘟痧

天蟲即
僵蠶角
刺即見

發音茅
俗作家
貓

暑熱時疫惡毒之氣攻於裏則為痰喘為血瘀昏迷沈重不省人事若元氣壯實內

不受邪不入於裏即散其毒於肌膚血肉之表為腫為脹忌飲熱湯熱酒刺腿灣痧

筋並十指出毒血內服寶花散治痧鬱金一錢細辛三錢降香三錢荊芥四錢共為細末清

茶調三匙冷服○桃仁紅花湯治血結治血桃仁去皮紅花蘇木各一錢青皮八分烏藥四分獨活

白蔞一錢二錢二分水煎服紫樸湯治痧有食厚朴姜汁山查蘭子研三棱莪朮枳

實煨連翹隔青皮陳皮細辛等分水煎冷服

上海千頃堂書局

手足麻溫

其症先少腹痛作羊毛疔挑之無血隨作紫疙瘩手足麻麻至不知人而死急令以足踏病者手之三關脈上男踏左手女踏右手用力踏勿放直待四肢不麻病人自覺心頭發火方放之自愈若放之早雖愈後亦纏滯三關脈即兩手廿口診脈處

扣頸瘟

此症仕宦幕友不可不知倘遇患此死者而顧歎言為人所偏執可乎可補洗冤錄一則

聞之老醫臧枚吉云余少時聞先祖言凡人無故自縊者為扣頸瘟伊時未解詳問及後偏閱方書正無此說辛巳年一人來言其鄉有一婦人平日家道充裕子女成立夫婦和諧忽一日無故自縊幾死救之始免詢之毫無所為惟日鬱鬱不樂臧緘袖中無人處即自縊羅守月餘飲食言動如常述此求治余因憶少時所聞細繹其或是血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏不結於脇下而結於手足厥陰及手太陰之三藏合病者內經曰臆中者臣使老官喜樂出焉今病則憂戚可知刺瘡論曰厥陰之瘡意恐懼腹中悒悒又肝瘡者善太息其狀瘴狂又肺瘡者善驚如有所見瘡如此疫可類推因處一方用香附鬱金雄黃為丸氣湯開臆中之鬱再加二陳以開膈中之痰更加羌活細辛溫肝逐風鬼箭羽丹參赤小豈以通心包兼泄火邪生薑煎服服後竟頭痛發熱身痛瘟疫症悉具自出其袖中之繩云誰納我乎告以自縊茫不記憶寢疾七日又服發汗藥而解始知此症亦係疫癘或百合病之類乎

按既云疫癘之疾。何不投火赴水刎頸。而必欲自縊乎。意或太陰邪氣傳厥陰。而風木太過者。故不思金及水。而獨喜木也。緣肺金藏魄。肝木藏魂。脾土藏意。智。而心君藏神。為一身之主。包絡實為臣使。代心君行令。而主喜樂。今手厥陰包絡先病。臣使失其喜樂之職。以擾心君之神明。君火不生。土傳足太陰脾。而意智不清。土不生金。因傳手太陰肺。而悲憂。金不平木。因傳足厥陰肝。而鬱怒。肺金承所不勝。而木寡於畏。故風木太過。且肝之魂。挾肺之魄。不安於舍。出而為祟。故喜木而自縊也。非有祟憑之。乃魂魄意智之厲也。或蘇合丸。牛黃清心丸。當亦可用。惜非診其脈色何如也。此症原名扣頸傷寒。然與寒疾大無涉。故改名瘟疫。而名實俱當也。

狼搗翻有二種

其初喉痛。旋氣不通。殺人甚速。對直虎耳尖。照耳輪邊。用磁鋒刺出血。即愈。徐樂然傳
又一種心中不安。旋不能言。牙關緊閉。不醒人事。身冷出涼汗。以手試其兩頰下。有斜出一硬物。碍手便是。竹箸搥開口。入指探喉兩旁。有物如麥大。有單有雙。並搗破出血。初病血鮮。久病血紫。立愈。指頂先用鹽擦。

虫蛇翻小兒多患此

兩目紅腫。鼻流涕。日夜啼號。以針密刺太陽穴。兩眉尖後如指甲大一塊立愈。刺後以羊

頭搗爛數印堂至五根

椅子翻

不語不食形如呆癡用椅子圈手擎處削下木片煎服愈。

扁担翻

發即兩肋撐脹難忍用扁担肩挑處削下木片煎服愈。

王瓜翻

兩脇形如王瓜脹痛用針自咽喉挑起從上而下密挑至臍上橫挑兩肋挑至腰脊骨而上隨挑隨愈初挑無血漸挑即有血挑至腰脊對頭即愈不然再發不救

遠臍翻

一名沙莒父岳廷臣傳

其症先繞臍痛漸痛至滿腹旋氣塞胃脇兩肋脹滿冲咽喉氣不通不省人事不急治即死先以針挑兩耳尖次挑結喉下咽窩兩骨尖次挑背後肩膊骨下兩骨尖並令出血立愈。

白眼翻

其症唯翻白眼頂門灸三艾如不愈再灸三艾即愈。

疔瘡翻

其症先寒後熱渾身發疔瘡赤紫黑色漸至大惡寒發熱不治即死宜參連散。



中國醫藥大學圖書館藏

參連散

人參 黃連共為細末等分麝香 冰片各少許 四味再共研。黃酒調服外以透骨草黃

龍尾連一名黃連煎水洗之。松峯曰。一名紫疙瘡。與前疙瘡瘟症治迥異。

麻雀掙

其症背脊腫痛。小腹脹滿。見食即嘔。心中跳躍。挑兩大腿腋見血即愈。

鴉子掙

其症眼腫。渾身青紫。兩脅攻心。句似有落字大小便不通。男挑龜頭。女挑雞冠。陰戶出血

即愈。

烏沙掙

其症兩脇脹。胃口痛甚。隨將病者手腕趕捻。視有紫疙瘡者。即此症也。治用大針。將手腕重刺一針。起針時若見紫血噴出。沙脹隨消。忌食白飯菜豈。

黃鷹掙

其症肚腹攪痛。翻上翻下。治法從臍臍上趕下。內中氣血。用帶子將兩手腕扎住。各指稍抱甲肉上。當中刺一針。捻出惡血即愈。

羊毛掙

一法用青布蘸燒酒偏身擦。黃蒿水薰洗。亦可汗。又法用手推背上二筋撮起。指緊時許。

其症發熱無汗。心內發熱。口乾嘔吐。前後心毛孔周圍高阜。錯疑有紫色三四處即

疫痧二症合編

卷三 雜疫

上海千頃堂書局

此症也。治用針挑前後心。挑患處。將羊毛剔淨。蒙被出汗即愈。如不應。再用沙糖少許。生薑三片。武夷茶一撮。同煎服。忘腥冷月餘。無不效。

鵝鴒掙

其症渾身發燒。解裏衣。體熱不可當。心口一塊滾上滾下。挑肚臍並兩乳。即愈。

烏鴉掙

拘掙同此治法。

其症頭痛。頭沈。頭揚。惡心。眼黑。發搐。指甲先青。然後偏體皆青。上吐下瀉。不能言。小腹痛甚。至無脈。身涼。如不急治。頃刻殞命。牙關如閉。速用箸抖開口。令病人捲舌。親之根下。如有青紅紫泡。急用針刺。泡見血。用雄黃末點之。滾水和雄黃末飲之。或泡藥點之。亦好。被蓋頭出汗即愈。忌風二日。

兔兒掙

其症直走曠野。趨跳不寧。急用涼水和炮藥灌之。只許走治。不許坐治。或有用濕土埋其頭。使聞土氣即愈者。

長蛇掙

其症腹痛打滾。先挑肚腹三針。次頭頂一針。腳心三針。即愈。

纏絲掙

其症腹脹痛。頭痛心翻。一作頻前後心或有紫黃眼子。針破以醋擦之。如偏體麻木無

此痕者亦是此症。將臍膊腕眼腕青筋針出紫血。用炒鹽調滾水灌之。即愈。水令量三片亦可。

啞叭掙

其症不能言。用鞋底蘸凉水打頭頂門。如孕婦患此。將頂門髮分開。以手蘸凉水輕拍之。即愈。

母猪掙

其症以頭拱地打滾。先針舌根。次將兩手除大指不針。其餘八指。將包甲薄肉每刺一針。捻出惡血。再用猪槽水洗手腕。即愈。

老鼠掙

其症唇黑紫腫。咽喉紫痛。或膈膨脹。挑眉鬚角。鬚疑作髮見血即愈。或再挑兩肩中心。句疑有錯誤。

蝦蟆掙

其症腹脹滿。或疼痛。將肚臍周圍挑之。又挑小腹三四針。即愈。

海青掙

其症頭痛。搦頭打滾。用帶子札住頭。然後將眉際眼根。咽喉頂心各處挑之。即愈。忌風三日。眼根即大眼角。



眠羊掙

其症似睡。眉眼不開。轉身疼痛。發脹。喝氣疼痛。治法挑尾把骨根出血即愈。

野雀掙

其症渾身發紅。或前後心有紅黑紫眼。頭痛脇脹。挑腋下。
落用莧菜種煮水洗浴甚良。

髮一針而愈。

髮字上
下有落

狐狸掙

其症痛。或乾噦發嘔。不思飲食。頭仰。渾身出汗。張口亂
後心則愈。

窩燕前

其症

其症脇脹痛。心痛。翻起唇來。挑裏邊。挑唇上牙花即愈。

鷹嘴掙

其症肚脹。頭暈眼黑。心內脹。用白凡水灌之。再挑後心及耳稍。即愈。

又方胡椒
粒生薑七片

陳麥糠一撮同研爛
酒煎去渣調四錢服

松峯按諸掙挑刺。隨即將惡血捻出為妙。有病深重者。挑刺無血。必用手極力

捻之見血即愈。諸掙遇有口噤不開者。用烏梅揩擦牙齦。涎出即開。蓋酸先入筋。木能尅土。使牙關酸軟則開矣。若用鈇器等攪之。恐傷其齒。

右諸掙症治。余得之岱宗石壁間錄。而藏諸篋笥。遇患是疾者。如法施治。屢有奇效。後余游秦晉。於太行道中。亦見粘一紙於壁。前於見者。大同小意。俱變掙為翻。蓋因其方言各異耳。而症治則無殊也。因取而對較增訂之。以廣為流布。至其命名。亦各有義意。其毋以其涉俗而忽之。松峯再誌。

赤膈類傷寒

松峯曰。是皆疫症。實非傷寒也。

凡胸膈赤腫疼痛。頭痛身痛。發熱惡寒。名赤膈傷寒。宜荊防敗毒散。

見捻頭瘟加薑仁油。

黃連黃芩紫金皮元參赤芍升麻白芷。如症有表復有裏。而胸膈赤腫疼痛者。雙解散。見絞加薑仁黃連紫金皮。如表症已退。大便燥實。胸膈腫痛者。涼膈解毒。加薑仁枳殼桔梗紫金皮赤芍。又宜稜針刺腫處出血。如半表半裏。胸膈腫痛者。小柴胡湯加桔梗薑仁紫金皮赤芍。

涼膈散

連翹

去

大黃

酒浸

甘草

梔子

炒

黃芩

酒炒

薄荷

加竹葉生蜜煎。

黃耳類傷寒

凡耳中策策痛者。是風入腎經也。久則變惡寒發熱脊強背直。如瘰之狀。曰黃耳傷。

解之解
即此散
字之記

寒宜小續命湯加僵蠶焙天麻酒焙羌獨次用荆防敗毒散加細辛白芷蟬退去足黃

小續命湯

防風 桂枝 麻黃 杏仁炮去皮 川芎酒洗 白芍酒炒 人參 甘草 黃芩

酒 防己 附子製

解者肌肉解散。你者筋不束骨。其症似寒非寒。似熱非熱。四體骨節解散。懈墮。急

煩痛。飲食不美。食不知味。俗呼為砂病。內經名為解你。原其因。或傷酒中濕。感冒風寒。房事過多。婦人或經水不調。氣血不和。皆能為此。似砂病。實非砂病也。治宜先釀熱水。打其臂膊裏面。或以麻蘸水刮之。刮打必皆令其皮紅紫為度。更宜針刺十宣委中二穴出血。當服蘇香合丸。

蘇香合丸

麝香 沈香 丁香 檀香韻 香附 萆撥 白朮 訶子煨去核 硃砂 青

木香 烏犀角各二 薰陸香 龍腦各一 安息香二分 蘇合油入息

錢共為細末。用安息膏並煉蜜丸如彈子。蠟包。用時溫水化服一丸。丸用蠟包。不

砂病類傷寒



嶺南閩廣間。溪毒砂虱水弩射工。蝮短狐鰕鬚之類。俱能含砂射人。被其毒則憎寒壯熱。百體分解。似傷寒初發。土人治法。以手摩痛處。用角筒入肉。以口吸出其砂。盡外用大蒜煨搗膏。封貼瘡口。即愈。諸蟲唯鰕鬚最毒。其毒深入於骨。若鰕鬚之狀。其瘡類疔腫。不治必死。彼地有鸛鵒鵒等鳥。專食以上諸蟲。故以此鳥毛糞服之。交籠此鳥於身畔吸之。其砂聞氣自出而愈。

喉管傷寒

其症喉中作痒難過。吃茶酒湯水便不可救。

薄荷

麝香

為細末吹喉。待氣通吐涎。盡許。然後吃陳米湯半盞。即愈。

松峯按此雖名傷寒。實疫癘之類。夫曰喉痒。似病之輕者。曰難過。則痒不可當矣。雖然。何至吃茶水便不可救乎。觀其待氣通三字。則痒時其氣已有大不通者在矣。味其言。吐涎盡許。則氣之所以不通。涎為之也。此症甚惡。亦世之所不輕見者。

油痧瘴

其症兩脇脹滿。築心疼痛。或腹內攪腸作痛。頭暈眼黑。或大小便閉塞。氣不通暢。命在旦夕。將棉花子油與吃。試之。食之香甜。不油氣者。即是此症。速將棉花子油令病人吃足。或用至四五兩半斤一斤。立愈。仍將油吐出不少。奇方也。

