

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣



附骨疽在大腿外側漫腫大兩腿同

附骨疽圖



南京中醫藥大學圖書館版權所

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣目錄

股部

附骨疽

咬骨疽

股陰疽

橫痃疽

陰疽

伏兔疽



股陽疽

環跳疽

肚門癰

箕門癰

腿遊風

青腿牙疳

膝部

膝癰

疵疽



南京中医药大学图书馆版权所有

膝眼風

鶴膝風

下石疽

緩疽

委中毒

上水魚

人面瘡



御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣



附骨疽在大腿外側漫腫大兩腿同

附骨疽圖



咬 骨 疽 圖

咬骨疽在大腿裏側漫腫兩腿同



股部

附骨疽 咬骨疽

附骨大靨外側生在腿裏側咬骨名體虛寒濕
虛入寒熱往來不炊紅痛甚徹骨難屈轉寒濕化
熱腫胖形蒜灸起炮無炮逆潰後最忌敗漿膿

註

此二證生於大腿裏外外側屬足三陽經裏
側屬足三陰經附骨疽生於大腿外側咬骨
疽生於大腿裏側由體虛之人露臥風冷浴
後乘涼寒濕侵襲或房慾之後蓋覆單薄寒



邪乘虛入裏遂成斯疾初覺寒熱往來如同
感冒風邪隨後筋骨疼痛不熱不紅甚則
如錐刺筋骨不能屈伸動轉經久陰極生
寒鬱爲熱熱甚腐肉爲膿外形腫胖無頭皮
色如常漸透紅亮一點內膿已成凡治此證
初起寒熱往來覺痛時輕者卽服萬靈丹重
者服五積散加牛膝紅花痛處用雷火鍼鍼
之發汗散寒通行經絡膿成開之潰後餘治
俱按潰瘍門又有漫腫疼痛發於尻臀部位



者宜服內托羌活湯又有發於腿之裏側近
膝者屬足太陰脾足厥陰肝二經部位宜
內托黃耆湯又有發於腿外側者屬足小
膽經部位宜服內托酒煎湯又有發於腿之

正面者屬陽明胃經部位頭目昏眩嘔吐不
食胸膈不利心煩熱悶者宜服茯苓佐經湯
又有發於腿之裏側屬太陰脾經部位骨節
痠痛四肢拘急自汗短氣小水不利手足浮
腫者宜服附子六物湯又有發於腿之後面

屬足太陽膀胱經部位腿足攣痺關節重痛
憎寒發熱無汗惡寒或兼惡風頭痛者宜
麻黃佐經湯又有三陰不足外邪過盛大
通腫皮色不變疼痛日增不消不潰者此屬
虛寒骨冷急服大防風湯補虛逐寒日久消
之不應者勢欲作膿外用隔蒜片灸之起炮
艾爆有聲爲吉灸之無炮骨中不覺熱者屬
逆灸後宜服十全大補湯加牛膝羌活防己
或八珍湯加附子補托之膿成脹痛鍼之出



黏白膿爲順若出白漿水或豆汁者俱爲敗
漿終屬險候數證潰後內外治法亦俱按
疽潰瘍門以上之證皆由沉寒痼冷中來
敷內服不可用苦寒損脾泄氣等藥犯之必
至氣血冰凝內肉瘀腐日久化爲污水不治
之證也按準繩等書云傷寒汗後餘邪成流
注流注之壞證成附骨疽夫汗後流注易愈
惟失治乃爲壞證不能復生似不能變成附
骨疽况附骨疽係調治可愈之證若果數變



之後則壞而又壞矣又豈能復有成功乎是
流注壞證變成附骨之說存而不論可也

雷火神鍼

蘄艾 三錢

丁香 五分

麝香 二分

藥與艾揉和用夾紙一張將藥平鋪紙上用
力實捲如指粗大收貯臨用以紙七層平放
患處將鍼點着一頭對患向紙捺實待不痛
方起鍼病甚者再鍼一次七日後火瘡大發



其功甚效

方歌
雷火神鍼攻寒濕附骨疽痛鍼之宜丁腐

香共斲艾燃鍼痛處功效奇

內托黃耆湯

黃耆

鹽水拌炒

當歸

木瓜

連翹
去心

柴胡

各二錢

羌活

肉桂

生地

黃蘗

各五分



酒水各一鍾煎一鍾空心熱服

方歌內托黃耆歸木瓜羌柴翹桂地藥加疸生

股肝脾位酒水煎之服最佳

內托酒煎湯

當歸

黃耆 各二錢

柴胡 一錢五分

大力子

連翹 去心

肉桂 各一錢

升麻

黃蘗

甘草 各五分



南京中医药大学图书馆版权所有

酒水各一鍾煎一鍾食前服

方內托酒煎寒濕凝腿外少陽附骨生歸老

力柴翹桂升蘖甘加酒水靈

茯苓佐經湯

白茯苓

蒼朮

米泔水炒

陳皮

白朮

土炒

半夏

各一錢
製

厚朴

薑炒

木瓜

柴胡

藿香

澤瀉



葛根

甘草 各五分

生薑三片水二鍾煎八分食前服

方歌 茯苓佐經足陽明腿面燠疼煩熱乘平胃

瓜柴朮半藿瀉加薑葛引經

附子六物湯

附子

甘草 各二錢

防已

白朮 土炒

白茯苓 各八分

桂枝 五分

生薑三片水二鍾煎八分食遠服



方歌附子六物風寒濕流注脾經須服之四肢拘

急骨節痛防已朮甘苓桂枝

麻黃佐經湯

麻黃

蒼朮

米泔水浸炒

防風

防已

羌活

白茯苓

葛根

各一錢

桂心

甘草

生

細辛

各五分

生薑三片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食前

