

癰疽禁方錄

癰疽禁方錄序

武進曹禾

昔扁鵲受禁方於長桑君長桑君戒其無泄太倉公受禁方于公乘慶
公乘陽慶亦戒勿教人華陀臨死出書一卷而復索火燒之是禁方為
所吝惜而勿傳者也然扁鵲之弟子如陽厲治鍼石子豹治癰疽倉公之
門人若宋邑學五診高期王禹學故矣馮信學和齊湯法杜信學筋
脈五診唐安學五診經脈奇咳華陀弟子吳普依準陀療多所全
劑樊阿善鍼術是禁方未嘗不傳恐傳非其人不如不傳之為愈
也苟人可傳矣其材不能竟吾之所欲傳則教以一技之長以成其
量其力以成其志也蓋習禁方者未嘗不明經理不治經方故能決死生
可治扁鵲能飲藥三十日視見垣一方人始能出以治病盡見五藏癰
結太倉公盡去故方受脈書上下經五色診奇咳術揆度陰陽外變藥
論石神接陰陽禁書受讀解驗三年始能診決精良是經理不明雖
得禁方亦不足恃也經理既明雖無禁方亦足任以治病者貴能別
病之源流斯處療切當如宜療弄丸圓轉不息蒼鷹搏兔狡藏莫及
傷醫能諳習經理如復得禁方出而向也厥疾有不瘳者吾不信也
治經理亮以禁方殿之肯部經脈更殿之道光辛丑秋日曹禾

目錄 薄茹方第一 貼藥方第二 丹藥方第三 丸藥方第四 僧奎元
注唯痺方第六 骨節經脈類方第七

癰疽禁方錄

薄藥方第一

雲母薄方 專治癰疽結于血內根散漫色不變或潰後深不暢痛不止者

雲母石粉如 礪石 醋淬七次 生鹿角如 烏頭如 南星如 共杵極細末

醋調蜜文火熬膏傳腫上四圍

芙蓉薄方 專治癰疽結于肌膚色紅腫痛

芙蓉葉如 蛇甘草如 莽草葉如 蚕沙如 共搗極細末客調成膏

批

傳腫上四圍

右薄藥二道一用溫茹化陰通陽融瘀濁以去死肌為癰疽血肉之要劑一用

涼茹抑陽利陰解熱毒以除結氣為癰疽害肌膚之至方古人以藥著腫

上曰傳又曰薄傳敷也唐雅敷布也詩薄迫也爾雅藥布腫上迫逐

癰瘡使之渙釋是亦滑石暢源之一助也

紫葑專治咽喉腐爛

兒茶 龍骨 甘草 各一錢 薄荷 五分 細白芷 一錢 共為細末 臨用時加入

水片 五分 製黃柏一錢

製黃柏法 每黃柏一兩用荊芥甘草各三錢煎汁浸至軟而不苦丸上是大令黃而勿焦白蜜水浸洗晒乾所用

右明僧奎光治喉痹方六道 預澄已列其半于瘍醫大全餘皆從專科秘索得之原書演症繪圖至七十二候証無不極其矣因刪論存口方又若諸家今兩配合各不相侔此係僧師傳本應無謬誤然實症候近壅塞稍腐充斥者用之靡不立效虛症誤施每禍不旋踵慎術者當深察焉

武進曹禾著戒癆醫蛾術錄未見傳本茲偶見殘抄本先錄其第十
二卷癰疽禁方錄此卷原有七篇其第七篇為眉部經脈類文為附錄性質與禁方無異目節之禁方則首尾備具其中一惡等五耳禁方傳自明季僧人尤為珍秘篇帙雖大洵秘笈也己亥仲秋福南老人景竟漫識

製硝法 牙硝揀牙長質明者以白蘿蔔汁煮再以甘草湯煮提出待燥研收

冬月製極陳者長

製礬法 明礬打如豆大入洋銀罐煑炭火煨煑銅筋攪之無塊如大硝末十
之三再煨又加月石十三分動少時再入礬硝月石如前法待紫至罐口如饅頭
樣加武火煨之將乾用新瓦覆蓋一時去起滴入人乳牛黃五六匙文火焙乾
地上襯紙以罐覆紙七日後去起以輕鬆無堅紋者留用有堅紋者去
去其大候初宜不炙不武則礬化透投硝礬時宜更武則礬提鬆滴
乳時須看頂上微動則汁必入不動則藥已結汁不能入若初起即武則
硝走無用每罐藥須少放漸添多則藥必泛無用如罐溫溫則炸此礬
愈久愈佳

青礬 專治熱涎痺

青礬 薄荷各六錢 元丹一錢 水比三分 百草霜少許 玉丹四錢

以序研細臨用配合更佳

黃芩 專治寒痺欲作癰膿

殭蚕 蒲黃 蓬砂 各四錢 皂莢二条 合研極細貯用

僧奎光治喉痹方第六

玉丹 專能開頑痰

製礬 三分 草霜

半茶匙掃取燒山 紫錫底輕浮者

共研合入元丹 二厘 再研五和入

大粉草末 三茶匙

薄荷葉末 二分

研極細入米片 五分 研合相得貯用不

可過十日陰雨天合者佳春夏礬少薄荷多色青秋冬礬多薄

荷片色白引痰加牙皂月石并許

月

日

金丹 專能開結氣

製硝 一錢

八分

生蒲黃粉 四分

共研合入殭蚕末

一分取細條小腹者刷去 灰瓦上炙大炙至醬色折

之脆斷去 頭尾用

牙皂末 一分瓦上炙至色

冰片 一分

研和如鵝黃色加牛黃

二研令相得可用一年

用法

初起玉丹

九分

金丹

一分

吹五管

第二次玉丹

八分金丹

三次玉丹

七分金丹

三分

重吹玉丹

金丹

各五分

吹引吐痰

後金丹六分

玉丹四分

板重吹金丹

八分

玉丹

二分

重吹入咽

製元丹法

用

細白灯草置小壺中燒赤以濕紙丸盆內熄取出入紙袋懸風處七日可

散藥方第五

黑虎散 專治癰疽腫赤痛劇之屬痰熱者

番木鱉

不拘多少以陳松蘿茶煎膠汁浸十日刮去皮晒乾用麻油

文火煨透研極細末每一支加水片一錢麝香三分合和取著瘡上以貼

封之

凝水石散

專治湯火傷腫痛赤爛

凝水石

研極細末麻油調傳

止血散

立止金瘡血液

故棉絮

燒灰存性篩細厚掩創上以膏蓋之

左散方三道散雜亂親

准母南精神布也

廣雅不相從也漢書天散

不与物散注

釋詁不相從也

又志

之存義乃雜葦葯屑以為粉布于瘡腫之上令邪毒瘀出濁不与氣

血相逆厥功豈矣四方皆極微賤之物具極神奇之用洵已不忝斯名設

博諸匪人使搖心勝之推闡難盈之靈漢視剝膚之痛苛征無厭之

賢以仁存心者能不髮豎皆裂乎禁方焉可盡也

之完善渾堅入胃緩化以去病諸方類皆疏浚迅烈之劑以滌除痰濁通暢
血脈實症屢博功效矣虛者可漫嘗試以姑過乎禁方匪人勿傳殆為是
歟

年

月

日

烏羊角一付威靈仙四五

同煎至角軟取角切片燒紅新瓦上炙脆研細末每角一兩加木香一錢白芥子三錢研和煉蜜丸每服一錢夏苦草湯下七服後大便色黑為度忌生冷煎炒房事

珠龍丸專治癰毒內蒸服之使泄

蜈蚣三条

地龍五錢

蠟七枚

蛇七条

麝香十枚

血竭

三錢木香一錢

巴豆三錢

鼠屎

兩頭尖者三七枚

共研細末煉蜜丸如菰豆大每服三丸沸水下取瀉不瀉更服可至九丸

此

紫金丸專治山癰瘡結毒

皂角

五具酒浸

石決明

五具童便浸

吳茱萸三次

血餘灰一五

硃砂五錢

共研極細末肥皂四膜五錢水浸飯上蒸熟打膏糊丸如菰豆大每服三錢土茯苓湯下

右丸藥方六通丸古方悉作圓丸

淮南原道員者

九完也廣雅釋詁四

劑量藥物搏合成顆之法輪丸之圓轉流利下咽滑疾而不戕一取性味

丸藥方第四

宣銘丸 專治邪氣外中，瘀血內結，發為癰疽而未成者。朱砂為衣

麻黃 一兩 三錢 草烏 三錢 姜 汁炒 地龍 一兩 三錢 麝香 三十枚 天虫 一兩 三錢 蜂房 三錢 水浸炙

黃耆 二兩 五錢 血竭 五錢 木香 三錢

共為極細末，寒食麴糊丸，每丸重一錢，每服一丸，葱汁酒下，不能飲者

葱豉湯下

酥黃丸 專治丁腫惡瘡初起。竹油為衣

蟾酥 五錢 生大黃 麻黃 各一兩 麝香 二分

共研細末，火酒化蟾酥為丸，每丸重三分，每服一丸，敲碎嚼爛，葱白包

藥開水下

大噤化丸 專治喉痺腫閉

梅磬 一錢 玄丹 三分 百草霜 甘草 水片 各五分 薄荷 四錢 川貝 母二

梅磬 與百草霜先研次入玄丹，又次入薄荷甘草貝母，又次入水片

研勻，臨時用藥四分，煉蜜和丸，噤化嚥津

羊角丸 專治鼠瘻癰癰

是為服食之祖。劉向禮鄭注五毒丹、硃石膽、紫金、慈石、雄黃、外台范
汪五黃散、丹砂、曾青、雄黃、慈石、白石、桑、雌黃、礬石、石黑、鉉乳、雲母。是
為注着之首。方服食，靡不貽禍。翰父公已力誠于前，注着每收奇蹟。諸方
書均矜秘于後，良以當時列于禁方，流傳頗鮮，遂致訛謬踵起。愈神
愈廣。其一炁三仙降龍、伏龍、升龍五丹，傳自僧師，實有捷效。而升丹
六、降丹四道，或出方書，或由臆覓，依方修合，驗否難憑，并有叠煉
數四皆係活汞者。諦思藥物分兩異同，其中定多錯偽，目並存之以俟博
識者。

安炉則宜熾赤炭於底勻鋪赤黑炭于面鈔傍密塞令無罅隙若一隅有隙透火則一隅色黑無為一隅炭先赤者亦然必至一柱線香時探看綿色微黃大候方準早則病在大武是為太過遲則周視炉大中有無缺炭之處若有缺處是為不及太過則求之不及則求伏均令丹少凡煅煉時封口灰上煙起有聲是硝礬性發待性定胎結自共守炉者加灰輕絮不可妄動

凡世俗所尚混元金既濟鼎百眼炉陽城罐九轉還元顛倒升降七日夜金粟火三日夜文武火皆方士欺人之術也不惟造作艱難消耗資本而大藥不成歸咎根基禁忌良可歎也

右丹方二十五道按禹負礪砥砢丹疏丹者丹砂神農本草經云丹砂能化為汞廣雅釋器水銀鎔化還丹復化為丹丹赤也廣雅別

是彩名里白黃皆名丹也山海大流西經白丹青丹注是地產之丹為丹砂之丹汞煉

者為丹藥之丹皆有五色以赤為正黃庭經九轉八瓊丹注八瓊朱砂

雄黃空青硫黃雲母戎鹽雌黃消石素心遺篇小金丹硃砂雄黃

雌黃

九炁丹

汞 硝 礬 皂 青 鹽 各九錢 硃 雄 黃 各三錢 礪 砂 如無以蓬砂代三錢 信 三 分

萬應靈丹

汞 一 斤 硝 二 斤 礬 三 斤 皂 二 斤 青 鹽 一 斤 鉛 五 錢 雄 蓬 砂 各 三 錢 信 三 分

升丹法

諸藥異研合和入小厚鉄鎔中搽一窩各汞覆以餘藥取新碗覆鎔令密鉄鎔壓頂煨石膏作粉封口插柴灰蓋面築令稍堅置三隅灶文火煨煉以少許新棉看碗頂候至取看棉色微黃則火已足下壚令定明鎔剝取盡底瓦上之藥是名曰丹鎔底為胎壳無用

降丹法

諸藥研令用消銀白泥罐置赤炭上徐入藥煨令凝結搽窩安汞覆藥烘結成胎倒覆碗內桶灰封口以瓦盆盛水置盆水中外作三隅灶熾炭三斤布令密文火煨至炭盡丹成用罐剝取盡底飛下之藥是名曰丹罐與胎壳無用凡丹竈背風則火文迎風則火武文則汞起徐緩而丹足武則汞我不定而丹耗

五虎丹 用同伏龍

汞六錢 硝一五二錢 礬一五八錢 皂 青鹽各一五二錢

一方

汞一五 硝礬 青鹽 各一五 皂一五

升龍丹 徽症結毒潰爛臭穢外用

汞一五 硃硫雄各三錢

四聖丹 用同升龍

汞皂硃雄各三錢

以上共五方皆升丹

降丹 消結蝕腐性極峻烈

汞一五 硝三五 礬皂礬青鹽各三 膽礬硃砂雄黃各三 信五分

每丹一兩配蘆甘石五錢研和用法同一虎丹

八仙丹

汞一五 硝礬皂青鹽各二五 蓬砂硃雄各三錢

升丹
汞 硝 礬 鉛 青 鹽 各一兩

七星丹

汞 硝 礬 皂 青 鹽 蓬 砂 各一兩 硃 二錢

金蟾丹

汞 三錢 雄 一兩 火酒 二斤 黃 大 蟾 一隻 破 腹 去 腸 納 包 硃 礬 各一兩 研 乾 同 汞 研 細 紙 包 鐵 紙 緊 密

降龍丹 提徽瘡邪毒化為瘰癧，從報滲出，而瘡即消滅。

汞 硝 礬 青 鹽 各一兩

每丹一錢，配生藥豆於三錢，棗肉三錢，研和糊丸，每服三分，松蘿茶下，重者五分，服至三日，以牙腫出，其涎瘀血為度，如不可支，以貫眾黃連各一兩煎汁，一日服盡則解。

六獸丹 用同降龍

汞 硃 各八 硝 皂 青 鹽 食 鹽 各七錢

伏龍丹 徽透不退點之即瘥

汞 一兩 硝 礬 皂 青 鹽 各二兩 雄 硃 各三五

每丹一兩，配白酒藥三兩，研合，清水和丸，如豌豆大，清水研化，攪澄去渣，煎

點瘡上

一方
汞硝礬皂各一兩 硃三分 雄五分

白昇丹
汞一兩 硝礬皂礬各二兩 青鹽五錢 鉛六錢

紫升丹
汞一兩 硝礬皂礬各二兩 鉛六錢 雄硫青鹽各五錢

紅升丹
汞一兩 硝三兩 礬二兩 鉛九錢 硃四錢 雄三錢

五虎丹
汞一兩 硝一兩 礬一兩 硃半兩 雄半兩

一方
汞一兩 硝礬各三兩 雄八錢 五錢 硃一兩

五悉丹
汞硝礬皂青鹽各一兩

一方
汞一兩 硝一兩 礬二錢 礬皂皂青鹽各一兩 二錢

丹藥方第三

一炁丹 世名大消結潰堅功冠羣丹

為仙丹

汞 一兩 硃砂 三錢 硝 二兩 礬砂 三錢 礬 三五 信 三分 戎藍 二兩

每丹一兩配飛硃砂五錢研合大癰用丹五厘小癰用丹三厘置貼中心另
以一貼刺孔覆丹着腫上不應以紙覆丹油潤着之分令着肉着
既痛起泡

此丹性升着肉雖痛頂時即定降丹性沈能潰良肉搗去痛亦不
止得此可廢諸降此方世罕真傳余曾得五方或藥物互异今兩考
差傳者又大議火候之難自際僧師不啻揆雪見月謹述真方捷法
以公同好

三仙丹 蝕膿去腐生新已潰直用至收口

汞 一兩 硝 一兩 礬 各一兩二錢

大昇丹

汞 一兩 硝 二兩 礬 二兩 皂礬 五錢 雄黃 五錢 硃砂 各五錢