

柳
选
田
之
永
阳
之
书



評選繼志堂醫案下卷

江陰柳氏醫
學叢書之六

常熟曹存心仁伯著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

嘔噦門

○上焦吐者從乎氣氣屬陽是陽氣病也胸爲陽位陽位之陽旣病則其陰分之陽更屬大虛不言而喻恐增喘汗

吳萸 乾薑 人參 川附 茯苓 半夏

木香 丁香 炙草 飴糟 食鹽 陳皮

再診 進溫養法四日不吐今晨又作想是陽氣大虛
濁陰上泛究屬膈證之根不能不慮其喘汗

前方去乾薑 加當歸 生薑

原註陽氣大虛濁陰上泛此病之樞紐也吳茱萸
湯補胃陽佐以熟附丁香溫之至矣輔以二陳燥
其痰飴糟去其垢更加炙草以和中食鹽以潤下
用意極其周密

○食則右脇下痛痰自上升升則得吐而安右脈弦滑
左關堅急寸部獨小此心氣下鬱於肝經脾弱生痰爲
膈放開懷抱第一要義

旋覆代赭湯去薑則加生於朮 白芥子 炙草

廣皮 竹油

另丸方 六君子湯 加當歸 良白芍 生地

菴蓉 沈香 白芥子 竹油薑汁泛丸

尚與原註心氣下鬱脾弱生痰方中於朮乾薑二陳竹

再結油補脾化痰之藥也更有白芥子消膜外之痰旋

半覆花開心氣之結赭石鎮肝氣之逆用意層層都

木到

○食則噎痛吐去濁痰而止胸前常悶脈象絃滑舌苔

滿白肌肉瘦削之人陰血本虧今陽氣又結陰液與痰

壅示宜醫案

卷下 嘔噦

二 惜餘小舍

濁交阻上焦是以胃脘狹窄也久則防膈

乾薑 薤白 炙草 枳頭糠 神麴 丁香

木香 熟地 白蔻仁 歸身 白芍 沉香

牛黃 竹油

再診 胸前所結之邪原有化意無如陰之虧陽之結
尚與前日相等非一二兩劑所能奏效

乾薑 薤白 炙草 茯苓 丁香 木香 陳皮

麻仁 旋覆花 代赭石 歸身 白芍 枳子

牛黃 竹油

詒按此氣結痰阻之證用藥極周到



○嗜酒中虛溼熱生痰痰阻膈間食下不舒時欲上泛
年已甲外營血內枯氣火交結與痰相併欲其不成膈
也難矣

七聖散 加歸身 白芍 薤白 代赭石

藕汁 紅花

原註嗜酒者必多溼熱須用竹茹連翹又易挾痰
參入藕汁紅花薤白辛而兼滑又是一格絕去溫
熱剛燥之品先生曰惟善用溫藥者不輕用溫藥
信然

○向患偏枯於左左屬血血主濡之此偏枯者既無血

以濡經絡且無氣以調營衛營衛就枯久病成膈然一
飲一食所吐之中更有濁痰紫血此所謂病偏枯者原
從血痺而來初非實在枯槁也勉擬方

每日服人乳兩三次 間日服鷲血一二次

詒按偏枯已屬難治更加以膈愈難措手矣方祇
寥寥兩味而潤液化瘀通痺開結面面都到此非
見理真切而又達於通變者不能有此切實靈動
之方愚意再增韭汁一味似乎更覺親切

○脈形細澁得食則噎胸前隱隱作痛瘀血內阻胃絡
不通此膈證之根

歸鬚 白芍 白蜜 蘆根 瓦楞子 醋 韭汁

人參 桃仁

詒按此瘀血膈也脈證均合用藥亦專注在此

○瘀血挾痰阻於胸膈食則作痛痛則嘔吐右脈濇數
惟左關獨大且弦是痰瘀之外更有肝經之氣火從而
和之爲患乃膈證重候慎之

歸身 白芍 蘆根 瓦楞子 紅花 絲瓜絡

橘絡 竹油 白蜜

原註以上三病皆瘀膈也第一證從偏枯中想出
血痺用人乳以潤其枯燥驚血以動其瘀血此證



非特剛劑不受并柔補之藥亦不可投萬不得已而爲此法仍是潤液化痰之意柔和得體○第三證從胸前隱痛而知其痰阻胃絡用桃仁醋煨瓦楞子以化其痰此證血痰液涸無論乾薑不可用卽薤白辛溫通氣亦與此隔膜然非辛不能通計惟用濡潤之韭汁以通之蜜蘆歸芍奠安營分以其液涸也此病不見痰所以純從濡潤去痰之法○第三證見痰所以瓦楞子紅花外又加竹油一味

○溼熱生痰阻於胃脘得食則噎噎甚則吐此膈之根

也

半夏 陳皮 川連 竹茹 白蔻 生薑

雞距子 枇杷葉 查炭

原註指爲溼熱想因苔帶黃色也用七聖散者中有橘皮竹茹湯又有溫膽湯兩方在內更加枇杷葉泄肺查炭消痰雞距子消酒積總不外溼熱二字此猶是隔之淺者

○食已卽吐脈弦苔白便溏溺清溼痰內勝被肝經淫氣所衝

旋覆花 代赭石 陳皮 半夏 萊菔子 生薑

茯苓 雪羹湯

再診 吐逆大減胸前尚痞噎氣不舒

旋覆代赭湯 雪羹湯

詒按此證陰液未曾大虧通陽開結專理其痰痰降而嘔逆自減尚非證之重者

○咽中介介如有炙鬱痰氣交阻爲患

蘇葉 半夏 川樸 茯苓 竹茹 陳皮

石決明 牛膝

原註此咽膈也痰結於肺用四七湯以理其氣合溫膽湯以化其痰去枳實換牛膝者欲其達下焦



也

○得食多噦許氏法主之

丁香 陳皮 川朴 半夏 茯苓 甘草

枇杷葉 茅根

原註此枇杷葉散去香薷一味也此另是一種暑邪挾寒飲內停或食瓜果致中氣不調而嘔噦者不當深求之裏也去香薷者無表證也

○食已卽吐本屬胃病宜用溫通然口雖乾苔反白將吐之時其味先酸此必有肝火鬱於胃府似與胃家本病有間

左金丸合溫膽湯 雪羹湯

詒按辨證精細用藥妥切

溼病門

○脾陽不足溼濁有餘少納多脹舌白脈遲

茅朮理中湯合四七湯

詒按此溼滯而兼氣鬱之證

痺氣門

○胸痛徹背是名胸痺痺者胸陽不曠痰濁有餘也此病不惟痰濁且有瘀血交阻膈間所以得食梗痛口燥不欲飲便堅且黑脈形細濇昨日紫血從上吐出究非

順境必得下行爲安

全瓜蒌

薤白

旋覆花

桃仁

紅花

瓦楞子

元明粉

合二陳湯

詒按方法周到不蔓不支擬加參三七磨冲○胸

痺證前人無有指爲瘀血者如此證納食梗痛乃

瘀血阻於胃口當歸入噎膈證內論治矣

○心痛徹背是名胸痺久而不化適值燥氣加臨更增

欬嗽咽乾痰中帶紅脈形細小治之不易

瓜蒌

薤白

枳殼

橘紅

杏仁

桑葉

枇杷葉

詒按既因燥氣加臨痰紅噎乾似當參用清潤如喻氏法擬加旋覆花南沙參麥冬桑皮

脘腹痛門

○心痛有九痰食氣居其三者交阻於胃時痛時止或重或輕中脘拒按飲食失常痞悶難開大便不通病之常也卽有厥證總不離乎痛極之時茲乃反是其厥也不發於痛極之時而每於小便之餘陡然而作作則手足牽動頭項強直口目歪斜似有厥而不返之形及其返也時有短長如是者三矣此名癰厥良以精奪於前痛傷於後龍雷之火挾痰涎乘勢上升一身而兼痛

厥兩病右脈不暢左脈太弦蓋弦則木乘土位而痛又
挾陰火上衝而厥必當平木為主兼理中下次之蓋恐
厥之愈發愈勤痛之不肯全平耳

川椒七粒烏梅三分青鹽一分龍齒三錢查炭三錢神麴三錢

萊菔子三錢延胡半錢川楝子半錢青皮七分橘葉一錢竹油一兩

詒按厥發於小解之時其厥之關於腎氣可知矣
用藥似宜兼顧○立方選藥熨帖周到

再診 據述厥已全平痛猶未止便黑溺黃右脈反弦

想諸邪都合於胃也胃為府以通為補懸擬方

芍藥 青皮 陳皮 黑梔 川貝 丹皮

醫志堂醫案 卷下 脘腹痛 八 惜餘小舍



查肉 竹油 萊菔子 青鹽 延胡

詒按諸邪都合於胃從右脈之弦看出是病機緊

要處

三診 痛厥已平尚有背部隱疼之候腰部亦疼氣逆
欬噎脈形細數想肝腎陰虛氣滯火升肺俞絡脈因之
俱受其傷也

四物湯 旋覆花湯 二母 雪羹湯

四診 腰脊尙疼欬嗽不止苔白底紅脈形弦細是陰
虛而挾溼熱也

豆卷 茯苓 黑梔 川芎 歸身 麥冬