

四

温病条辨

善伯



南京中医药大学图书馆版权所有

叔中湯方

苦辛通法

蜀椒

三錢炒  
出汗

淡乾薑

四錢

厚朴

三錢

檳榔

二錢

廣皮

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者加桂枝三

錢。防己五錢。薏仁三錢。厥者加附子二錢。

九痛丸方

治九種心痛苦辛甘熱法

附子

三兩

生狼牙

一兩

人參

一兩

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

巴豆

一兩去皮心  
熬碾如膏



蜜丸。梧子大酒下。強人。初服三丸。日三服。弱者二丸。兼治卒中惡腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣。落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

方論內經有五臟胃腑心痛。並痰蟲食積。卽爲九痛也。心痛之因。非風卽寒。故以乾薑附子。驅寒壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲。陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆入。補瀉攻伐皆備。故治



中惡腹脹痛等證。

附錄外臺走馬湯。治中惡心痛腹脹大便不通。

苦辛熱法。沈日南注云。中惡之證。俗謂絞腸烏。

痧。卽穢臭惡毒之氣。直從口鼻入於心胸腸胃。

臟腑。壅塞正氣不行。故心痛腹脹大便不通。是

爲實證。非似六淫侵入而有表裏清濁之分。故

用巴豆極熱大毒峻猛之劑。急攻其邪。佐杏仁

以利肺與大腸之氣。使邪從後陰一掃盡除。則

病得愈。若緩須臾。正氣不通。營衛陰陽機息。則



死。是取通則不痛之義也。

巴豆

二枚去心皮熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏槌令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下老小強弱量之。通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中治霍亂用陰陽水一法。有協和

陰陽使不相爭之義。又治乾霍亂用鹽湯探吐

一法。蓋閉塞至極之證。除針灸之外。莫如吐法

通陽最速。夫嘔厥陰氣也。寒痛。太陽寒水氣也。

否。冬象也。冬令太陽寒水得厥陰氣至。風能上



1661  
中醫藥大學圖書館

升則一陽開泄。萬象皆有生機矣。至針法治病最速。取禍亦不緩。當於甲乙經中求之。非善針者不可令針也。

汪按玉龍經。乾霍亂取委中。今世俗多用熱水急拍腿灣。紅筋高起。卽刺之。出血愈。又按此證亦有不由觸穢受寒。但因鬱怒而發者。其宜急攻下氣。與觸穢受寒同。

徵按沙證向無方論。人多忽之。然其病起於倉卒。或不識其證。或不得其治。戕人甚速。總因其



人濁陰素重。清陽不振。偶感濁陰之氣。由口鼻  
直行中道。邪正交爭。營衛逆亂。近世治之者。率  
有三法。不知起自何人。一則刮之。前按所云是  
也。一則焮之。以大燈草或紙撚蘸麻油。照看其  
頭面額角及胸前腹上肩膊等處。凡皮膚閒隱  
隱有紅點發出。或加蚊迹。或累累墳起。疎密不  
同。層次難定。一經照出。輕輕灼而焮之。爆響有  
聲。則病者似覺輕鬆痛減。一則刺之。其法以針  
按穴刺出血。凡十處。名曰放沙。此皆針灸遺意。

但不見古書。故不悉載。又有試法。與以生黃豆  
嚼之。不腥者沙。覺有豆腥氣者非沙。與試疔同。  
患此者俗忌生薑麻油之類。余歷驗多年。知其  
言亦不謬。曾見有少女服生薑而斃。有少男子  
服乾薑一夜而死。餘俱隨覺隨解之耳。前二方  
中俱有乾薑。似與俗說相悖。然乾薑與檳榔巴  
豆並用。正使邪有出路。既有出路。則乾薑不爲  
患矣。但後之人不用此方則已。用此方而妄減  
其制。必反誤事。不可不知。至若羌活麻黃。則在



所大禁。余尚有二方。附記於後。以備裁探。

立生丹

治傷暑霍亂沙證。瘧痢泄瀉。心痛胃痛。腹痛。吞吐酸水。及一切陰寒之證。結胸。

小兒寒瘧

母丁香

一兩二錢

沈香

四錢

茅蒼米

一兩二錢

明雄黃

一兩二錢

右為細末。用蟾酥八錢。銅鍋內加火酒一小杯。

化開。入前藥末。丸菉豆大。每服二丸。小兒一丸。

溫水送下。又下死胎如神。凡被蝎蜂螫者。調塗。

立效。惟孕婦忌之。



此方妙在剛燥葯中加芳香透絡。蟾乃土之精。上應月魄。物之濁而靈者。其酥入絡以毒攻毒。而方又有所監制。故應手取效耳。

獨勝散

治絞腸沙痛急指甲唇俱青危在頃刻

馬糞

年久彌佳

不拘分兩。瓦上焙乾為末。老酒沖服。三三錢。不知。再作服。

此方妙在以濁攻濁。馬性剛善走。在卦為乾。糞乃濁陰所結。其象圓。其性通。故能摩蕩濁陰之



邪。仍出下竅。憶昔年濟南方。訶菴蒞任九江。臨  
行。一女子忽患沙證。就地滾豪。聲嘶欲絕。訶菴  
云。偶因擇日不謹。悞犯紅沙。或應此乎。余急授  
此方。求馬糞不得。即用騾糞。並非陳者。亦隨手  
奏功。

溼温 瘧痢疸痺附

⑤溼熱上焦未清。裏虛內陷。神識如蒙。舌滑脈緩。  
人參瀉心湯加白芍主之。

溼在上焦。若中陽不虛者。必始終在上焦。斷不

內陷或因中陽本虛或因誤傷於藥其勢必致  
內陷。溼之中人也。首如裏。目如蒙。熱能令人  
故神識如蒙。此與熱邪直入包絡讖語神昏有  
閒。裏虛故用人參以護裏陽。白芍以護真陰。溼  
陷於裏。故用乾薑枳實之辛通。溼中兼熱。故用  
黃芩黃連之苦降。此邪已內陷。其勢不能還表。  
法用通降從裏治也。

人參瀉心湯方 苦辛寒兼甘法

人參 二錢

乾薑 二錢

黃連 一錢五分



黃芩 一錢五分

枳實 一錢

生白芍 二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。渣再煮一杯服。

⑤溼熱受自口鼻，由募原直走中道。不飢不食，機竅不靈。三香湯主之。

此邪從上焦來，還使上焦去法也。

三香湯方 微苦微辛微寒兼芳香法

栝藿皮 三錢

桔梗 三錢

黑山梔 二錢

枳殼 二錢

鬱金 二錢

香豉 二錢

降香末 三錢



水五杯。煮取二杯。分三次溫服。

**方論**按此證由上焦而來。其機尚淺。故用蘘

桔梗枳殼微苦微辛開上。山梔輕浮微苦清熱。

香豉鬱金降香化中上之穢濁而開鬱。上條以

下焦為邪之出路。故用重。此條以上焦為邪之

出路。故用輕。以下三焦均受者。則用分消。彼此

互參。可以知葉氏之因證製方。心靈手巧處矣。

不惜散見於案中。而人多不察。茲特為拈出。以概

其餘。



⑤吸受穢溼三焦分布。熱蒸頭脹。身痛嘔逆。小便不通。神識昏迷。舌白。渴不多飲。先宜芳香通神。利竅。安宮牛黃丸。繼用淡滲分消濁溼。茯苓皮湯。

按此證表裏經絡臟腑三焦俱為溼熱所困。最

畏內閉外脫。故急以牛黃丸宣竅清熱而護神明。但牛黃丸不能利溼分消。故繼以茯苓皮湯。

安宮牛黃丸 方法見前

茯苓皮湯 淡滲兼微辛微涼法

水茯苓皮 五錢  
生薏仁 五錢  
猪苓 三錢



大腹皮 三錢

白通草 三錢

淡竹葉 一錢

水八杯。煮取三杯。分三次服。熱則大便不爽。

⑤陽明溼溫氣壅為噦者。新製橘皮竹茹湯主之。

按金匱橘皮竹茹湯乃胃虛受邪之治。今治溼

熱壅遏胃氣致噦。不宜用參甘峻補。故改用柿

蒂。按柿成於秋。得陽明燥金之主氣。且其形多

方。他果未之有也。故治肺胃之病有獨勝。肺之臟象

屬金。胃之柿蒂。乃柿之歸束處。凡花皆散。凡子

氣運屬金。柿蒂乃柿之歸束處。凡花皆散。凡子皆降。凡降先收。從生而散而收而降。皆一蒂為

前輩有言本草解藥性不盡得此知察理之精求之





五色五味之  
外  
凡辨藥須實  
就物理體會  
方有妙悟不  
可泥定本草  
本論括出處  
可以隅反

之也。治逆呃之能事畢矣。再按草木一身。蘆與

生氣上升者蘆也。受陰精歸藏者  
芾也。格物者不可不於此會心焉。

### 新製橘皮竹茹湯

苦辛通降法

橘皮 三錢

竹茹 三錢

柿蒂 七枚

薑汁 三茶匙沖

水五杯。煮取二杯。分二次溫服。不知。再作服。有痰

火者。加竹瀝。栝蘘霜。有瘀血者。加桃仁。

⑤三焦溼鬱。并降失司。腕連腹脹。大便不爽。一加

減正氣散主之。



中國醫藥大學圖書館藏