

四

溫病條辨

善伯



叔中湯方

苦辛通法

蜀椒

三錢炒
出汗

淡乾薑

四錢

厚朴

三錢

檳榔

二錢

廣皮

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者加桂枝一

錢。防已五錢。薏仁三錢。厥者加附子二錢。

九痛丸方

治九種心痛苦辛甘熱法

附子

三兩

生狼牙

一兩

人參

一兩

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

巴豆

一兩去皮心
熬碾如膏



蜜丸梧子大酒下。强人初服三丸。日三服。弱者二丸。○兼治卒中惡腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

方論內經有五臟胃腑心痛。並痰蟲食積。卽爲九痛也。心痛之因。非風卽寒。故以乾薑附子驅寒。壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆入。補瀉攻伐皆備。故治



中惡腹脹痛等證。

附錄外臺走馬湯。治中惡心痛腹脹大便不通苦辛熱法。沈目南注云。中惡之證俗謂絞腸焉。癥卽穢臭惡毒之氣。直從口鼻入於心胸腸胃臟腑。壅塞正氣不行。故心痛腹脹大便不通。是爲實證。非似六淫侵人而有表裏清濁之分。故用巴豆極熱大毒峻猛之劑。急攻其邪。佐杏仁以利肺與大腸之氣。使邪從後陰一掃盡除。則病得愈。若緩須曳。正氣不通。營衛陰陽機息。則



死。是取通則不痛之義也。

巴豆二枚去心皮熬杏仁二枚

右二味以綿纏搥令碎。熱湯二合。捻取白芷飲。
之當下老小強弱量之通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中治霍亂用陰陽水一法。有協和
陰陽使不相爭之義。又治乾霍亂用鹽湯探吐
一法。蓋閉塞至極之證。除針灸之外。莫如吐法。
通陽最速。夫嘔厥陰氣也。寒痛。太陽寒水氣也。
否。冬象也。冬令太陽寒水得厥陰氣至。風能上



升則一陽開泄。萬象皆有生機矣。至針法治病最速。取禍亦不緩。當於甲乙經中求之。非善針者不可令針也。

汪按玉龍經乾霍亂取委中。今世俗多用熱水急拍腿灣。紅筋高起。卽刺之。出血愈。又按此證亦有不由觸穢受寒。但因鬱怒而發者。其宜急攻下氣。與觸穢受寒同。

徵按沙證向無方論。人多忽之。然其病起於倉卒。或不識其證。或不得其治。狀人甚速。總因其



人濁陰素重。清陽不振。偶感濁陰之氣。由口鼻直行中道。邪正交爭。營衛逆亂。近世治之者。率有三法。不知起自何人。一則刮之前按所云。是也。一則淬之。以大燈草或紙撲蘸麻油照看。其頭面額角及胸前腹上肩膊等處。凡皮膚閒隱。隱有紅點發出。或如蚊迹。或累累墳起。疎密不同。層次難定。一經照出。輕輕灼而淬之。爆響有聲。則病者似覺輕鬆。痛減一則刺之。其法以針按穴刺出血。凡十處。名曰放沙。此皆針灸遺意。



但不見古書。故不悉載。又有試法。與以生黃豆。
嚼之。不腥者沙覽有豆腥氣者非沙。與試疔同。
患此者俗忌生薑麻油之類。余厯驗多年。知其
言亦不謬。曾見有少女服生薑而斃。有少男子
服乾薑一夜而死。餘俱隨覺隨解之耳。前二方
中俱有乾薑。似與俗說相悖。然乾薑與檳榔巴
豆並用。正使邪有出路。既有出路。則乾薑不爲
患矣。但後之人不用此方。則已。用此方而妄減
其制。必反誤事。不可不知。至若羌活麻黃。則在

所大禁。余尙有二方。附記於後。以備裁採。

立生丹

治傷暑霍亂沙證瘧痢泄瀉心痛胃痛腹痛吞吐酸水及一切陰寒之證結胸

小兒

寒瘻

母丁香

一兩

沈香

四錢

茅蒼术

一兩

明雄黃

一兩

二錢

右爲細末用蟾酥八錢。銅鍋內加火酒一小杯。化開。入前藥末。丸菉豆大。每服二丸。小兒一丸。溫水送下。又下死胎如神。凡被蝎蜂螫者。調塗立效。惟孕婦忌之。

此方妙在剛燥藥中加芳香透絡。蟾乃土之精。
上應月魄。物之濁而靈者。其酥入絡以毒攻毒。
而方又有所監制。故應手取效耳。

獨勝散

治絞腸沙痛急指甲唇俱青危在頃刻

馬糞

年久彌佳

不拘分兩。瓦上焙乾爲末。老酒沖服二三錢。不知再作服。

此方妙在以濁攻濁。馬性剛善走。在卦爲乾。糞乃濁陰所結。其象圓。其性通。故能摩蕩濁陰之。

邪。仍出下竅。憶昔年濟南方。訥菴蒞任九江。臨行。一女子忽患沙證。就地滾曬。聲嘶欲絕。訥菴云。偶因擇日不謹。悞犯紅沙。或應此乎。余急授此方。求馬糞不得。卽用驥糞。並非陳者。亦隨手奏功。

溼溫 瘰癧疽癰附

●溼熱上焦未清。裏虛內陷。神識如蒙。舌滑脈緩。人參瀉心湯加白芍主之。

溼在上焦。若中陽不虛者。必始終在上焦。斷不

內陷或因中陽本虛或因誤傷於藥其勢必致
內陷溼之中人也。首如裹。目如蒙。熱能令人
故神識如蒙。此與熱邪直入包絡譏語神昏。
閒。裏虛故用人參以護裏陽。白芍以護真陰。溼
陷於裏。故用乾薑枳實之辛通。溼中兼熱。故用
黃芩黃連之苦降。此邪已內陷。其勢不能還表。
法用通降從裏治也。

人參瀉心湯方

苦辛寒兼甘法

人參二錢

乾薑二錢

黃連一錢

五分

黃芩 一錢 五分

枳實 一錢

生白芍 二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。渣再煮一杯服。
蓋溼熱受自口鼻。由募原直走中道。不飢不食。機
竅不靈。三香湯主之。

此邪從上焦來。還使上焦去法也。

三香湯方

微苦微辛。微微寒。兼芳香法。

桔梗皮

三錢

桔梗

三錢

黑山梔

一錢

枳殼

二錢

鬱金

二錢

香豉

二錢

降香末

三錢

本草綱目



水五杯。煮取二杯分三次温服。

方論按此證由上焦而來。其機尙淺。故用葛根。

桔梗枳殼微苦微辛開上。山梔輕浮微苦清熱。

香豉鬱金降香化中上之穢濁而開鬱。上條以

下焦爲邪之出路。故用重。此條以上焦爲邪之

出路。故用輕。以下三焦均受者。則用分消。彼此

互參。可以知葉氏之因證製方。心靈手巧處矣。

不惜散見於案中而人多不察。茲特爲拈出。以概

其餘。



○吸收穢溼三焦分布。熱蒸頭脹。身痛嘔逆。小便

不通。神識昏迷舌白。渴不多飲。先宜芳香通神。

竅安宮牛黃丸繼用淡滲分消濁溼。茯苓皮湯。

按此證表裏經絡臟腑三焦俱爲溼熱所因。最

畏內閉外脫。故急以牛黃丸宣竅清熱而護神

明。但牛黃丸不能利溼分消。故繼以茯苓皮湯。

安宮牛黃丸

方法見前

茯苓皮湯 淡滲兼微辛微涼法

水 茯苓皮 五錢

生薏仁 五錢

猪苓 三錢

大腹皮 二錢

白通草 三錢

淡竹葉 一錢

水八杯。煮取三杯分三次服。

○毛陽明溼溫氣壅爲噦者新製橘皮竹茹湯主之。

按金匱橘皮竹茹湯乃胃虛受邪之治今治溼

熱壅遏胃氣致噦不宜用參甘峻補故改用柿

蒂按柿成於秋得陽明燥金之主氣且其形多

方他果未之有也故治肺胃之病有獨勝肺之

臟象

屬金。胃之氣運屬金。柿蒂乃柿之歸束處凡花皆散凡子

皆降凡降先收從生而散而收而降皆一蒂爲

前輩有言水草解藥性不

盡得此知究

理之精求之

五色五味之

外

凡辨藥須實

就物理體會

方有妙悟不

可泥定本草

本論拈出處

可以唱反

之也治逆呃之能事畢矣。

再按草木一身薦與
蒂爲升降之門戶哉

生氣上升者蘆也受陰精歸藏者

常也格物者不可不於此會心焉

苦辛通降法

新製橘皮竹茹湯

苦辛通降法

橘皮三錢

竹茹三錢

柿蒂七枚

薑汁三茶匙

水五杯煮取二杯分二次溫服不知再作服有痰火者加竹瀝栝萎霜有瘀血者加桃仁

⑤三焦溼鬱升降失司腕連腹脹大便不爽一加

減正氣散主之

白蘿卜

三錢

薑汁三茶匙

七枚

七枚