

方選醫漢日本

編簡元波丹

萬葉出版社出版

丹波元簡 編

日本漢醫選方

萬葉出版社出版

日本漢醫選方

丹波元簡編

◆

萬葉出版社出版

香港灣仔莊士敦道190號三樓

聯興印刷廠承印

九龍土瓜灣上鄉道39-41號

昌華工廠大廈七樓A座

版權所有・翻印必究

正

編

目錄

上卷

諸卒死門	一
中惡門	五
五絕死門	七
卒中風門	一二
脫陽門	一七
諸厥門	一八
癲癇門	二三
中寒凍死門	二六
中暑暈死門	二七
霍亂門	三〇
攪腸沙門	三三
腳氣衝心門	三五
諸卒失血門	三八
卒心腹痛門	四一

附積氣 鬱胃 卒症 奔豚

下卷

急喉痺門	四三
小便急閉門	四四
卒暴雜證門	四七
附轉筋 牙關緊急 舌卒腫 目睛突出	
落頭類 卒襲卒症 暴盲 瘡毒內攻 傷寒併熱霍亂	四七
婦人急證門	五〇
小兒急證門	五六
疔瘡急證門	六三
金瘡癰撲門	六五
破傷風門	六八
湯火傷門	六九
諸咬傷門	七二
諸物入耳門	八五
附入鼻 入目 眼被物撞着	
誤吞諸物門	八八
諸物哽噎門	九一
附兒頭入臼 指入竹筒	

諸物入肉門……………九三

中藥毒門……………九五

中飲食毒門……………一〇四

上卷

丹波元簡康夫編

諸卒死門

三物備急丸

金匱

主心腹卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死。

大黃

一兩

乾薑

一兩

巴豆

一兩去皮心
熬外研如脂

右藥各須精新。先搗大黃乾薑爲末。研巴豆內中。合治一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令洩氣。主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以煖水若酒服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下便差。若口噤。亦須折齒灌之。案古今錄驗。司空三物備急散。療卒死及噤。口噤不開者。卽本方爲散。

服如大豆
二枚。

還魂湯

金匱

救卒死客忤死。

麻黃

三兩

杏仁

七十箇

甘草

一兩

右三味。以水八升。煮取三升。去滓。分令咽之。通療諸感忤。裏實者。用備急丸。表實者。用還魂湯。金匱

救卒死方金雄雞冠。割取血管吹內鼻中。薤搗汁灌鼻中。

又方肘半夏末。如大豆許。吹鼻中。案此千金療五絕法。心下溫者。一日亦可治。

又方同灸臍中百壯。又方。令人痛爪其人人中取醒。又方。以細繩圍

其人肘腕中。男左女右。伸繩從背上大椎度以下行脊上。灸繩頭。一云五十壯。

又從此灸。橫行各半繩。此凡三灸。各灸三壯。即起。又方。灸鼻下人中

三壯。又方。並兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華陀法。一云。三七壯。

又方秘方集驗燒炭火一杓。以醋燒之。令患人鼻受醋氣。即甦。

救卒死而壯熱者。金礬石半斤。以水一升半煮消。以漬脚。令沒踝。

救卒死而張目反折方。金灸手足兩爪後各十四壯了。飲以五毒諸膏散。

有巴豆者。

救卒死而四肢不收失便者方。金馬屎一升。水三斗。煮取二斗洗之。又以

牛洞一升。溫酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。差

小兒卒死。本草附方無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通。或嚏即活。

卒死。或先有病痛。或居常倒仆。奄忽而絕。皆是中惡之類。肘取葱中央心

刺鼻。令入七八寸無苦。使目中血出乃佳。一云。耳中血出佳。又方。令

二人以衣壅口。吹其兩耳。極則易人。亦可以葦筒吹之。並捧其肩。上側

身遠之。莫臨死人上。又方。以葱刺耳。耳中鼻中血出者。勿怪。無血難

療之。有血者是活候也。又方。視其上唇裏弦。有青息肉。如黍米大。以

針決去之。差。又方。以綿漬好酒。內鼻中。手按令汁入鼻中。並持其手

足。莫令驚動也。又方。取皂莢。如大豆。吹其兩鼻中。嚏則氣通矣。又

方。灸其脣下宛宛中。名承漿。十壯。大良。

備急。療卒死而口噤不開者。外臺縛兩手大拇指。灸兩白肉中二十壯。

集驗。療卒死而有脈形候。陰氣先盡。陽氣後竭故也。方。外臺嚼薤脯灌之。

驚怖卒死。本草附方溫酒灌之。卽醒。

療火盜兵戈。驚氣入心。不能言語者。危謐簡便蜜陀僧末一錢。清茶調下。驚則

氣亂。陀僧之重。以去怯而平肝也。

小兒驚死。醫法指南用生慈姑汁。和白蜜灌之。

偶見人斬血籍籍。驚愕卒死者。本朝經驗溫酒灌之。釀醋亦可。

療火燒悶絕不識人。以新尿冷飲之。及冷水和蜜飲之。口噤絞開與之。千金

療因回祿煙薰致死者。古今醫鑑生蘿蔔搗汁頻咽。并嚼塗火瘡。

附錄免烟薰死法。醫林集要居民逃避石室中。賊以煙火薰之。欲死。迷悶中。摸

索得一束蘿蔔。嚼汁下咽而甦。又炭煙熏人。往往致死。含蘿蔔一片。

著口中。煙氣不能毒人。或預曝乾爲末備用。亦可。或新水搗爛乾蘿

蔔飲之亦可。

又法

李機怪症方

一口呵地。即不死。

退烟散

本期經驗方

預服免烟薰死。

蒿雀數個。去腸實。硃砂末。浸蘿菔自

然汁一宿。取出。內瓦器中。鹽泥固濟。煨存性。研末。每服五七分。白湯

及冷水下。

又療產後血暈。止吐血衄血。

又法。葡萄多食免死。

成醫爲備尤良。

療笑死

毒域神方

凡口有微氣。心下溫者。用食鹽成塊者二兩。火燒令通赤。候

冷研細。以河水一大碗。同煮至三五沸。放溫分三次服之。後以鵝翎探

於喉中。吐去熱痰三五升。後服黃連解毒湯三二服。則笑自定。人可活

矣。案張子和。療一婦人喜笑不休。半年。用此法。醫統云。黃連解毒湯。加半夏竹瀝薑汁。療喜笑不休。極効。

喜笑欲死者。鍼列缺二

穴。在手大指後。臂上三寸。及大陵二穴。在掌後橫紋中。鍼三分。立効。

療入井塚悶冒方

外臺

取其水。灑人面。令飲之。又以灌其頭及身體。即活。若

無水。取他水用也。

又方

壽世保元

以水噴其面。并含水。調雄黃末一二錢。入水噴之。

又方

本期經驗

急解患人衣。偃臥濕地上。以醋噴其面。蓋以草薦。半時許即甦。

救暈鍼法

鍼灸聚英

假令鍼肝經氣暈。以補肝經。鍼入復甦。

甘草一二錢。水

煎灌下。

本期經驗

又方

玉機微義

暈鍼者。奪命穴救之。男左女右。取之不回。却再取右。女亦然。此

穴正在手膊上側筋骨陷中。蝦蟆兒上。自肩至肘。正在當中。

醫學綱目云。在曲澤上一尺。

鍼暈者。神氣虛也。不可起鍼。以鍼補之。急用袖掩病人口鼻回氣。內與熱

湯飲之。卽甦。良久再鍼。甚者鍼手膊上側陷中。卽蝦蟆肉上。惺惺穴。或

三里。卽甦。若起鍼壞人。

門入

入浴暈倒。

本朝經驗

以冷水噴面。及撓周身。苦酒一鍾。灌口鼻中。或醒後。衄者。

蘇子降氣湯。調辰砂末飲之。

苓朮湯。

三因

治暑濕鬱發。或入浴暈倒。口眼喎邪。手足彈曳。皆濕溫類也。

附子

茯苓

白朮

乾薑

澤瀉

桂心

右等分。水煎服。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈遍照其身。若是小瘡。卽是其毒。宜急用萬靈

奪命丹之類。

傷寒大全。方出疔瘡門。

中惡門

朱犀散。

得効

治中惡中忤鬼氣。其證暮夜或登廁。或出郊野。或遊空冷屋室。

或人所不至之地。忽然眼見鬼物。鼻口吸着惡氣。驀然倒地。四肢厥冷。

兩手握拳。鼻口出清血。性命發巡。須臾不救。此證與尸厥同。但腹不鳴。

心脇俱暖。凡切勿移動其屍。卽令親戚圍繞。燒麝香安息香樟木之類。

直候醒知事。方可移歸。

犀角末錢五

麝香

硃砂各二錢半

右爲末。每服二錢。井水調下。如無前藥。用雄黃末。服一錢。煎桃枝湯調灌。

走馬湯金匱附方療中惡心痛腹脹大便不通。

杏仁二枚

巴豆二枚

右二味。以綿纏。搥令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊。

又方外臺仰臥以物塞兩耳。以兩個竹筒。內死人鼻中。使兩人痛吹之。塞口

傍無令氣得出。半日所死人噫噫。勿復吹也。

又方肘後灸兩足大拇指上甲後聚毛中。各灸二七壯。卽愈。又方。灸右肩

高骨上。隨年壯良。

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。昏不知人。卽是卒厥客忤。飛尸鬼擊。弔死問喪。入廟登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。方見中風候稍甦。服調

氣平胃散。要訣

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二兩

藿香

甘草各八兩

砂仁四兩

蒼朮八兩

厚朴

陳皮各二兩

右姜棗水煎入鹽十捻。

五絕死門

療五絕死方

金千

夫五絕者。一曰自縊。二曰墻壁壓走。三曰溺水。四曰斃寐。

五曰產乳絕。皆取半夏一兩。細下篩。吹一大豆許。內鼻中。卽活。心下溫

者。一日亦可活。

案夷堅續志。孫無病卒死。爲六絕死。亦主此方。又醫說。載劉大丞晚陵夏細末一大豆許。納鼻中良久身微暖。氣更甦。人問卒死大丞單方半夏。如何得活死人。答曰。此南岳魏夫人方。○此方三因。名半夏散。療五絕及諸暴絕證。

救自縊死法

金千

旦至暮。雖已冷必可療。暮至旦。小難也。恐此當言陰氣盛

故也。然夏時夜短於晝。又熱。猶應可療。又云。心下若微溫者。一日以上

醫學心悟曰。予嘗見自縊至旦。猶可活。而猶救活者。不可輕棄也。

徐徐抱解。不得截繩。上下安被臥之。一

人以腳踏其兩肩。手少挽其髮。常弦弦勿縱之。一人以手按揉胸上。數

動之。一人摩捋臂脛屈伸之。若已僵。但漸漸強屈之。并按其腹。如此一

炊頃。氣從口出。呼吸眼開。而猶引按莫置。亦勿苦勞之。須令可少桂湯。

及粥清令與之。令濡喉。漸漸能嚥。乃稍止。兼令兩人。以兩管吹其兩耳。

彌好。

千金云。以麝餅覆口。鼻。兩人吹其兩耳。

此法最善。無不活也。

又方。皂莢末。葱葉吹其兩鼻孔中。逆出復內之。又方。以藍青汁灌之。

又極須安定身心。徐徐緩解。慎勿割繩。抱取心下猶溫者。刺鷄冠血滴

口中。卽活。男用雌鷄。女用雄鷄。又方。鷄屎白。以棗許酒半盞和。灌口

口中。卽活。男用雌鷄。女用雄鷄。又方。鷄屎白。以棗許酒半盞和。灌口

鼻中卽活。又方。梁上塵。如大豆。各內一筒中。四人各一筒。同時吹兩耳鼻中。極力吹之。

又方

顧體集

凡自縊之人。若繩細痕深者。最稱難救。須急令人抱。將結解開。

切勿割斷繩子。以手揉其項痕。撚圓氣管。并摩按胸腹。或用手捫其口鼻。或用口對口接氣。令一人以腳踏其兩肩。手挽其髮。常令扯急。不可使頭低下。再令一人。以膝蓋或手厚裹衣服。緊緊抵住穀道。婦人并抵陰戶。勿令泄氣。若手脚已經僵直。必須盤曲。如僧打坐之狀。急以兩管吹其兩耳。再碾生半夏末皂角末。吹入鼻孔。以針尖刺鼻下人中穴。以艾灸脚心湧泉穴。男左女右。各三醺。男刺雌雞冠血。女刺雄雞冠血。滴入口中。以安心神。再以薑湯化蘇合丸灌之。如無蘇合丸。以濃薑湯灌之。其一切治法。必待氣從口出。呼吸眼開。方可歇手。甦醒後。只宜少飲粥湯。潤其咽喉。不可驟與飯食。依此拯救。再無不活之理。

傷醫大全云。必須心口尚溫。大便

便未下。舌未伸出者救治。

又方

管氏五絕治法

徐徐放下。將喉氣管捻圓。揪髮向上揉擦。用口對口接氣。糞門

用火筒吹之。以半夏皂角搐鼻。以薑汁調蘇合香丸灌之。或煎木香細辛湯調灌亦得。如甦可治。繩小痕深過時身冷者不治。

用救法活。却用降氣湯三和湯蘇合香丸灌之。

居家必用

救壓死法因三以死人安著。將手袖掩其口鼻眼上一食頃活。眼開。仍與熱小便。若初覺氣絕而不能言。可急劈口開。以熱小便灌之。打撲者亦用此。

療壓死及墜跌死。心頭溫者。

奇效單方

急扶起。將手提其髮。用半夏末吹入鼻

內。少甦。以薑汁同香油。打勻灌之。次取藥服。

又方

萬全續方

以雄雞一隻刺血。以好酒一碗。攪勻熱飲。外用連根葱炒爛傳

上包裹之。冷再換。

餘當與顛撲門互考。

救溺死法

金匱

取竈中灰兩石餘。以埋人。從頭至足。水出七孔即活。李時珍云。用竈灰一石

埋之。從頭至足。惟露七孔。良久即甦。凡溺溺水死。試以灰埋之。少頃即便活甚驗。蓋灰性暖。而能拔水也。

又方

肘後

取甕傾之。以死者伏甕上。令口臨甕口。以蘆火二七把。燒甕中。當

死人心下。令煙出。少入死者鼻口中。鼻口中水出盡則活。蘆盡更益爲

之。取活而止。常以手候死人身及甕。勿令甚熱。冬天常令火氣能使死

人心下足得煖。若卒無甕。可就岸穿地。令如甕。燒之令煖。乃以死人著

上亦可。又方便脫取煖釜覆之。取溺人伏上。腹中出水。便活也。

又方

千金

屈兩脚。著生人兩肩上。死人背向生人背。即負持行走。吐出水。便

活。又方。解死人衣。灸臍中。凡落水經一宿。猶可活。又方。綿裹皂筴。

內下部中。須臾出水。又裹石灰。內下部中。水出盡則活。

又方

得効

用酒壘一箇。以紙錢一把。燒放壘中。急以壘口覆溺水人口面上。

或臍上冷。則再燒紙錢於壘內。覆口面臍上去水。即活。奈人不諳曉。多

以爲氣絕。而不與救療。可憐。

又方

奇効
單方

將醋半盞灌鼻中。

案本朝經驗。用熱醋一碗。奇効。

凡遇溺水者。視其心坎尚溫。以圓器覆地下。置門一扇於上。令溺者仰臥。

以鴨血灌之口中。或大小便出水。即甦。

廣筆記

凡人溺水。往往壁泥覆罨。或倒提出水。皆未全驗。惟用鹽。不拘多少。使強

有力者。自頂及踵。四肢腹背用力摩擦。須臾水自百毛孔中出。良久。康

消氣甦。雖過時可活。

博聞類纂

又方

本朝典藥方

雄鷄冠血。將一茶鍾灌之。少頃水出。即活。神驗。

凡水溺之人。夏月可救。冬天難救。撈起時。切勿倒控。急急將口撬開。橫啣

筋一雙。使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末。吹其鼻孔。皂角末置

管中。吹其穀道。如係夏月。用牛一隻。將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊

使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水。自然從口中并大小便流出。再用

蘇合丸。化開灌之。或生薑汁灌之。若無牛。以活人仰臥。令溺人如前將

肚皮橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時無牛。兼活

人不肯拯救。或覆鍋一口。將溺人覆於鍋上。亦可。如係冬月。急將濕衣

解去。一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於上。肚下墊以縣枕一個。仍以灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰暍於眼內。其搗口啣筋。灌蘇合丸。生薑湯。吹耳鼻穀道等事。俱照夏天救法。冬天醒後。宜少飲溫酒。夏天甦醒後。宜少飲粥湯。顧體集

溺水死。若五孔有血者。不活。五絕療法

救魘死法

肘後

臥忽不寤。勿以火照之。殺人。但痛齧其腳踵。及足拇指甲際。

而多唾其面。則覺也。又方。皂莢末。以竹筒吹兩鼻孔中。即起。又方。

以蘆管吹兩耳。

又方

外壺

以鹽湯飲之。多少任意。又方。雄黃細篩。管吹兩鼻中。

又方

千金翼

灸兩足大指聚毛中。二十一壯。

救魘死。不得着燈火照。亦不得近前急喚。多殺人。若原有燈。即存。得効○醫學心悟云。

臥處原有燈。則存。如無燈。切不可遠點燈耳。

雄朱散

得效

治魘死。其證初到客舍。或館驛。及久無人居冷房中。睡覺鬼物

魘魅。或聞其人吃吃作聲。便令人叫喚。如叫不醒者。此乃鬼魘。須臾不

救即死。

牛黃

雄黃各一錢

硃砂半錢