

百代医宗

五

永樂太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古養論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法

上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌

五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣

十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧

五運主病切要

六氣為病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天千臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法

用藥根身稍三法

五味用法

五入五走

五多五傷

煮煉鹿角霜膠法

辯用硝黃巴豆誤人論

治十腫水氣病根主藥

丙集卷之三

風論

該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論

暑論

附注夏論

濕論

燥論

火論

六鬱論

痰論

咳嗽論

哮論

喘論

丁集卷之四

癰論

痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論

水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論

癥瘕論

虛損論

癆瘵論

怔忡論

顛狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論

秘結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論

翻胃膈噎論

頭痛論

腹痛論

腰痛論

腸痛論

胸氣論

痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

三消論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論

便濁遺精論

新增漏濁論

已集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論

嘈雜論

痞滿論

邪崇論

眩暈論

惡心論

惡寒論

發熱論

諸氣論

丹溪活套云

傷食論附傷酒方

關格論

結核論

梅核論

癘風論

跌撲傷損論附金瘡湯火等瘡

破傷風論

心痛胃脘痛論

注夏論

胃風論

脫肛論

腸風臟毒論

痼冷論

與集卷之七

耳論

鼻論

口舌唇三論

丹溪活套

牙齒論

面論

咽喉論

目疾証候

眼科所用藥性

目論

各臟所屬宜用某方并附詩訣

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法

點眼藥訣

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

疝瘕論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血分水分論

產後血法病機要畧

謹按伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癢陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛奎亭秘書

頸項強痛論

流注論

赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌

小兒科論

五癰論

諸疳論

黃疸論方

遺尿尿濁二論

語遲牙遲行遲總論

膿耳論

癰疾論

附小兒五疳病源妙方

附錢仲陽小兒諸疳論

諸蟲論

蠱毒論

鼻病論

大小便閉論

桃生論

吐瀉論

腹脹論

啼論

解顙論

脫囊論

脫肛論

疳論

弄舌論

龜背論

癸集卷之十

痘疹論

疹論

外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症

方論

痘疽瘡瘍論

乳硬乳癰論

痔漏論

癰論

疥瘡論

楊梅瘡論

背發腦發鬚發髭發四總論

疥癬論

臙瘡論

鎖喉瘡論

發乳瘡論

赤瘡瘡論

纏腸瘡論

骨槽風瘡論

五疳論

火赤瘡論

魚脊瘡論

喉閉瘡論

火殞瘡論

鴉跖瘡論

紅絲瘡論

陰蝕瘡論

漏睛瘡論

新刊大醫院頒行內外諸科百代醫宗十卷目錄終

太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗卷之五

金谿 省吾 徐紳 著述

太醫院醫官

繡谷 振吾 張文英 泰訂

金陵 少泉 李潮 刻行

剛柔二症論

夫瘧有陰陽二症有汗曰柔瘧無汗曰剛瘧又曰剛為陽瘧柔為陰瘧故
大抵剛柔二症先傷風又感寒濕致之正所謂虛極生熱熱極生風之
甚者也傷風發熱頭痛汗出或由嘔逆汗之必發瘧病濕家發汗稍遲
亦作瘧病婦人新產血虛汗出傷風發瘧無疑矣項背強直身反張
頭掣口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏病在足太陽經其或
牙緊手撒痰涎壅盛昏潰煩渴小便赤澀先識語而發者此剛瘧也其
或便滑洩不渴不語先手足冷而發者此柔瘧也剛瘧為之發汗柔瘧
為鮮肌金以小續命湯剛瘧去附子用麻黃柔瘧用附子去麻黃大便

利而厥逆者用熟附子佐之其間身體壯熱語口乾手足反微寒太
便反滑洩此爲剛柔不分之症可用生附子小續命主之剛症用黃葛
根湯柔症桂枝湯善治瘧者不可專作風治而用風藥反燥其血
而致不收矣大抵與癰病相似而尤甚者是氣虛有火兼痰宜用人參
竹瀝之類所以瘧發通身戰掉角弓反張渾身強直皆曰氣虛挾痰火
所致正猶火炎而旋轉火能燥物而使氣液之不足世俗多有不識者
誤作風症治之而用風藥風能勝濕是不足之中而又見槓也此病只
宜補氣液而散痰火故仲景曰剛柔二症不可不辯蓋剛爲陽瘧柔爲
陰瘧太陽惡熱無汗惡寒脈且強長胸滿口噤手足挛急咬牙甚則搗
搗用弓反張此爲剛瘧太陽微熱身汗不惡寒脈且遲細四肢不收時
時搗搗開目含口此爲柔瘧多是風濕鬱於太陽之經亦有輕重之分
又有諸虛之候亦能成此瘧病表虛不任風寒亦能作此症候或跌撲
瘡癰一切去血太多皆能成此疾也是乃虛爲本而風爲標耳古人云

芳風卽瘧之屬強上者是角弓反張也宜總者目開不見其物也所謂
剛柔二瘧者當以虛實論之一屬外感一屬內傷其外感者屬剛瘧其
內傷者爲柔瘧剛瘧者宜用麻黃葛根湯枯薑桂枝湯小續命湯在裏
者大承氣湯之類柔瘧者宜用補中益氣湯八物湯四物湯之類皆見
一婦八月經頻數忽然發瘧口噤手足牽縮角弓反張是去血過多風
邪乘虛而入用四物湯加防風荆芥羌活少加附子引經六貼而愈姑
錄之傳爲一驗業醫者又當參補

活人舉卿散 治新產血虛發瘧者

荆芥穗不拘多少發炒爲末每服三五錢外以大黃豆卷以熱酒沃
之去黃卷用汁調下效如神

活人葛根湯 治太陽病無汗而小便或上氣上衝胸口噤不得欲作剛

瘧之症 方見寒門

大承氣湯 治剛瘧大便實熱

方見傷寒門

防風當歸散

治發汗過多發熱頭搖口噤背脊反張

防風

當歸

川芎

生地黃

各二錢五分

右切一劑白水煎服

括婁桂枝湯

治太陽傷寒成症

括婁根

甘草炙

各二兩

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

大棗

十二枚

右六味作一服用水九升煮取三升作三服連進取微汗如無汗時用煮棗粥發之

麻黃葛根湯

治剛瘧無汗惡寒

麻黃

赤芍

各三錢

干葛

四錢五分

豆豉

半合

右切一劑煮煎熱服取汗

防風當歸散

治發汗太多發熱頭搖口噤反張身者宜祛風養血

防風

當歸

川芎

地黃

各二錢五分

右切一劑煎服

小續命湯 治剛柔二瘧 方見中風門

當歸補血湯 治一切去血太多 曰無血養筋 令人四肢攣急 口噤 切

黃芪 一兩 當歸 五錢 右切一劑煎服

挾風加防風羌活荆芥各一錢甘草五分黃芪減半

枝葛根湯 治柔瘧有汗

桂枝 芍藥 甘草 各六錢 葛根 二兩 生薑 一兩

大棗 四枚 右切每劑五錢煎服

理中湯 治柔瘧厥冷自汗

人參 川白薑 炮 甘草 白朮 各等分

右為末每用三字煎服

二生飲 治柔瘧自汗肢體厥冷

南星 川烏 生 附子 各五錢 本香 一分

右作散每用一錢生薑五片水煎服

翻胃膈噎論

蓋翻胃之症朝食暮吐暮食朝吐或食罷卽吐是也謂膈者五膈是也憂
患寒熱氣之五者謂噎者有五噎也憂思勞食氣者是也膈者在心膈
之間上下不通若拒隔之狀或結於咽喉之傍時覺有碍吐之不出然
之不下由氣鬱痰搏而然久則漸妨飲食而爲膈症矣噎者飲食之際
氣卒阻滯飲食不能順下而爲噎症明矣又所謂翻胃膈噎三者之症
曰火而成其來有漸思慮過度動於脾火者忿怒過度動於肝火者
食煎燖動於胃火者淫慾忘反動於腎火者只曰火炎於上薰蒸津液
而成痰疾初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得順流所以爲膈爲噎久
而痰火已結胃之上脘不開飲食須進而痰火壅塞停滯膈間須更復
出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良久方出謂之
翻胃丹溪曰年高氣血俱衰者不可治也昔少年氣血未虛以藥劫法

痰火病尚可治老年氣血已虛再用藥劫之痰火雖得暫愈其病復發
難治所以氣虛則不能運化以生痰血虛則不能滋潤而生火固結此
症決不可用香燥之藥蓋香能散氣燥能耗血且此疾屬於熱燥固不
宜用極爲當也鈎玄云翻胃大約有四血虛氣虛有痰有熱血虛者脈
必數而無力以四物湯養血爲主氣虛者脈必緩而無力以四君子補
氣爲主有痰者脈必滑數以二陳湯有主有熱者脈必數而有力以鮮
毒湯爲主大法當養血生津清痰降火潤燥補脾抑肝開鬱其病自安
張鷟峰曰噎是神思間病惟內觀以自養可也一凡膈噎翻胃三者宜
用二陳湯加竹瀝薑汁童便韭汁之類可爲主治或暮食朝吐朝食暮
吐食下須臾卽吐者此是胃可容受而脾不能運化傳送或大小腸閉
而不通食返而上奔者有之矣加酒蒸大黃以潤之脾不磨者以神
山查枳實以助其化之機又有氣虛肥白之人膈噎者宜四君子湯加
竹瀝薑汁是爲要藥其間有七情鬱結而成氣噎者以香附撫芎木香

欖櫚括婁砂仁之類飲酒太過而傷之者以砂糖驟尿共而服之腸
大便燥結者用大黃乃急則治標之法仍用四物湯加童便薑汁及
牛羊之乳亦爲上策如氣血虛甚者口多沫必死之兆大便如羊
者亦不治也大腸無血故也又考內經曰三陽結謂之膈三陽者大小
腸膀胱是也結者熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能
膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後二便閉塞下既不通必反而上行
所以噎食不下縱下而復出之也此陽火不下降而上行也所謂噎膈
翻胃大抵是血液乾涸其或咽喉室塞食不能下其稿在吸門其或食
下胃脘當心作痛須臾吐出食出痛止其稿在賁門此上焦之膈噎也
其或食物可下良久復出稿在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐
暮食朝吐其稿在闌門大小腸之間此下焦之膈噎也前所云血液俱
耗胃脘乾稿其稿在上近咽之下水飲可行硬物難入間或可入食亦
不多名之曰噎其稿在下與胃爲近食須可下難盡入胃良久復出名

曰膈亦曰翻胃名須不同病出一體又曰噎病生於血乾血屬陰也
土乎靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自生腸
胃津液傳化合宜何噎病之有醫者當知此意切不可用燥熱之藥以
火濟火則何異以挺劍而殺人耶慎之慎之

十膈氣散 治十般膈氣漸成翻胃

人參

白茯苓

官桂

枳壳

神麴

炒

麥芽

乾生薑

訶子

三稜

莪朮

陳皮

甘草

白朮

各一兩

厚朴

檳榔

木香

各五錢

右為末每服二錢薑少許入白湯調下

養胃散

治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

人參

砂仁

丁香

白豆蔻

附子

炮

沉香

陳皮

肉豆蔻

麥芽

神麴

甘草

各二錢五分

右為末每服二錢薑湯調下