

六經脈證

吳江徐靈胎洄溪著

欲讀傷寒論。必先識六經之本證。然後論中所稱太陽陽明等證。其源流變態形色脈象當一一備

記了然於心。然後其症之分併疑似及用藥加減異同之故。可以瞭然。不致眩惑貽誤。故備錄於左。

太陽病。脈浮。頭項強痛而惡寒。

尺寸俱浮者。太陽受病也。其脈上連風府。故頭項痛腰脊強。

發熱汗出惡風。脈緩者。名曰中風。

惡寒體痛嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。

發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七。陰數

六也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。惡寒未離太陽也

陽明病若能食。名中風。不能食。名中寒。尺寸俱長者。陽明受病也。其脈俠鼻絡於目。故身熱目疼鼻乾

不得卧。

陽明外證。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。

陽明脈大。以上皆陽明之經病

有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。太陽陽明者。脾約是也。

少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。

陽明之為病。胃家實也。此乃正陽陽明

陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明病也。



六經脈證

吳江徐靈胎回溪著

欲讀傷寒論。必先識六經之本證。然後論中所稱太陽陽明等證。其源流變態形色脈象。當一一備

記了然於心。然後其証之分併疑似。及用藥加減異同之故。可以瞭然。不致眩惑貽誤。故備錄於左。

太陽病。脈浮。頭項強痛而惡寒。

尺寸俱浮者。太陽受病也。其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強。

發熱。汗出惡風。脈緩者。名曰中風。

惡寒體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。

發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七。陰數

六也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。惡寒未離太陽也

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。尺寸俱長者。陽明受病也。其脈俠鼻絡於目。故身熱目疼鼻乾

不得臥。

陽明外證。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。

陽明脈大。明以上皆陽之經病

有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。太陽陽明者。脾約是也。

少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。

陽明之為病。胃家實也。此乃正陽陽明

陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明病也。



少陽之為病。口苦。舌乾。目眩也。

尺寸俱弦者。少陽受病也。其脈循脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。

少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿而煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒。脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠。睡目合則汗。內熱已極

傷寒六七日。無大熱。外熱輕則內熱重其人煩躁者。此為陽去入陰也。

傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此為三陰不受邪也。

太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。

尺寸俱沉細者。太陰受病也。其脈布胃中。絡於噎。故腹滿而噎乾。

傷寒。脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。自利不渴者。屬太陰。以藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。少陰自利

而渴。寒在下焦也。此自利不渴。寒在中焦也。

少陰之為病。脈微細。但欲寐也。衛氣行於陽則陷行於陰則寐

少陰病。欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰。

尺寸俱沉者。少陰受病也。以其脈貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。

厥陰之為病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐衄。下之利不止。

尺寸俱微緩者。厥陰受病也。以其脈循陰器。絡於肝。故煩滿而囊縮。

厥陰中風。脈微浮為欲愈。不浮為未愈。

別症變症 附刺法



傷寒本症之外。有別症。有變症。別症者。其病與傷寒相類。而實非傷寒。是也。變症者。傷寒本不當有此症。或因遷延時日。或因雜藥誤投。其病變態百出。是也。其症不備。則必驚疑淆惑。而無所措手。故備錄之。庶不致臨症徬徨。

藏結

冷結

除中

伏氣

晚發

症當作瘕溼

風溼

風溼

溫疫

溫疫

溫毒

暍

陰毒

陽毒

溫病

熱病

兩感

風溫

溫疫

溫疫

脚氣

多眠

狐惑

百合

藏厥

見烏梅

尸厥

見刺

法

法

藏結

藏結如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈浮。關脈小。細沉緊。名曰藏結。舌上白苔。滑者難治。

藏結無陽症。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病脇下有痞。連在臍旁。痛引少腹。入陰經者。此名藏結死。

藏結與胸結。皆下後邪氣乘虛入裏所致。熱多與陽明相結。為結胸。寒多與陰相結。為藏結。故所現脈症。皆為陰象。舌上胎滑。則上焦亦寒。全無陽象。故曰難治。曰不可攻。然猶有治法。至素有痞疾。則中氣已傷。連及臍旁。少腹。并入陰經。則上下俱病。陰極陽竭。不死何待。

冷結

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛者。此冷結在臍臑關元也。

除中

傷寒脈遲。六七日。而反與黃芩湯。徹其熱。脈遲為寒。今與黃芩湯。復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反

能食。此名除中。必死。

微則為效。效則吐逆。下之則效止。而利因不休。利不休則胸中如蟲齧。粥入則出。小便利。兩脇拘急。



喘息為難頸背相引。臂則不仁。極寒反汗出身冷若冰。眼睛不慧。語言不休而穀氣多入。此為除中。口雖欲言。舌不得前。

傷寒始發熱。六日厥反九日而利。凡厥利者當不能食。今反能食。恐為除中。此病無治法

伏氣

伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脈之。若脈微弱。當喉中痛。似傷寒。喉痺也。病人云。實咽中痛。雖爾。今復欲下痢。活人書云。伏氣之病。謂非時有暴寒中人。傷於少陰。脾之病。次必下利。始用半夏桂枝甘草湯。主之。始不竟病。旬月乃發。服微瀉。法先咽中痛。似傷寒。非謂之腎傷寒也。○甘草半夏桂枝心等分。每服四錢。七逆散。主之。此病。只二日便愈。古方。

晚發

脈陰陽俱緊。至於吐利。其脈獨不解。緊去人安。此為欲解。若脈遲至六七日。不欲食。此為晚發。水停

故也。為未解。食自可者。為欲解。活人書云。傷寒病。三月至夏為晚發。

瘥當作瘥

太陽病。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛瘥。金匱治剛瘥。用葛根湯。大承氣湯。○湯俱見前。

太陽病。發熱汗出不惡寒者。名曰柔瘥。桂枝湯。加括婁根二兩。即

太陽發汗太多。因致瘥。

太陽發熱。脈沉而細者。名曰瘥。此言瘥脈。

病身熱足寒。頸項強急。惡寒時頭熱面赤。目脈赤獨頭搖。卒口噤背反張者。瘥病也。此言瘥象。

溼

太陽病。關節疼痛而煩。脈沉而細者。此名溼痺之候。其人小便不利。大便反快。但當利其小便。



溼家之為病。一身盡發熱。身色如似薰黃。

溼家下之。額上汗出。微喘。小便利者死。若下利不止者。亦死。

溼家下之。其人但頭汗出。背強。欲得被覆向火。若下之。早則噦。胸滿。小便利。舌上如胎者。以丹田有熱。胸中有寒。渴欲得水而不能飲。則口燥煩也。

溼家病。身上疼痛發熱。面黃而喘。頭痛鼻塞而煩。其脈大。自能飲食。腹中和無病。病在頭中寒溼。故鼻塞。內藥鼻中則愈。

風溼

問曰。風溼相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此可發汗。汗之不愈者。何也。答曰。發其汗。汗大出者。但風氣去。溼氣在。是故不愈也。若治風溼者。發其汗。但微微似欲汗出者。風溼俱

去也。此言治法

病者。一身盡疼痛。發熱。日晡所劇者。此名風溼。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。風溼脈浮。肢體痛重。不可轉側。額上微汗。不欲去被。或身微腫。

溼溫

兩脛逆冷。胸腹滿。多汗。頭目痛苦。妄言。其脈陽濡而弱。陰小而急。不可發汗。治在太陰。見活人書

溫毒

冬時觸冒疹毒。至春始發。肌肉發斑。癰疹如錦紋。或咳嗽心悶。但嘔清汁。見活人書

暍

太陽中熱者。暍是也。其人汗出惡寒。身熱而暍也。

太陽中暍者。身熱疼重。而脈微弱。此亦夏月傷冷水。水行皮中所致也。

太陽中暍者。發熱惡寒。身重而疼痛。其脈弦細。乳遲。小便已。灑灑然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開。前板齒燥。若發汗。則惡寒甚。加溫針。則發熱甚。數下之。則淋甚。

陰毒

手足厥冷。背強。臍腹築痛。咽痛。短氣。嘔吐。下利。身如被杖。或冷汗煩渴。或甲指。面色青黑。煩躁而渴。脈沉細欲絕。而一息七至。宜灸氣海。丹田三二百壯。或葱熨臍中。氣海在臍下一寸五分。丹田在臍下二寸五分。

陽毒

發躁狂走。妄言。面赤。咽痛。身斑斑若錦紋。或下利赤黃。脈洪實滑促。或舌卷焦黑。鼻中如煙煤。宜

用布漬冷水。搭於胸上。蒸熱數換。活人書法

溫病

冬時受寒。藏於肌膚。至春而發。

熱病

寒氣至夏而發。俱與傷寒相似。

兩感

太陽與少陰 陽明與太陰 少陽與厥陰

風溫

其人素傷於風。因復傷熱。其脈尺寸俱浮。頭疼身熱。常自汗出。體重而喘。四肢不收。嘿嘿但欲眠。發汗則譫語煩躁。狀若驚癇。



溫疫

一歲之中。男女老少之疾相似。其狀不一。

脚氣

頭疼身熱。肢體痛。大便秘。嘔逆。脚屈弱。

多眠

有風溫症。有少陰症。有小柴胡證。有狐惑症。

狐惑

此症治法詳金匱

狀如傷寒。或傷寒後症。默默欲眠。目不能閉。不欲飲食。面目乍白乍赤。乍黑。蟲食其喉。為惑。其聲啞。蝕其肛為狐。其咽乾爛見五臟則死。當視其脣上脣有瘡。蟲食其臟。下脣有瘡。蟲食其肛。多因下利。而得溼蟲之病。亦相似。

百合

此症詳金匱治法亦備

此亦傷寒變症。百脈一宗。悉致其病。百脈一宗。乃肺病也。故金匱用百合治之。其狀欲食復不能食。默默欲卧復不能卧。欲行復不能行。飲食或有美時。或有惡聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。小便赤。藥入口即吐。如有神靈者。

刺法

古聖人治病之法。針灸為先。靈素所論。皆為鍼灸而設。即治傷寒。亦皆用鍼刺。熱病篇所載是也。至仲景專以湯劑治傷寒。尤為變化神妙。然亦有湯劑所必不能愈。而必用刺者。仲景亦不能舍此而為治。後人豈可不知。故另考明諸穴。以附於後。



北京中醫藥大學圖書館藏

尸厥

少陰脈不至。腎氣微。少精血。奔氣促迫。上入胸膈。室氣及聚血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。令身不仁。此為尸厥。當刺期門。巨闕。見平脈法

期門二穴。在第二肋端。不容穴傍。各一寸五分。上直兩乳。足太陰厥陰陰維之會。舉臂取之。刺入四分。灸五壯。肝募也。

巨闕一穴。在鳩尾下一寸。任脈氣所發。刺入六分。留七呼。灸五壯。心募也。

傷寒腹滿。讞語。寸口脈浮而緊。此肝乘脾也。名曰縱。刺期門。縱者。寬其所勝。故縱不收也。

傷寒發熱。當發惡寒。大渴欲飲水。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此肝乘肺也。名曰橫。刺期門。橫者。犯其所不勝。橫逆犯上也。刺期門。皆所以洩肝之盛氣。期門穴見前。

太陽與少陰併病。頭頸強痛。或眩冒。時如結胸。心下痞鞭者。當刺大椎第一間。肺俞。肝俞。慎不可發汗。發汗則讞語。脈弦五六日。讞語不止。刺期門。

大椎一穴。在第一椎陷者中。三陽督脈之會。刺入五分。灸九壯。

肺俞二穴。在第三椎下兩旁。各一寸五分。刺入三分。留七呼。灸三壯。

肝俞二穴。在第九椎下兩旁。各一寸五分。留六呼。灸三壯。

太陽少陽併病。心下鞭。頸項強而眩者。當刺大椎。肺俞。肝俞。慎勿下之。

陽明病。下血。讞語者。此為熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其熱而瀉之。濺然汗出者愈。此男子熱入血室之症。婦人亦有之。見小柴胡條下。

凡治溫病。可刺五十九穴。

小柴胡條下。



內經熱俞五十九頭上五行行五者以是言陽之氣通也。大椎肩髃曲池肘髎手五里足三里陽谿中渚外關足陽明。此八者以瀉胃中之熱也。雲門髃骨委中髓空。此八者以瀉四支之熱也。五臟俞旁五此十者以瀉五臟之也。凡此五十九穴者皆熱之左右也。



此方乃治一切...
 一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...
 六、...
 七、...
 八、...
 九、...
 十、...
 十一、...
 十二、...
 十三、...
 十四、...
 十五、...
 十六、...
 十七、...
 十八、...
 十九、...
 二十、...
 二十一、...
 二十二、...
 二十三、...
 二十四、...
 二十五、...
 二十六、...
 二十七、...
 二十八、...
 二十九、...
 三十、...
 三十一、...
 三十二、...
 三十三、...
 三十四、...
 三十五、...
 三十六、...
 三十七、...
 三十八、...
 三十九、...
 四十、...
 四十一、...
 四十二、...
 四十三、...
 四十四、...
 四十五、...
 四十六、...
 四十七、...
 四十八、...
 四十九、...
 五十、...
 五十一、...
 五十二、...
 五十三、...
 五十四、...
 五十五、...
 五十六、...
 五十七、...
 五十八、...
 五十九、...
 六十、...
 六十一、...
 六十二、...
 六十三、...
 六十四、...
 六十五、...
 六十六、...
 六十七、...
 六十八、...
 六十九、...
 七十、...
 七十一、...
 七十二、...
 七十三、...
 七十四、...
 七十五、...
 七十六、...
 七十七、...
 七十八、...
 七十九、...
 八十、...
 八十一、...
 八十二、...
 八十三、...
 八十四、...
 八十五、...
 八十六、...
 八十七、...
 八十八、...
 八十九、...
 九十、...
 九十一、...
 九十二、...
 九十三、...
 九十四、...
 九十五、...
 九十六、...
 九十七、...
 九十八、...
 九十九、...
 一百、...



古鑑總論

舌白總論

舌乃心苗心屬火其色赤心居肺內肺屬金其色白舌故當舌地淡紅舌胎微白而紅必紅潤內充白必胎微不厚或畧厚有花然皆乾濕得中不滑不燥斯為無病之舌乃火藏金內之象也一經傷寒白胎必滑傷溫傷寒紅光必外露矣是以凡治傷寒苟能盡解其所傷之邪而不脫其胎本來之白此善能使邪正分局元津元氣無傷焉其溫病熱病之舌亦必使紅色漸斂漸淡白胎漸有漸生此邪熱始得外越而元陰日漸內充也當知紅乃藏氣所蘊所發白為津液所布所結耳夫傷寒邪犯皮毛舌上先有白沫繼則白涎白滑再後則白屑白砂甚則白疱白疳有舌中舌夫舌根之不同見寒邪入裡之淺深微甚即元氣之厚薄邪熱之輕重從此可測矣蓋舌固心之苗心屬南方火其色本當赤今反見白胎滑甚者是火不制金乃水來尅火之象故稱大病其寒鬱皮膚毛竅不得疎通陽氣不得外發故惡寒發熱在太陽時頭痛身疼項背強腰脊痛至陽明經則有白屑滿舌證雖煩躁脈如浮緊猶當汗之係少陽者白滑不滑小柴胡湯和之胃虛白胎滑甚者理中湯加桂枝托之邊白中黃大柴胡小承氣分輕重下之白胎亦有死症者即水來尅火之賊邪也其溫病熱病實由火燔金傷元陰告匱劇症藏氣安危皆關驗舌虛實寒熱之機一一分別圖論於左

舌黃總論

黃胎者裡證也傷寒初病無此邪係少陽亦無此舌直至陽明府實胃中火盛或邪遏胃虛土氣洋溢均能見此有微黃不滑有深黃胎尚滑甚則乾黃焦黃也種種不同當分輕重治之夫微黃不滑者火初入胃宜清解梔子豉湯主之深黃胎尚滑者乃邪鬱胃虛熱迫於胃而土氣洋溢也宜汗解葛根解肌湯乾

黃邪雖外解火實內熾宜白虎湯焦黃土燥火炎陰液告竭宜急下調胃承氣湯若濕熱發黃則目黃如全身黃如橘茵陳蒿湯分利之至蓄血發黃在上焦犀角地黃湯中焦桃仁承氣湯下焦代抵當湯然必大熱不解大渴飲水或漱水不欲嚥及便秘譫語痞結自利方可議清議汗議下若胃虛黃者外溢又當補中而佐以和解大抵古黃證雖重劇脈長是中氣有權為可治如黃中見黑脈急弦細為求土無氣必不可治矣

舌黑總論

傷寒五七日古見黑胎者最為危候邪熱在表無此如一二日間獨見黑舌此心腎之氣敗絕於內藏之直色外見於舌黑獨見而赤不見者水能滅火為必死也若白胎上漸漸中心黑者是傷寒邪熱傳裡之候紅舌上漸漸有黑心者乃濕熱疫癘傳變壞症將至也蓋舌色本赤今反見黑者是水來尅火水極似火火過炭黑之理然有純黑有黑暈有芒刺不膈辦更有辦底紅辦底黑之不同大抵失黑猶輕根黑最重如全黑者總有神丹萬難救療也

舌灰色總論

灰色舌胎有陰陽之異寒熱之辨直中陰濕即時舌便灰色而無積胎熱傳三陰必四五日表證罷而舌變灰色黃胎也有在根在尖在中之分亦有渾舌俱灰色者大抵傳經熱症則有灰黑乾胎法當攻下泄熱以存其陰若直中三陰見灰色無胎之舌又當溫經散寒以扶其陽更有畜血證其人如狂或瞑目譫語亦有不狂不語不知人事而面黑舌灰者當分輕重以治其血切勿誤與冷水引領敗血入心而致不救也

舌紅色總論



紅色者古之正色也。古屬南方火其色。本當紅。第紅光外露不能內藏。斯為有病之舌。夫紅舌是少陰伏熱蓄於心胃。乃自裏而達於表也。仲景曰。冬傷於寒。至春變為溫病。至夏變為熱病。故古本煇紅而面色亦赤。至瘟疫之候。一方之內。老幼皆相似者。舌亦正赤。而加以積胎也。如或失治。則蘊熱內蒸。豈但舌赤而已。必古瘡疔腐爛細長。短病斯劇矣。然病有輕重。舌有微甚。且古有根。夫中下左右種種不同。皆瘟疫蘊熱之所化。以見病之淺深輕重有殊。治法亦各不相侔。當清化者。內解其毒。宜攻下者。搜滌其邪。總使元陰元氣無傷。庶不失中和之治。若論攻邪。無過達原解毒。梔子淡豉。三黃石羔。大小承氣。至於養正。又須滋陰養營。六味七味保元。左歸生脈。無疑矣。

古微醬色總論

微醬色古胎者。乃夾食傷寒。復夾濕熱。而胃氣不化。薰蒸於舌。故見此象也。傷之輕者。胎色薄。雖腹中疼痛。不至下利。惡寒者。可用桂枝湯。加枳朴橘半。便閉不通。加姜汁煮大黃。冷食不消。加乾姜草豆蔻。其胎色厚而腹痛甚。服藥不應者。必危。要知微醬色古乃老黃兼黑色。釀成。確是土邪尅水。水精不獲上榮。火土之色。故口燥唇乾。大渴不能多飲。雖應下奪。鮮有克愈者。

古紫色總論

紫色古胎者。酒後傷寒也。由大醉露臥當風。或冷飲停積不散。或已病仍飲不節。或感冒不即解散。妄用姜蔥熱藥發汗。汗雖出而酒熱留於心胞。伏於經絡。血氣不能上榮於舌。故舌見紫色。而又有微白。胎膜也。胎結古之根。長短厚薄。涎滑乾焦。種種不同。當參脈證調治之。

古藍色總論

藍色古胎。乃肝木之色。因無胃氣而發見於外也。凡病傷寒。雖經汗下。胃氣必傷。精微不能上奉。而心火

無氣胃土失其所依。肺金乏其生氣。則木寡於畏。反假濁污之氣。以上乘膈中。而胃脘之陽和頓失。故純藍之色。見於舌上也。明是金木相併。火土氣絕之候。是以必死。如舌色微藍。或畧見藍紋者。猶可溫胃強脾。調肝益肺。十中或可冀其一效。若純藍色見。確是肝木獨旺。胃失陽和。雖無劇證。必死無疑。至若病疫。其舌色青藍。或紫或醬。乃是病邪所致。然非若傷寒之藍舌。必關臟氣為死候矣。并參核之。

妊娠傷寒舌總論

妊娠傷寒。邪入經絡。古胎漸生。輕則子殞。重則母傷。枝損果必墜。母傷胎必傾。母子安危。當驗於舌。舌青面赤。子死母活。舌赤面青。母死子活。舌面俱青。母子皆死。舌面俱赤。子母皆活。活法昭昭。詳載女科指要法中。

舌胎圖說

微白薄胎舌



此無病之舌元
津元氣不厚故
見此胎

微白滑胎舌



寒邪初入太陽
頭疼身熱惡寒
舌白胎滑有深
香蘇散羌活湯
發散之

白胎畧厚舌



此胎不但無病
乃元津元氣充
厚故見此胎

薄白滑胎舌



此太陽裡症舌二
三日未得汗邪熱
深入急宜汗解或
太陽合病宜柴胡
桂枝湯汗之

吳江徐大椿著

白胎黃心舌



太陽初傳陽明府
病舌雖黃仍潤再
宜汗之胎燥腹痛
葛根湯加大黃下
之發熱嘔吐煩躁
大柴胡湯

厚白滑胎舌




病三四日其邪只
在太陽胎純白而
厚卻不乾燥證發
熱頭疼脉浮緊不
渴仍須汗解之

白胎黃邊舌



舌中白邊黃此裡
寒外熱惡寒者必
泄瀉五苓散加姜
豉惡熱敗毒散加
葛根木香

乾厚白胎舌



病四五日未汗熱
深發渴過飲生冷
停積在內營熱胃
冷發熱煩躁厥冷
胎白乾厚四逆散
加生薑淡豉