

傷寒廣要

三都
發行
書林

京都三條通升屋町

大坂心齋橋通北久太郎町

出雲寺文次郎
通北久太郎
河内屋喜兵衛

同
博
勞
則

河內屋茂兵衛

同安堂寺

秋田屋太右衛門

江戸芝神明前

岡田屋嘉七

同
日本橋通
町

山城屋佐兵衛

同
壹町目

須原屋茂兵衛

同
淺草等町
二町目

須原屋伊八

問本石町十軒店

英大助板

傷寒廣要卷第十

東都丹波元堅蒞庭撰

餘證

餘熱

傷寒病後熱不除候。此謂病已間。_下五藏尚虛。客邪未散。真氣不復。故旦暮猶有餘熱如瘧狀。_中此非真實。_上但客熱也。_{巢源}

夫傷寒後。氣血未實。藏府尚虛。餘毒之氣猶存。淹延時日不差。肌體羸瘦。肢節痠痛。壯熱增寒。心煩盜汗。上氣欬嗽。嘔逆痰涎。飲食不消。腹中癖塊。口乾舌澀。毛折骨癢。面色青黃。氣力乏弱。此皆由虛損。致成夾勞也。_聖

夫大病新瘥後血氣虛弱餘熱未盡古人所謂如大水浸牆水退則墻蘇不可犯之。但宜安卧守靜以養其氣。設或早起動勞則血氣沸騰而發熱也。蘊要

傷寒汗下後餘熱未除。或失於調攝。食不為肌。欬嗽寒熱吐血衄血。纏綿日久。狀似癆瘵。此皆元氣既虛。邪氣着而不散。例用黃連解毒湯。加柴胡枳桔。其效如神。不效然後用八物湯。兼犀角。小柴胡。前胡石膏等。隨證加減。無有不愈者。切不可純用補劑。亦不可誤認為虛損勞怯。輕用杜仲山茱萸破故紙等溫補。

之藥也。傷寒綱目

竹葉湯。治發汗後表裏虛煩。不可攻者。但當與此方。千金○案即竹葉石

膏湯。虛煩。蓋是虛熱。非煩躁之煩。

若傷寒得汗後。病解虛羸。微熱不去。可行竹葉石膏湯。活人

審知是邪熱未解。雖經汗下。却不可畏虛而養病。宜竹葉石膏

湯。要訣

竹葉湯。治傷寒大病後。心虛煩悶。內熱不解。

竹葉 麥門冬去心 人參 茯苓去皮 小麥炒

半夏湯泡七次 甘草炙半兩

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。煎至八分。去滓溫服。不

拘時候。濟生○案此本千金治產後虛渴少氣力方。今去大棗。

張文仲。療傷寒八九日不差。名為敗傷寒。諸藥不能消者方。

鼈甲炙

蜀升麻

前胡

烏梅

枳實炙

犀角屑

黃芩

各二兩

甘草

一兩炙

生地黄

八合

右九味。切。以水七升。煮取二升半。分五服。日三服。夜二服。支出

太

忌海藻。菰菜。莧菜。蕪荑。備急方同。

外臺

聖惠治壞傷

寒。經十日已來未解。熱在胃膈。煩悶不止。鼈甲散。於本方去

前胡。加柴胡。甘草半兩。餘各一兩。每服五錢。以水一大盞。煎至五分。去

滓。入生地黄汁半合。更煎一兩沸。不計時候。分溫二服。

治傷寒餘熱不退。發歇煩躁。胸膈氣滯。不思飲食。宜服柴胡散。

方。

柴胡

三分

川大黃

三分

枳殼

三分

鼈甲

三分

檳榔

三分

人參 三分

木香 三分

子芩 三分

赤芍藥 三分

赤茯苓 三分

犀角屑 三分

桑根白皮 一分

甘草 半兩

右件藥。擣篩爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至

六分。去滓。不計時候溫服。聖惠

治傷寒後夾勞。骨節煩疼。時有寒熱。欬嗽。頭目疼痛。宜服柴胡

散方。

柴胡 一兩

貝母 一分

知母 一分

人參 一分

赤芍藥 一分

石膏 一分

黃芩 三分

杏仁 一分

白朮 半兩

梔子人 半兩

鼈甲 一分

右件藥。擣篩爲散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至

五分。去滓。不計時候溫服。聖惠

治傷寒後夾勞。煩熱。四肢疼痛。不欲飲食。宜服犀角散方。

犀角屑三分 赤茯苓三分 枳殼三分 柴胡一兩 白朮三分

鼈甲一兩半 知母兩半 赤芍藥三分 甘草兩半

右件藥。搗篩為散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至

五分。不計時候溫服。聖惠

治熱病後虛勞煩熱。四肢疼痛。小便赤黃。不欲飲食。宜服柴胡

散方。

柴胡一兩 生乾地黄一兩 黃連一兩 地骨皮一兩 枳殼一分

赤茯苓一分 知母兩半 鼈甲三分 甘草兩半

右件藥。擣篩爲散。每服五錢。以水一大盞。煎至五分。去滓。不

計時候溫服。聖惠又治時氣餘熱不退。發作有時。藟藟根散。

於本方。去地黃。黃連。甘草。加藟藟根。水煎。去滓。入生地黃汁

半合。更煎一兩沸。溫服。

治熱病後虛勞。盜汗口苦。不得睡卧。四肢煩痛。舌乾卷澀。宜服

人參散方。

人參一兩 麥門冬一兩半

赤芍藥一兩 柴胡一兩

白茯苓一兩 牡蠣一兩 黃耆一兩 甘草半兩 鼈甲一兩

右件藥。擣鹿羅爲散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。

不計時候溫服。聖惠

治傷寒後。煩熱憎寒。口苦不思飲食。日漸羸瘦。羚羊角湯方。

羚羊角鉤 茈胡去苗 鼈甲去裙襴 人參各三分

知母 淡竹茹 黃耆 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩

天門冬去心焙一兩

右一十味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去

滓。食後溫服。日二。聖濟

治傷寒過經。潮熱不解。或時作寒如瘧狀。茈胡鼈甲湯方。

茈胡去苗 鼈甲去裙襴 赤茯苓去黑皮 黃芩去心

知母焙 桑根白皮剉各三分 甘草炙半兩

右七味。鹿搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生薑半分。拍碎。煎至

七分。去滓。溫服。不拘時。聖濟○此先君子加胡黃連最效。聖惠。治傷寒後

肺萎勞嗽。涕唾稠粘。骨節煩悶。發歇寒熱。鼈甲散。於本方。去

黃芩。加欵冬花。烏梅肉。梔子人。

治傷寒後胃熱引飲。煩渴不止。茯苓地黃湯方。

赤茯苓去黑皮 生乾地黃焙 栝樓根各一兩

知母焙半兩 麥門冬去心各一兩半

右五味。鹿藹節。每服五錢匕。水一盞半。入小麥一百粒。淡竹

葉三五片。棗三枚。擘破。同煎至八分。去滓。溫服。不拘時。聖濟

治傷寒百合病久不差。欲成勞。宜服柴胡散方。

柴胡一兩 知母二兩 黃連一兩 甘草三分 百合二兩

秦艽一兩

蓴蓴根一兩

右件藥。擣篩為散。每服五錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至

六分。去滓。不計時候溫服。聖惠○案此方與次方俱可移治餘熱。仍叙于此。

治傷寒百合病。經一月不解。變如渴疾。宜服百合散方。

百合一兩

蓴蓴根一兩

梔子人三分

牡蠣三分

麥門冬三分

甘草半兩

右件藥。擣鹿羅為散。每服五錢。以水一中盞。入生薑半分。竹

葉二七片。煎至六分。不計時候溫服。聖惠

乾地黃湯。婦人傷寒差後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。

乾地黃 大黃 黃連 黃芩各一兩

柴胡去蘆

白芍藥

甘草

各一兩半炙

右搗爲細末。每服抄四錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓溫

服。取溽利汗出解。

總病

歸地養營湯。壞證身熱。口渴舌胎。及舌如煨熟猪腰子。

當歸

生地

懷慶極大

鼈甲

醋炙研細

麥冬

各五錢

芍藥

青蒿

阿膠

各三錢

五味子

一錢五分

右煎成。烱化阿膠服。日二三劑。甚者。人中黃。人中白。研細。

各一錢。調服。加知母。地骨皮。苦參。亦可。虛人。加入參黃

芪。炙甘草。

患人服藥。安卧竟日。熱除渴止。

簡明醫穀

片玉云。得汗脉靜。身熱不退。是發汗太過。胃中亡津液故也。處

以生津液益氣血養胃氣之藥。或只用補中益氣湯。

治例

若已汗而熱不清。身漬漬汗出。右寸關雖弦大。按之無力。心下
不痞不飽。四肢倦怠。屬中氣弱。內傷虛熱。補中益氣湯主之。汗
止身涼爲愈。

六要

有汗下後。陰陽不相入。水火不相濟。致餘熱未退。不可更用冷

藥。內外俱未可攻。宜小建中湯。若其人已虛。虛能生熱。宜小建

中湯。加當歸一錢。或四君子湯。加黃芪半錢。或十全大補湯。調

其營衛。虛

○此恐脫甚字

者。四柱散。真武湯。

病愈後。別無他證。只微

熱未盡除。其人脾胃久虛。欠調理。脾主肌肉。故生餘熱。燥補不

宜。用理中湯。加蜜一匙許煎。

有汗下而熱不退。多用涼肌藥。

而又不退。動至半月。或兼旬者。乃是陽氣離經。不能復還。客於
皮肉之間。病此甚衆。此當調理收斂之。不可用辛熱重劑藥。要訣

遺毒

凡傷寒出汗不徹。邪熱結耳後一寸二三分。或耳下俱鞭腫者。
名曰發頤。此爲遺熱成毒之所致也。宜速消散則可。若緩則成
膿。又爲害也。蘊要

本經云。耳前後腫。刺之小差。卽發頤也。高腫有膿。爲吉。如平陷
無膿者。危。然亦有大虛之候。微腫而痛。只用溫補。或少佐以清
涼。腫自消。而頤亦不發。若必欲治頤。則真氣外脫而死矣。直解

傷寒發頤。亦名汗毒。此因原受風寒。用藥發散未盡。日久傳化。

爲熱不散。以致項之前後結腫疼痛。初起身熱口渴者。用柴胡葛根湯。清熱解毒。患上紅色熱甚者。如意金黃散敷之。初起身涼不渴者。牛蒡甘桔湯散之。患上微熱不紅疼痛者。冲和膏和之。腫深不退。欲作膿者。托裏消毒散。已潰。氣血虛弱。食少者。補中益氣湯。以此治之。未成者消。已成者潰。已潰者斂。亦爲平常

王道之法也。用之最穩。

外科正宗

柴胡葛根湯。治頤毒表散未盡。身熱不解。紅腫堅硬作痛者。

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩 桔梗 連翹

牛蒡子

石膏

各一錢

甘草

五分

升麻

三分

水二鍾。煎八分。不拘時服。

正宗

牛蒡甘桔湯。治頤毒表邪已盡。耳項結腫微熱。不紅疼痛者。

牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉 黃連 川芎

赤芍 甘草 蘇木 各一錢

水二鍾。煎八分。食後服。正

托裏消毒散

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮 茯苓

金銀花 各一錢 白芷 甘草 皂角針 桔梗 各五分

水二鍾。煎八分。食遠服。正宗○案此本外科樞要方。今去連翹加皂角針桔梗。

虛煩不眠驚悸 此虛煩與梔豉正證自異。

傷寒發汗吐下已後。府藏俱虛。而熱氣不散。故虛煩也。巢源