

金匱心典卷中

漢張仲景著

吳下尤怡在涇集註

奔豚氣病脉證治第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆驚發得之

奔豚具如下文吐膿有欬與嘔之別其從驚得之旨未詳驚怖卽驚恐蓋病從驚得而驚氣卽爲病氣也火邪見後驚悸部及傷寒太陽篇云太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圜血名爲火邪然未嘗云從驚發也驚悸篇云火邪者桂枝去芍藥加



金匱心典卷中目錄

奔豚氣病脉證治第八

胸痺心痛短氣病脉證治第九

腹滿寒疝宿食病脉證治第十

五藏風寒積聚病脉證治第十一

痰飲欬嗽病脉證治第十二

消渴小便不利淋病脉證治第十三

水氣病脉證并治第十四



金匱心典卷中

漢張仲景著

吳下尤怡在涇集註

奔豚氣病脉證治第八

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆驚發得之

奔豚具如下文吐膿有欬與嘔之別其從驚得之旨未詳驚怖卽驚恐蓋病從驚得而驚氣卽爲病氣也火邪見後驚悸部及傷寒太陽篇云太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圜血名爲火邪然未嘗云從驚發也驚悸篇云火邪者桂枝去芍藥加



蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。此亦是因火邪而發驚。
非因驚而發火邪也。卽後奔豚證治三條亦不必定。
從驚恐而得。蓋是證有雜病傷寒之異。從驚恐而得者。
雜病也。從發汗及燒鍼被寒者。傷寒也。其吐膿火邪。
二病。仲景必別有謂。姑闕之以俟知者。

或云東方肝木其病發驚駭。四部病皆以肝爲主。奔
豚驚怖皆肝自病。奔豚因驚而發病。驚怖卽驚以爲
病也。吐膿者肝移熱於胃。胃受熱而生癰膿也。火邪
者木中有火。因驚而發。發則不特自燔。且及他藏也。

忠可云此條比喻雖確然亦蹈喻氏註青龍湯之弊後之積發在腎氣借厥陰激亂而撒守在心庶幾得之

忠可云此奔豚而兼客邪者也

師曰奔豚病從少腹上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

前云驚發此兼言恐者腎傷於恐而奔豚為腎病也
純水畜也腎水藏也腎氣內動上衝胸喉如豕
故名奔豚亦有從肝病得者以腎肝同處下焦而其氣竝善上逆也

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

此奔豚氣之發於肝邪者往來寒熱肝藏有邪而氣通於少陽也肝欲散以薑夏生葛散之肝苦急以甘草緩之芎歸芍藥理其血黃芩李根下其氣桂苓為



奔豚主藥而不用者。病不由腎發也。

奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸

黃芩

芍藥

各二兩

半夏

生薑

各四兩

生葛

五

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服發汗後燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主之。

此腎氣乘外寒而動發為奔豚者發汗後燒鍼復汗



王晉三曰奔豚氣有三犯肺之奔豚屬心火犯心之奔豚屬腎寒臍下悸作奔豚屬水邪證自今途治亦各異學者當加意諦視

陽氣重傷。於是外寒從鍼孔而入。通於腎。腎氣乘外寒而上衝於心。故須灸其核上。以杜再入之邪。而桂枝湯外解寒邪。加桂內泄腎氣也。

桂枝 五兩

芍藥

生薑 各三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

右五味以水七升。微火煮取三升。去滓服一升。

發汗後。臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

此發汗後心氣不足。而後腎氣乘之。發為奔豚者。臍



一下先悸。此其兆也。桂枝能伐腎邪。茯苓能泄水氣。然欲治其水。必益其土。故又以甘草大棗補其脾氣。瀾水者。揚之令輕。使不益腎邪也。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤

甘草 二兩

大棗 十五枚

桂枝 四兩

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服。
甘瀾水法取水二斗置大盆內以杓揚之上有珠子五六千顆相逐取用之也。



胸痺心痛短氣病脉證治第九

師曰夫脉當取太過不及陽微陰弦卽胸痺而痛然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺以其陰弦故也

陽微陽不足也陰弦陰太過也陽主開陰主閉陽虛而陰干之卽胸痺而痛痺者閉也夫上焦爲陽之位而微脉爲虛之甚故曰責其極虛以虛陽而受陰邪之擊故爲心痛

平人無寒熱短氣不足以息者實也

平人素無疾之人也無寒熱無新邪也而乃短氣不



北京中医药大学图书馆藏

回溪云脉皆有不同而
遲速則無不均齊今寸口
關上遲數各異未知
何故內經中亦有些
等疑義

忠可云胸痺為陽虛
不運則津液凝滯而
為痰與支飲痰飲相
類但支飲痰飲乃飲
重而滯氣胸痺則由

足以息。當是裏氣暴實。或痰或食或飲。碍其升降之
氣而然。蓋短氣有從素虛宿疾而來者。有從新邪暴
遏而得者。二端竝否。其為裏實無疑。此審因察病之
法也。

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脉沉而遲。關上
小緊數。括樓薤白白酒湯主之。忠可曰此實注胸痺之脉症後凡言胸

痺者皆當以此概之

胸中陽也。而反痺則陽不用矣。陽不用則氣之上下
不相順接。前後不能貫通。而喘息欬唾。胸背痛。短氣
等證見矣。更審其脉。寸口亦陽也。而沉遲則等於微
矣。關上小緊亦陰弦之意。而反數者。陽氣失位。陰反

陽虛而氣結痰飲
因之

洄溪云薤白亦助陽
之物此湯專通工
焦之陽

胸痺必痛

得而主之。易所謂陰疑於陽。書所謂牝雞之晨也。是
當以通胸中之陽為主。薤白白酒辛以開痺。
陽。栝樓實者以陽痺之處必有痰濁阻其間耳。
栝樓薤白白酒湯方

栝樓實

一枚

薤白

半升

白酒

七升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得臥。心痛徹背者。栝樓薤白半夏湯主之。

胸痺不得臥。是肺氣上而不下也。心痛徹背。是心氣
塞而不和也。其痺為尤甚矣。所以然者。有痰飲以為
之援也。故於胸痺藥中。加半夏以逐痰飲。



北京中医药大学图书馆藏

此方为《金匮要略》中栝楼薤白白酒汤方

括樓薤白半夏湯方

括樓實

一枚

薤白 三兩

半夏 半升

白酒

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心中痞氣氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白

桂枝湯主之

洵溪系枳實為常用此方兼虛而見上症則用此方

心中痞氣氣痺而成痞也脇下逆搶心氣逆不降將

為中之害也是宜急通其痞結之氣否則速復其不

振之陽蓋去邪之實即以安正養陽之虛即以逐陰

是在審其病之久暫與氣之虛實而決之

括樓薤白桂枝湯方

忠可云胸痺之虛本陽氣微非此氣虛陽無取子補宜而通之即暢暢即陽盛矣故諸薤白方以行陽為主不取補



枳實 四枚

薤白 半斤

桂枝 一兩

厚朴 四兩

括樓實 一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸

藥煮數沸分溫三服

人參湯方

人參

甘草

乾薑

白朮

各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳生薑

湯亦主之

此亦氣閉氣逆之證視前條為稍緩矣二方皆下氣

胸痺之方悉以開
降為主雖出入加
減總不離此準
則也



散結之劑。而有甘淡苦辛之異。亦在酌其強弱而用之。

此治上焦方稍緩

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓 三兩
杏仁 五十個
甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差

更服

此治中焦方較峻

橘枳生薑湯方

橘皮 一斤
枳實 三兩
生薑 半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

胸痺緩急者薏苡附子散主之



洄溪云以上諸方治
胸痺此則治心
痛微有內外之
別

陽氣者精則養神柔則養筋陽痺不用則筋失養而

或緩或急所謂大筋慳短小筋弛長者是也故

苡仁舒筋脉附子通陽痺

薏苡附子散方

薏苡仁

十五兩

大附子

十枚炮

右二味杵為散服方寸匕日三服

心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之

諸逆該痰飲客氣而言心懸痛謂如懸物動搖而痛

逆氣使然也桂枝枳實生薑辛以散逆若以泄痞溫

以祛寒也



洄溪云此痛最重
上焦陽之位也而
為陰邪所擾非
用辛烈之品無
以禦之

桂枝生薑枳實湯方

桂枝

生薑

各三兩

枳實

五兩

右三味以水六升煮取三升分溫三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

心背徹痛陰寒之氣遍滿陽位故前後牽引作痛沈

氏云邪感心包氣應外俞則心痛徹背邪襲背俞氣

從內走則背痛徹心俞臟相通內外之氣相引則心

痛徹背背痛徹心即經所謂寒氣客於背俞之脉其

俞注於心故相引而痛是也烏附椒薑同力協濟以

振陽氣而逐陰邪取赤石脂者所以安心氣也



烏頭赤石脂丸方 吳氏云凡治心痛總宜用辛熱

烏頭一分 炮

蜀椒

乾薑各一兩

附子半兩

赤石脂 一兩

右五味末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服不知稍加服

附方

九痛丸治九種心疼

附子三兩 炮

生狼牙

巴豆去皮熬研如膏 乾薑

吳茱萸 人參各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸

