

卷四

醫方簡義



醫方簡義卷四

古越山陰梅溪王清源馥原著

門人

洪愛仁
潘星如

吳汶錦

心經病

怔忡

健忘

不眠

心者君主之官神明出焉其性柔其體陰其用靈患



南京中醫藥大學圖書館藏 版權所有

怔忡者定知憂勞太過每多抑鬱動其陰中之陽以腎水不足腎中相火無以上拱心氣不得平交遂致水火未濟之象君火無以自立相火不來扶助所以心神搖漾坐卧不寧聞鬧聲即煩悶不語非未語也是怠於語耳心神情志皆不安定一意化兩意食不食全是他藏之氣不來助陽所致與顛癇痴呆大相懸殊近時醫家往往誤解以怔忡即顛癇痴呆之漸謬也怔忡者血少也顛者靜而陰疑也經云重陰者癲重陽者狂痴呆者全無知識也古人治怔忡一症必以歸脾湯補心丹之屬如健忘之症即記即



忘也。因脾藏志，心藏神，神志不足，故健忘。亦以歸脾湯為主治之方也。凡不眠者，因失血症後，血虧一室，而神不守舍者，宜補心丹治之。或因傷寒雜症而胃實失下者，宜承氣湯下之。古有不能卧，因胃不和，語下之，胃氣自和，即能眠也。或虛勞而不眠者，亦補心丹主之。附癲癇痴呆辨証四條

一、癲者，陰病也。經云：重陰者癲。或歌或笑如醉如迷，其甚至不知穢潔，其候多靜而昏，宜陳無擇琥珀散鎮攝其陰，調以心脾腎三經為宜。

一、狂者，陽病也。經云：重陽者狂。狂妄難干，由大驚大



怒得之邪在肝胆胃三經而治法宜清不宜補也
瀉肝湯治之或承氣湯下之凡邪在陽明胃實下
下亦發狂也下之乃愈惟病呆無治法經云奪其食則已並無方也
一癰者痰迷心竅阻其靈明之氣古云一陰一陽變
亂謂之癰須辨明五藏五聲以分牛癰馬癰猪癰
羊癰雞癰五症然後治之可中其竅也必聆其聲
以知其症如病時肢搐痰涎上潮目瞪聲重如牛
吼者名牛癰如肢搐頭搖足擲揚聲如馬鳴者名
馬癰如身重頭偏向地涎湧聲出不響者謂猪癰
開口而吐涎足搐聲如羊羊者名羊癰如兩手

如舞面赤聲焦如雞鳴者曰雞癰皆不外乎五志
之火動擾不寧痰阻內竅而成治宜加減犀附
君子湯為主各加引經藥品以向導之可也

歸脾湯

治怔忡健忘心脾兩虛並治腸

紅之症

白朮

人參

各二

炙黃耆

各三

歸身

各三

炙甘草

茯神三遠志肉以棗仁炒

一

廣木香以加姜三

片棗三枚龍眼肉七枚水煎○如怔忡症因怒

得之者宜逍遙散方見厥症

補心丹

治顛症與怔忡症

生地八人參五元參三丹參三棗仁一茯神三

遠志肉心柏子仁各二錢天冬麥冬當歸各三錢結梗

五味子石菖蒲各五錢煉蜜為丸桐子大辰

大承氣湯見傷寒症治狂症胃實者

白金丸治癲癇症

白礬鬱金各等為丸姜湯送下二錢下痰而

滾痰丸方治癲狂癇症有痰者

青礬石沉香大黃黃芩水法為丸

龍胆瀉肝湯症見火治狂症因大驚大怒者

陳無擇琥珀散統治怔忡癲癇等症亦治痴呆

人參二錢白芍二錢鐵落煨醋淬七次二錢辰砂水飛一



煨磁石二琥珀二牛黃四遠志肉石菖蒲各

共為細末每服五卜淡姜湯送下

又方琥珀末一斗人參湯調下亦名琥珀散治小

便不通並治驚恐怔忡之症

神效琥珀散治心神不寧或小便出血

琥珀桂心滑石大黃炒冬葵子臍粉

木通木香磁石煨各等分為末每服二斗

用燈草葱白泡湯調下

孔聖枕中丹治心腎不交怔忡健忘等症

龍骨煨龜板炒石菖蒲炒遠志肉炒等分為末



蜜丸如桐子大每服一丸臨卧時開水送下

加減星附六君子湯

治癰癰氣虛有痰者

製南星

手一

竹節白附子

酒炒

人參

五

廣皮

水煎服

白朮

手一

炙甘草

五

茯苓

手三

炙甘草

五

姜半夏

五

廣皮

水煎服

白朮

手一

炙甘草

五

廣皮

水煎服

白朮

○牛癰加牛黃

五

沖入

○馬癰加馬勃

五

羊

癰加羊胆

一枚

藥送吞下

○猪癰加猪心血一

匙

○雞癰加雞胆一枚

藥水送吞

○陰虛加

生地四

當歸三

川芎

白芍

絡一

陽虛加

杞

子三

甘菊花一

半可也

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈

候

脈來滑大定然狂 濇小沉微癲病偃

小促動搖在寸口 怔忡之象病延長

右關脈結小脾病 不是不眠必健忘

此是內病七情症 補心之劑急煎嘗

內傷之病 脈必微長 滑大則甚

之殃 癲病舉動 必異其常 癩症之作

乍劇乍康 若不急治 久必難商

肝症 腕痞 肝火 肝鬱 肝風 胸痺

驚 不寐

肝者將軍之官謀慮出焉其性剛其體曲其色青其



氣旺其變幻莫測也。如情志不舒，不得條達，則成鬱症。鬱則氣不能伸，則成脘痞。脘中痞滿，火自上升，而謂肝火火旺生風。內風旋擾，則曰肝風。風木犯胃，射肺而成痛痺，名曰胸痺。胸中一痺，痰氣積聚，心神搖漾，易致驚駭。故動而多驚，驚者必心中惕惕故不寐也。總之肝木為病，須補其母，全賴腎水以生之。涵之者也。如腎水不足，木無生長之機，諸恙悉由之而生矣。婦女最多是症。女人以肝為先天，惟肝用事，閨闈之中所見甚稀。所聞甚寡，獨寤獨寐者更多。鬱結助起肝陽，病情紛至更難調理。間有一二情性柔順幽

閑貞靜雖無大患未免於鬱治之者宜分別剛柔陰陽陰且柔者藥宜輕宜薄陽而剛者藥宜破宜散經云木鬱達之火鬱發之是也今人之云肝氣者係包括肝家之病無分肝之虛實概以破散為治無怪乎治之罔效然肝藏血血虛者氣必旺况肝經多氣血血分一虛氣無約束其變症蜂起有因水虧不能涵木而肝氣橫暴者有因金虛不能制木而木火上升者有木旺侮土者有木反乘金者有木來助火者有木盛生風者焉得以肝氣一語概之乎余治是症必求其本詢其初起何病變為何病如因嗔怒所致

者是肝家本病若因憂思傷脾而木氣乘虛來侮
扶土瀉木是不在肝而在脾也餘倣此

金鈴子散 治肝經氣旺脘痛

金鈴子 去核 延胡索 各等 共為末每服三錢酒

調下或水煎服亦可

逍遙散 方見 治肝經抑鬱之症

益肝煎 製 治肝經病不拘痞滿噎逆嘔噦心胃疴

痛腹滿等症

柴胡 醋炒 一各 丹參 酒炒 三各 生左牡蠣 四各 烏藥 一各 製香

附 一各 當歸 三各 小茴 五 琥珀 八 桑葉 一各 巨勝子



三_分即三_分加荔枝五枚水煎○如氣虛者加

地_分沙參_分砂仁_分五○血虛者加生地_分四_分

一_分白芍_分○金不制木者加百合天冬_分各_分四_分

水不涵木者加杞子_分菊花_分一○心火_分者

加川連_分七○如木旺土衰者加白朮_分土_分天_分仙_分

各_分一_分茯神_分三_分如有他病挾起者隨症加減

代赭旋覆花湯 治木犯胃土噎逆痞滿

代赭石_分二_分旋覆花_分五_分東洋參_分二_分姜半夏_分一_分五_分

赤茯苓_分三_分荊芥炭_分一_分炙甘草_分五_分○如氣實而滿

者去參加牡蠣_分三_分四_分



清肝煎自製 治肝火內熾暈眩欲厥

生牡蠣五 琥珀一 焦梔子三 丹皮二 黃芩一

桑葉一 鮮生地八 煨天麻一 羚羊角五

加竹葉廿片燈心一丸

潛陽和陰湯自製 治肝虛生風心悸目眩

生龍甲各 炙龜版各 石決明生 煨天麻

桑葉各一 巨勝子各 鉤藤各三 姜半夏一

琥珀一 黃菊花二 加竹葉十片如氣悶加沉香

五卜研冲

瓜萸薤白白酒湯 治胸中痺痛欲吐不吐者



瓜萼一枚薤白二升加白酒一盞水煎或加桂

枝五卜水煎冲入白酒可也

半夏秫米湯 治寤不成寐胃中有濕熱者

姜半夏一升水五升煎至三升去滓入秫米

煎至二升分作兩次而服

酸棗仁湯 治肝虛不寐

茯神三升炙甘草五知母一棗仁炒一升川芎八升

如有痰加姜半夏一升橘紅七水煎

鎮肝湯 治木旺致驚兼治小兒驚風

煨龍骨二石菖蒲五棗仁炒一石決明生八升



琥珀一名青黛煅磁石一名姜半夏加

茹一丸○四肢逆冷加桂枝四姜汁一匙

脈候 肝經之脈要弦長 弦直因知木勢張

尺內遇弦腰帶病 子來乘母水多妨

新張弦象肝真露 雖有良醫曷可康

寸口浮弦風木上 關中得此土為戕

肝家病脈 弦緩為良 弦數風熱

弦遲腎傷 弦牢痼疾 弦革難康

若能和緩 正復邪匡 弦且勁急

病必倉皇 如難下藥 勿藥為方

