

東醫寶鑑
十四

東醫寶鑑雜病篇卷之六

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則虛風雨襲

積○着於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢

則益小○着於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢

則安飢則着於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食

則安飢則痛○着於脊筋在腸後者飢則積見飽食

則積不見按之不得○清濕蘖虛則病起於下積

之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足惋足惋生積

脛寒脛寒則血脉凝澁血脈凝澁則寒氣上入於

腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚

不得散日以成積○卒然多飲食則脹滿起居不

節用力過度則成積○卒然多飲食則脹滿起居不

傷則血內溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合

至心下久不愈令如人胃心脾之積名曰痞氣

收發黃疸飢食不為肌膚久不積名曰息賁

熱喘咳發肺癰腎之積名曰奔豚

已伶人喘逆骨痠少氣纒肝積面青脉弦而長

下○脾積面黃脉大而虛而實沉定在中脘○肺

口大實而難沉
定在小腹

伏梁有二證

帝曰病有可治否岐伯曰上左右皆有根此為

血居腸胃之外不可治之每切按之致死○帝

曰人有身體髀股肱皆腫環臍而痛是為何病岐

育育之原在臍下故環臍而痛不可動之動之為

水尿溢之病此經

同名而實異也

脉法

鬱脉多沉伏或結或促或代
鬱脉沉瀆積脉

甚結微則積微肺皆喘數肝有積其脉當沉伏
甚結微則積微肺皆喘數肝有積其脉當沉伏

積其脉皆大○脉弦緊為積脉弦緊而下即寸弦緊者
積其脉皆大○脉弦緊為積脉弦緊而下即寸弦緊者

癥也夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在臍下即尺弦緊
癥也夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在臍下即尺弦緊

在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊
在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊

見脉難治見一脉相應為易治○診積聚其脉堅
見脉難治見一脉相應為易治○診積聚其脉堅

強急者生死虛弱不治者死○五藏為積六府為聚積在
強急者生死虛弱不治者死○五藏為積六府為聚積在

可轉也必死不治者死○五藏為積六府為聚積在
可轉也必死不治者死○五藏為積六府為聚積在

本位聚無定處緊浮小者死而沉實或結或伏為
本位聚無定處緊浮小者死而沉實或結或伏為

聚為積實強者生沉小者死而沉實或結或伏為
聚為積實強者生沉小者死而沉實或結或伏為

附骨肝弦心疝則浮結○又有癥瘕其脉多弦弦急
附骨肝弦心疝則浮結○又有癥瘕其脉多弦弦急

癥疾弦細癥堅○肉癥右轉橫旋○積聚癥瘕左轉沉重
癥疾弦細癥堅○肉癥右轉橫旋○積聚癥瘕左轉沉重

氣瘕膏前若堅○肉癥右轉橫旋○積聚癥瘕左轉沉重
氣瘕膏前若堅○肉癥右轉橫旋○積聚癥瘕左轉沉重

痛纏虛弱婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛
痛纏虛弱婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛

弱纏虛弱婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛
弱纏虛弱婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛

者死○診婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛
者死○診婦人疝瘕積聚之脉弦急者生積脉忌虛

六鬱為積聚癥瘕痞之本
氣血中和百病不生一有

不食散也
○熱鬱而成痰鬱而

癥食鬱而成痞滿此必然之理也
○成瘕血鬱而濕

滯濕滯而成熱熱鬱而成痞塊此六者相因而為病也

而食不消化而遂成痞塊此六者相因而為病也

○鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當

降者不得降當變化者不得變化也此為傳化失

常六鬱之病見矣
○一曰氣鬱二曰濕鬱三曰

熱鬱四曰痰鬱五曰血鬱六曰食鬱此六鬱也六

法順氣為先降火化痰消積分熱多少而治
○治鬱之

芎藭總解諸鬱
○木鬱發之土

謂吐之令其條達也
火鬱發之謂汗之令其疎散

也土鬱奪之謂下之令無壅碍也
金鬱泄之謂其滲

泄解表利小便也
水鬱折之謂抑之制其衝逆也

此治五鬱之大要耳
○諸鬱通用六鬱湯麩麩

丸麩麩保和丸
○折之謂抑之制其衝逆也

加味麩麩丸
○諸鬱通用六鬱湯麩麩

六鬱湯 通治六鬱香附子二錢赤茯苓蒼朮各一錢半

縮砂甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服

氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘓葉○濕鬱加白朮羌

活防己○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜

仁海粉○血鬱加桃仁牡丹皮韭汁○食鬱加山

楂子神麩 麥芽神麩 六鬱湯 川芎赤茯苓貝母枳殼紫蘓葉各一錢陳皮

五分右剉作一貼 薑三片水煎服 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩

十丸 遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧或久

病不愈者皆 宜服此丸

麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩

麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩 麩

夏白茯苓枳實黃連酒炒當歸酒洗各一兩
炒連翹蘿菹子實炒木香各五錢右為末薑汁泡蒸

餅和丸悟子大薑
湯下五十九

加味麩麩丸
解諸鬱開膏膈進飲食蒼朮泔浸薑汁
炒燕芎便香附神麩炒梔子炒各四兩

陳皮去白朮炒黃芩炒各一兩
兩右為末稀糊和丸悟子大白湯下五
膏滿脇痛脉沉澁宜用香附燕芎蒼朮
木香調氣散解鬱調胃湯麩麩丸○二陳湯煎水

氣鬱
木香調氣散解鬱調胃湯麩麩丸○二陳湯煎水

周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發脉沉
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓枳○宜服滲濕湯

濕鬱
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓枳○宜服滲濕湯

目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附
散濕平胃

熱鬱
目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附

蒼朮川芎施子門○宜服升陽散火湯火鬱湯左

痰鬱

膏滿動則喘惡起所急情寸脉沉滑宜用海石香
附子瓜蒌下南星下○宜服瓜蒌枳殼湯升發二

陳湯

血鬱

四肢無力能食小便淋大便紅脉沉芤宜用挑
仁紅花青黛川芎香附子下○宜服生韭飲順氣

九當歸活血湯

食鬱

噫酸惡食黃疸鼓脹痞塊脉氣口緊盛宜用蒼朮
香附山查子神麴鐵砂醋炒下○宜服香砂平胃

散散鬱湯

木香調氣散

治氣鬱烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴
蕪芎蒼朮各一錢木香縮砂各五分桂

皮甘草各三分右剉作
一貼薑三片水煎服春回

解鬱調胃湯

治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由
怒憂思慮勞心所致也扼子鹽水炒當

歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤
芍藥酒浸生乾地黃酒洗薑汁炒香附米各八分

神麴炒麥芽炒各七分川芎六分桃仁生甘
草各四分右剉作一貼薑三片水煎服

瓜蒌枳殼湯治痰鬱瓜蒌仁枳殼母炒陳皮各一錢

縮砂木香各五分甘草三分右剉作一貼水煎入竹瀝薑汁調服

升發二陳湯治痰鬱柴胡防風升麻甘草各一錢

剉作一貼入薑三片煎服

生韭飲治血鬱胃脘有痰血作痛生桃仁七箇

順氣丸治血鬱香附子八兩以童便浸晒乾為末以粟米糊和丸服

當歸活血湯治血鬱當歸赤芍藥枳殼青皮各八分

紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三分右剉作一貼入薑水煎服

香砂平胃散治食鬱蒼朮厚朴陳皮便麴乾薑木香

各五分
甘草炙三分
右掇煎服
一貼

散鬱湯
治食鬱陳皮赤茯苓各一錢半
蒼朮白芍藥
川芎梔子各一錢二分
枳殼香附各一錢
甘

草五分
右判作一貼
入薑三煎服
鬱則胃熱鬱
散則上焦行下脘通木穀之陰自滋沛身中之陰

氣自生
矣

痞塊積聚所屬部分
凡痞塊積聚在中為痰飲
○在左為血積
○在右

為血塊
右為食積
中為痰飲
其理昭然
乃痰與食積死

則為水穀出入之道
關脾胃之位
主藏飲食中間

痞塊證治
血塊是有形之物
氣不能成塊
乃在皮裏膜外

俱宜二陳湯加補氣藥
先須斷厚味
○治

塊當降火消食積
蚘行氣死血塊
去後須大補之

其不能移動者
是癥塊也
或有或無
或上或下
或

左或右者是痲塊也俱用漬堅湯丸為主研○脇
下有塊宜當歸龍薈九助觀加桃仁薑黃各一兩

蜜丸服之○驚氣成塊者妙應丹四錢每服五
甲炒驚甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五

七十九柴平以湯消積保中○痞塊宜用連蘿丸消塊凡
加味柴平湯消積保中丸開懷散柴香散保和丸

積聚癥瘕俱為惡候切勿視為尋常若脹滿已成
膏腹鼓急雖倉扁復生

亦莫能救其萬一也傳
化塊丸紅花桃仁五靈脂香附子各一兩蓬朮並醋煮

右為末醋糊和丸梧子大
白朮湯下三五丸

連蘿丸治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈
同炒去茱萸一兩以益智五錢同炒去益智白芥

子蘿蒿子並炒各一兩半
仁香附子山查肉神麴各一兩青皮五錢右為末

蒸餅和丸梧子大
白湯吞下五六丸

蒸餅和丸梧子大
白湯吞下五六丸

白芥丸
積丸
今

消塊丸
治痞塊
瘕瘕
大黃
四兩
硝石
三兩
磁器
內先納

可大黃煎
則九不
住手攪
使微沸
盡一升
下餘藥
末熬至

惡物
石丸
針

加味柴平湯
治積塊
有熟柴
胡黃芩
半夏
夏蒼朮
厚朴

各七分
甘草五分
右剉作一
貼入薑三棗二水煎服

消積保中丸
散痞除塊
白朮
土炒
三兩
陳皮
去白
二

芥子炒
神麴炒
黃連薑汁炒
梔子薑汁炒
各一兩

檳榔七錢
蓬朮三稜
薑醋炒
各八錢
麥芽炒
六錢

下八
丸
錢
右為末
以薑汁酒糊和丸
梧子大
白湯

開懷散 治心下積塊痞悶或發熱柴胡草且菴各一錢三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子 檳榔 枳實 紅花 甘草 各七分 右剉作一貼薑三煎服

柴香散 治心腹有氣塊略通或膨脹寒熱枳實地骨皮三稜蓬朮各一錢柴胡黃芩各七分赤芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分

甘草 藥厚朴 香薷 黃連 玄胡 索各五分 右剉作一貼水煎服

保和丸 治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白連翹香附子酒炒黃芩酒炒厚朴蘿菴子炒各末薑汁糊和丸

梧子 大茶 清下 五七十九丸 專攻之劑大黃四兩醋浸七日日晒

化痞丹 消積塊 專攻之劑 大黃四兩 醋浸七日 日晒

香附子 便浸炒 桃仁 各一兩 紅花 二錢 青黛 五分 右為末 時大黃和好 醋煮為糊 和丸 葉豆大 茅根

葛根 煎湯 回下 五七十九丸 春

五七十九丸 春

積聚治法

可治積當察其時詳藏以府之其病有餘不足可補

結者散之客者除之留者行之外藥補之隨所利而

行之節飲食慎起居和其氣病亦可退己用消積

藥使消融化則自消而無下積之說蓋不可積聚有

取亦不以傷胃氣也癩可吐積勿輕吐下徒損真氣

五積丸更妙凡積大聚消其太半乃止藥過劑則死

疝氣丸肝積用肥氣丸心積用伏梁丸脾積用

聚宜用散聚湯香稜丸大七氣湯阿魏丸大安

阿魏丸久則為熱宜辛温消導大七氣湯烏白丸

惡者攻之麴所喜者誘之積則易愈蛭如礪砂水銀治

木香積柳治氣精○辛牛甘遂治水積雄黃膩粉
治痰積○礞石巴豆治食積各從其類也
云三枝蓬術治血積香附枳實治食積山楂阿魏

治肉積海粉礞石治痰積雄黃白礬治虫積乾薑
巴豆治寒積黃連大黃治熱積○五積六聚通

用增損五積九消積正元散肥氣丸○伏梁九痞氣
九息貴九奔豚九又有奔豚湯散聚湯○香稜丸痞大

七氣湯漬堅湯漬堅九真人化鐵湯熯○宿血滯
氣凝結為癥瘕腹中痞塊堅硬作楚當以破氣藥

伐之或以類相從如敗梳治虱癢銅屑治龍癩麩
藥治米瘕石瘕

增損五積丸通治肺積○黃連肝積五錢脾腎積五
錢○脾腎積八錢○心積五分肺脾腎一錢○心腎脾積五

分○脾腎積八錢○心積五分肺脾腎一錢○心腎脾積五
心脾肺積二錢○腎積五分○茯苓一錢○半○腎脾積五

五分脾肺積二錢○腎積五分○茯苓一錢○半○腎脾積五
為度治積塊不拘臍上下左右通○如肝積加

柴胡一兩川椒四錢蓬朮三錢皂角昆布各二錢加

錢○脾腎積八錢○心積五分肺脾腎一錢○心腎脾積五
錢○脾腎積八錢○心積五分肺脾腎一錢○心腎脾積五

半○心積加黃芩三錢肉桂茯神丹參各一錢
蒲五分○肺積加桔梗三錢稜天門冬青皮陳皮白

豆蔻各一錢紫苑川椒各一錢半○脾積加吳茱
萸黃芩縮砂各二錢澤瀉茵陳各一錢川椒五分

○腎積加玄胡索三錢苦練肉全蝎附子獨活各
一錢澤瀉芩蒿蒲各二錢肉桂三分丁香五分

消積正元散 治痰飲氣血鬱結食積氣不升降積聚
脹痛白朮一錢半神麴香附枳實玄胡

索海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽炒山
楂肉甘草各七分剉作一貼薑三水煎服○

名開鬱正元散 無名實附桔

肥氣丸 治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒
四錢甘草三錢蓬朮人參昆布各二錢半皂

角白茯苓各一錢半乾薑巴豆霜各五分川烏二
分右為末蜜丸梧子大初服二九日加一九二日

加二九至大便溏便漸減服
周而復始塊減半勿服

伏梁丸 治心積黃連一兩半厚朴人參各五錢黃芩
桂枝茯苓神丹參各一錢乾薑菖蒲巴豆霜川