

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

脾胃論治

脾胃皆屬土

脾爲己土。胃爲戊土。

而臟腑分焉

脾爲臟。胃爲腑。凡臟主守。腑主通。臟陰而腑陽也。

經

言胃爲水穀之海。飲入於胃。

游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸

於肺。通調水道。下輸膀胱。

脾主爲胃行其津液者也。故胃主納。脾

主運。胃喜涼。脾喜燥。昔人每多混治。

惟葉氏醫案謂脾宜升則健。

胃宜降則和。太陰溼土。得陽始運。

陽明陽土。得陰始安。以脾喜剛。

燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。

東垣大升陽氣。其治在



南京中醫藥大學圖書館藏

脾又言五臟以守為補六腑以通為補卓然有見岫雲華氏稱其

議論超出千古其敘葉案曰脾胃論莫詳於東垣其補中益氣調中益氣升陽

益胃諸湯以勞倦內傷為主故用人參黃耆以補中白朮以溫燥升麻升下

陷之清陽陳皮理中宮之氣滯以太陰惡溼而病人胃陽衰者居

多用之得宜效如桴鼓若脾陽不虧胃有燥火則當用香巖養胃

陰之法凡病後熱傷肺胃津液以致虛痞不食舌絳嗌乾煩渴不

寐便不通爽此九竅不和皆胃病豈可以耆朮治乎故先生必用

降胃之法所謂胃宜降則和者非辛開苦降亦非苦寒下奪以損

胃氣不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰則津液來復使之通降而

已此即宗內經六腑者傳化物而不藏以通為用之理也故治胃

陰虛不饑不納用清補如麥冬沙參玉竹杏仁白芍治胃陽虛食

穀不化用通補如人參益智陳皮厚樸烏藥茯苓治脾陰虛胸膈

便難用甘潤如甘草大麥仁白芍當歸杏仁麻仁紅棗白蜜治脾陽虛吞酸噎腐用香燥

如砂仁丁香炒朮神麴穀芽乾薑治脾胃陽虛運納俱少食已欲

瀉用升降法如補中益氣湯加茯苓治溼傷脾胃用平胃散或清

治中氣虛用補中益氣湯治饑傷痛而納食稍安病在當甘緩以

養脾營當歸建中湯治食傷傷食惡食當分消胃土用生益智草果廣

查肉神麴煨薑病後調理脾元參苓白朮散其分治合治於病情尤為允

恆者矣

白水炒用則守生用則和甘草炒用則補生用則瀉火右方分列

脾胃大抵脾臟以守為補胃腑以通為補脾宜升運胃宜通降也
其方治與飲食症參觀則備矣

附方

補中益氣湯 見一卷中風

調中益氣湯 即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 六君子加蒼朮 藟 棗 者 芍 羌 獨 防 柴 連

四君湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功散 加半夏名

益黃散 陳皮一兩 青皮 訶子肉 炙草各五錢 丁香

平胃散 見一卷溼

清暑益氣湯 見一卷暑

補中 調中 升陽 補脾 脾陽 利溼 祛暑



饑傷病後脾胃腎胃火脾溼和胃

當歸建中湯 芍 桂 飴 草 薑 棗 當歸

參苓白朮散 參 苓 朮 草 山藥 扁豆 蓮子 桔

蟠桃果 芡實 蓮子 核桃 熟地 棗肉 用猪腰子

安胃飲 黃芩 石斛 澤瀉 木通 陳皮 查肉 麥冬 麥蘖

半夏枳朮丸 半夏 枳 朮 石膏 生地 麥冬

養胃湯 人參 藿香 厚樸 蒼朮 各一錢 茯苓 錢二分 加烏梅二個

生薑三片 水煎 陳皮 錢五分 草果 炙草 各六分



卷之十

朱

愛智箱

芥熱甚走麋三

大脊膏

卷之四

大茴香末蒸餅

參白米醋

芥木 蕙

山藥

貳豆

蘇子

七

三

論

速

24



脾胃

張 髫年寒熱肢冷食少便瀉尙作瘡治遂神疲色慘脉沈須防
慢驚急理脾陽先用理中湯少加附子手足乃溫專用異功散
加蓮棗理脾熱減瀉止

於 脇痛吞酸已止肝火悉平但中脘氣窒口燥不知饑右脉欠
和胃陰未復用沙參麥冬花粉當歸白芍枯蘗小麥蔗汁三服
得平

姜 左脉浮而鉤右弦緩脘中久痛納食稍緩乃饑傷脾絡所致
經言脾欲緩急食甘以緩之勿用平肝克伐生氣潞參當歸鬚
白芍飴糖紅棗甘草牡蠣粉糯稻根鬚降香末數劑而安

飲食症論治

飲以養陽。食以養陰。飲食人所以衛生而脾胃實生之本也。胃旺

則多食不滯。過時不饑。脾運則分輸五臟榮潤四肢。若生冷戕胃

饑飽戕脾。中氣先餒。不宜專事消導。宜補中益氣湯。加茯苓砂仁。夫中氣即脾

胃冲和之元氣也。然胃氣以下行為順。脾氣以健運為能。胃强脾

弱則消穀而便溏。脾强胃弱則知饑而納少。故胃陽虛飽食輒噯

者宜溫通。如橘紅厚樸益智枳殼。半夏麴草蔻蘇子穀芽。若守補則壅。忌炙草焦白木炮薑。脾陽虛

多食不化者宜香燥。如砂仁丁香木香白朮半。夏神麴薏苡橘白雞內金。若膩補則滯。忌地黃黃蘗

肉。脾胃陰虛不饑不食口淡無味者宜清潤以養之。如沙參扁豆。子石斛玉竹。

當歸白芍麻仁。若消導則耗氣劫液。忌枳樸查肉。傷飲惡飲傷食

粳米大麥仁。

惡食嘔而腹滿。為胃寒生痰。和胃二陳煎。食填太陰。腹悶絞痛。為木鬱。

食厥急吐之。用陰陽水。燒鹽湯探吐。痛定後服藿香散。飲食留滯。脘痞腹脹者。為脾氣。

不宜消導之。大和飲。冷吐利。脾元受困者。溫其寒。理中湯。或溫胃飲。去黃耆。食

下氣逆噦呃噎膈者。開其鬱。神香散。加橘皮。竹茹。半夏。食後動怒。脇滿而痛者。

平肝氣。柴胡。枳殼。香附。青皮。山梔子。生白芍。飲酒傷中。發熱嘔瀉者。利其溼。葛花解酲湯。

肝胃不和。脉弦脘痺者。泄木安土。木瓜。吳萸。白芍。金橘。益智。良薑。紅棗。小麥。脾腎兩衰。

虛寒滑脫者。溫中補陽。四維散。加肉蔻。但腎陽衰者。二神丸。凡嗜熱酒者。脘。

必瘀血。宜鬱金。木香。丹參。當歸。降真香。喜冷食者。症多中寒。宜八味。理中丸。胃虛則嘔悸。

動風。宜牡蠣。白芍。茯神。人參。棗仁。炙草。阿膠。胃實則痞滿內熱。枳實消痞丸。生薑瀉心湯。脾虛則。

食後反飽。異功散。去甘草。加砂仁。穀芽。脾痺則口甜畏食。佩蘭葉煎湯。胃上逆則導。

其濁滯。豆豉枳實竹茹枯蕁仁橘皮脾下陷則升其清陽。舉元

傷脾胃腹腫便難宜兼升降則運化宣通。半夏砂仁壳茯苓橘白厚樸枳實草薹煨薑

若飲食不甘口苦不寐膽熱乘脾者宜導痰洩熱則土鬱舒。溫膽

湯去熟地加丹皮。食已吐酸肝逆犯胃者宜降火洩濁則木鬱達。

山梔桑葉生棗仁。戊己丸加茯苓山梔。其飲食減少有脾胃虛熱。安胃有中氣虛寒

腸痞者黃連瀉心湯。有思慮傷脾。歸脾有脾溼水瀉。加味平胃

養中。有寒虛痞。治中有胃氣痛逆。調胃平不能食而瘦多脾虛。宜山藥茯苓白朮炙

內金砂仁陳皮蓮。子黃米屑調服。善食而瘦多胃火。瀉黃散或用太清飲一切食

滯成積。消食凡旦晝陽盛穀氣易消食可飽暮則陰盛穀氣難化

食宜少。夏暑秋涼晚餐尤宜簡泊則脾不困胃不滯矣。

飲食

六

附方

補中益氣湯 見一卷中風

和胃二陳煎 夏 陳 苓 草 炮薑 砂仁 棗

大和中飲 查 樸 枳 夏 陳 乾薑 澤瀉 木香

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 白蔻 人參 澤瀉 益智 砂仁 厚樸 甘草

神香散 丁香 蔻仁 黃耆 陳皮

葛花解酲湯 見一卷淫

四維散 人參 四兩 附子 炮薑 各二錢 烏梅 五分 炙

二神湯 故紙 肉蔻 棗肉 薑汁 加吳萸 五味 名

陽腎陽補傷酒鬱開寒去中溫導消痰消中補



溫中痞滿痞熱補脾導滯升陽膽熱吐酸脇痞虛熱

八味理中丸

理中加茯苓

麥芽

神麴

砂仁

枳實消痞丸

枳實

黃連各五錢

厚樸四錢

苓

生薑瀉心湯

芩

連

參

草

夏

乾薑

生薑

異功散

見一卷中風

小承氣湯

見一卷溫

舉元煎

參

者各三錢

水

草各一錢

升麻五分

薑

溫膽湯

見一卷溫

味溫膽湯

加人參

遠志

棗仁

熟地

名十

戊己丸

黃連

吳萸

白芍

黃連瀉心湯

黃連酒炒水煎服

安胃飲

見本卷脾胃



中國醫藥大學圖書館藏

卷一

扁豆

半

見一卷勞瘵

木通

名加味平胃散

見一卷中風

見一卷中風

見一卷火

石斛

木通各一錢半

石膏三錢

麥冬

神麴

麥芽

蘿蔔子

青皮

陳皮

香

白朮

附各二兩

阿魏一種一兩

金銀

元補積食胃清火胃氣胃瀉溼溼去傷思痞虛寒虛



南京中医药大学图书馆版权所有

嘔吐論治

嘔吐症胃氣失降使然也。而多由肝逆衝胃致之。靈樞謂足厥陰

所生病者。胸滿嘔逆是也。夫胃司納食主乎通降。其上逆而嘔吐

者。乃肝邪犯胃。或胃虛肝乘。故治嘔吐必泄肝安胃。用藥主苦降

辛通。佐以酸泄。其肝陽上亢。食入嘔吐者。用苦辛降逆。如黃連川楝子吳茱

萸半夏厚樸薑汁之屬。或苦酸泄熱。如烏梅白芍木瓜枳實左金丸戊己湯。其胃陽衰風木乘

克。食入不變者。用溫胃平肝。如人參乾薑丁香半夏青皮白芍或吳茱萸黃湯。其脾陽衰不

能運化。腹脹痛嘔者。用辛溫行滯。益智厚樸神麴香砂六君湯加其胃虛客氣上

逆。噫噎欲嘔者。用鹹以軟痞。重以鎮逆。旋覆代赭湯加二陳。其中陽虛濁陰

犯胃。吐黑綠苦水者。用辛熱開濁。理中湯加川椒半夏附子茯苓之屬。其肢冷脈微。

時吐清水者。用辛熱扶陽。附子理中湯。真武湯。其肝火鬱熱。吞酸吐酸者。用

辛鹹苦降。左金丸。或鹽炒。吳茱萸湯。去棗。其胸痞痰阻。食已漾漾欲吐者。用辛泄。

生薑瀉心湯。或二陳。其肝厥上逆。腕痛嘔涎者。用辛通。佐以酸泄。

湯加蔻仁。吳萸薑汁。如川椒。乾薑。桂枝。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。

烏梅。白芍。半夏。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。

滴補。大半夏湯。加茯神。麥冬。青皮。白芍。當歸。其支飲湯水下咽嘔吐者。用辛泄。

其肝陰胃津兩虛。肝風擾胃嘔吐者。用柔劑。滋液熄風養胃。如人參。白芍。冬。冬。阿膠。小麥。半。

夏。茯苓。粳米之屬。其肝風犯胃。嘔吐眩暈者。用苦酸以和陽。如黃連。白芍。烏梅。

牡蠣之屬。其嘔傷胃津。熱邪乘胃。食入即吐者。用辛涼化痰。溫膽。

湯加石。其氣衝噎欬吐逆者。肝火上凌。過胃犯肺。用清肅苦降。如蘇。

斛。山梔。其氣衝心痛。饑不欲食。吐虵者。用苦辛酸以。



伏蟲。理中安虬丸。虬厥者。臟寒虬上入膈。口乾心煩。手足冷。脈沈遲。宜

寒熱互用。酸苦雜投。烏梅丸。臟厥者。陽氣垂絕。痛嘔不納。躁擾不安。

安胃丸。或半夏瀉心湯加枳實。其久嘔致傷肝腎并衝脈上逆者。用溫通柔潤。如

蓉。茯苓。當歸。杞子。桂心。沙苑子。鹿角霜。其厥陰濁邪上攻。痛從少腹逆衝為嘔者。用

辛溫泄濁。如吳萸。小茴。桂枝。韭白汁。茯苓。其嘔而絕粒者。取生鷲血熱飲。每食必吐者。煮

血熟。皆立止。食之。

集諸名家嘔吐噦治法

有聲有物為嘔。有物無聲為吐。有聲無物為噦。昔人以嘔屬陽明。

吐屬太陽。噦屬少陽。乾嘔。東垣以三者俱屬脾胃虛潔。古從三焦

分別三因。上焦在胃口。主納。中焦在中脘。主腐熟水穀。下焦在臍