

醫學指南卷二

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑馥坦李培郁校正

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人望之張文嚴校錄
門人子乾李仲元校刊
李男幼臣劉永鐘校字

傷寒

清臣曰。傷寒係屬大證。治法多端。最難分辨。冬月為正傷寒。四時為感冒。人有虛實。中有淺深。風傷氣分。寒傷血分。傷風有汗。傷寒無汗。氣虛宜扶陽出表。血虛宜養陰出表。守定六經。無論合病。併病。見病立方。對證用藥。隨手可愈。

太陽經證。脈浮緊。頭痛項強。腰脊背痛。發熱惡寒。有汗為風傷衛。法主桂枝湯。以驅衛分之風。桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗。無汗為寒傷營。法王麻黃湯。以發營分之寒。麻黃、桂枝、杏仁、甘草。風寒二方。氣虛加參术。血虛加歸地。陽虛加姜。附頭身痛。發熱惡寒。無汗煩燥。為風寒兩傷營衛。法主大青龍湯。營衛互治。風寒並驅。麻黃、桂枝、杏仁、石膏、甘草、生姜、大棗。有汗去麻黃。不煩燥去石。



中醫大學圖書館藏所有

醫學指南卷二

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑顏坦李培郁校正

傷寒

清臣曰。傷寒條屬大證。治法多端。最難分辨。冬月為正傷寒。四時為感冒。人有虛實。中有淺深。風傷氣分。寒傷血分。傷風有汗。傷寒無汗。氣虛宜扶陽出表。血虛宜養陰出表。守定六經。無論合病。併病。見病立方。對證用藥。隨手可愈。

太陽經證。脈浮緊。頭痛項強。腰脊背痛。發熱惡寒。有汗為風傷衛。法主桂枝湯。以驅衛分之風。桂枝、白芍、甘草、生姜、大棗。無汗為寒傷營。法主麻黃湯。以發營分之寒。麻黃、桂枝、杏仁、甘草。風寒二方。氣虛加參术。血虛加歸地。陽虛加姜。附頭身痛。發熱惡寒。無汗煩燥。為風寒兩傷營衛。法主大青龍湯。營衛互治。風寒並驅。麻黃、桂枝、杏仁、石膏、甘草、生姜、大棗。有汗去麻黃。不煩燥去石膏。

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人望之張文嚴校錄
門人子乾李仲元校刊
李男幼臣劉永鐘校字



膏。

太陽腑證。口渴溺閉。有蓄尿。蓄熱。蓄血。癃閉。四證。蓄尿。五苓散。焦术。茯苓。猪苓。澤瀉。肉桂。蓄熱去桂。加滑石。蓄血加生地。歸尾。紅花。小勃。萬年霜。癃閉。附子。脹異常。愈下利。脹愈加。法主白蔻。宣暢胸膈。砂仁。半夏。醒脾開胃。肉桂化氣。桔梗開提。生姜升散。如壺蓋吃緊。揭起則出之意。使上焦得通。中樞得運。而後膀胱之氣一轉運而尿自出也。

陽明經證。脈浮洪。前額眼眶脹痛。鼻築流清涕。口乾不眠。發熱不惡寒。法主葛根湯。以解陽明之表。葛根升麻。白芍。甘草。或柴葛解肌湯。柴胡。葛根。羌活。白芷。赤芍。黃芩。石膏。桔梗。甘草。姜棗。無太陽證。去羌活。無少陽證。去柴胡。無汗惡寒。去黃芩。加麻黃。下利減石膏。嘔吐加半夏。口燥心煩。汗出惡熱。渴欲飲冷。熱邪漸入陽明之裏。法主白虎湯。以撤其熱。石膏知母。甘草粳米。

陽明腑證。便閉。讖語。口臭氣粗。身輕惡熱。熱邪已歸陽明之腑。法主小承氣湯。微瀉其實。略開其閉。大黃枳實厚樸。胃實腹滿。微發讖語。法主調胃承氣湯。

以蕩其實而去其滿。大黃、芒硝、甘草、舌胎乾燥，噴熱如火。痞滿堅實，狂讞無倫。法王大承氣湯急驅其陽，以求其陰。大黃、芒硝枳實厚樸。

少陽經證。脈浮弦。頭痛在側。耳聾脅痛。寒熱往來。法主小柴胡湯。以解少陽之表。柴胡、半夏、人參、甘草、生姜、大棗。如先寒後熱為陽不足。加桂枝、乾姜先熱後寒。為陰不足。加當歸、白芍。

少陽腑證。口苦、目眩、咽乾。法王黃芩。以瀉少陽裏熱，兼陽明發熱。口渴清涼，欲生地、白芍、黃芩、柴胡、花粉、石膏、石斛、知母、甘草。痞滿去生地。加枳實。太陰寒證。脈沉遲。吐食腹滿時痛。自利不渴。法主理中湯。人參、焦术、炮姜、炙草。加半夏、砂仁、腹滿去术。加附子。或理脾滌飲。黃芪、焦术、半夏、砂仁、白蔻、炮姜。太陰熱證。脈沉實。咽乾腹滿痛。便結燥渴。法主桂枝大黃湯。桂枝、赤芍、大黃、枳實、檳榔、柴胡、甘草、生姜。或大承氣湯。

少陰寒證。脈沉細。背寒踰臥。咽痛、腹痛。肢冷、下利。法主附子湯。附子、人參、焦术、茯苓、白芍。或附子溫經湯。黃芪、焦术、半夏、砂仁、炮姜。故紙益智。倍附子。

少陰熱證。脈沉數。心煩口燥。咽乾咽痛。燥渴便結。法主六一順氣湯。枳實厚樸。
芒硝。大黃。柴胡。黃芩。白芍。甘草。或大小承氣湯。

厥陰寒證。脈沉細。肌冷。甲青。舌短胎滑。小腹滿痛。法主六味回陽飲。人參附子
熟地。當歸。炮姜。炙草。或舒氏方。黃芪。焦朮。半夏。砂仁。炮姜。附子。吳萸。花椒。
厥陰熱證。脈沉弦。舌捲囊縮。煩燥厥逆。消渴便硬。法主六一順氣湯。或太承氣
湯。

凡病不外六經。以六經之法合而治之。無不立應。一經見證。即用一經之法。
經證腑證兼見。即當表裏兩解。若太陽與陽明合病。桂枝湯中加葛根。陽明
與少陽合病。葛根湯中加柴胡。如三陽併病。羌葛柴並用。三陽與三陰表裏
同病。是為兩感。表裏皆熱。九味羌活湯去蒼朮。加柴葛。硝黃。表裏皆寒。大溫
中飲。加附子。凡治諸病。總以正病為主。兼證為佐。引經為使。乃為上乘。

灸傷寒穴道

太陽證灸風府 陽明證灸內庭 少陽證灸臨泣

太陰證灸隱白 少陰證灸太谿 厥陰證灸中封

過經不解灸期門 餘熱不盡灸曲池三里合谷風門行間
身熱足冷灸大都 腹痛灸委中

瘟疫

清臣曰。瘟疫與傷寒判別天淵。傷寒宜辛溫發散。瘟疫宜清涼攻下。傷寒邪從皮毛而入。中於肌膚。瘟疫邪從口鼻而入。伏於膜原。瘟疫世不常有。要街衢市鎮里巷鄉村。沿門傳染。方為瘟疫。今人指傷寒熱病。春日溫病為瘟疫。誤人不少。千古治法。惟吳又可、戴麟郊深知其義。學者宜詳察焉。

瘟疫初起。先寒後熱。熱後不寒。古胎純白。邪在膜原也。達原飲。檳榔。厚樸。知母。黃芩。白芍。草果。甘草。竹心。車前。腰背項痛。邪溢大陽也。加羌活。眉棱骨痛。邪溢陽明也。加葛根。寒熱口苦。邪溢少陽也。加柴胡。

汗出不徹。而熱不退。舉斑湯。當歸。炒芍。白芷。柴胡。升麻。甲珠。生姜。汗斑並行。而斑出不透。而熱不退。白虎湯。虛渴。加人參。



熱不除。白虎合舉斑湯。

胸膈痞滿。嘔渴頻煩。舌胎黃色。邪傳裏之上部也。萊菔子、淡豆豉、生梔仁、頗服取吐。

燥結便閉。舌胎純黑。或生芒刺。邪傳裏之中下部也。大承氣湯。痞滿便不結。小承氣湯。不痞滿。止便結。調胃承氣湯。

表裏證悉去。熱仍不退。膜原之邪未盡也。三消飲。即達原飲。加羌、葛、柴、大黃。經絡之氣為熱所鬱。必致發黃。茵陳蒿湯。茵陳、梔子、大黃、生姜。

熱邪干於血分。必致蓄血。桃仁承氣湯。

當下失下。呃逆不止。大承氣湯。加桃仁、歸尾、赤芍。

當下失下。循衣摸牀。捉空理綫。元氣將脫也。黃龍湯。人參、熟地、當歸、枳實、厚樸、芒硝、大黃。

下後邪氣復聚。承氣養榮湯。生地、當歸、白芍、知母、枳實、厚樸、大黃。

下後無汗發熱。人參白虎湯。

下後自汗盜汗發熱。柴胡湯。柴胡、黃芩、葛根、陳皮、甘草、姜棗。

下後熱不除。柴胡清燥湯。柴胡、黃芩、花粉、知母、陳皮、甘草、姜棗。

下後神虛膽語。清燥養榮湯。生地、當歸、白芍、知母、花粉、陳皮、甘草、硃砂、燈心。

下後奪氣不語。人參養榮湯。人參、當歸、熟地、白芍、知母、陳皮、麥冬、五味、甘草。

下後虛痞。參附養榮湯。生地、當歸、白芍、人參附子、生姜。

病愈復發。脈虛證虛。安神養血湯。熟地、當歸、炒芍、茯神、陳皮、棗仁、遠志、桔梗、甘草。

草桂元

附應下諸證

舌黃 古乾 舌捲 舌短 舌黑 舌生芒刺 鼻如烟煤 胸腹滿脹
脈厥體厥 揚手擲足 諺語 發狂 煩躁 昏沉 呃逆

補遺瘟疫雜證

大頭瘟。頭面浮腫。普濟消毒飲。黃芩、黃連、元參、藍根、馬勃、陳皮、柴胡、桔梗、大力、連翹、姜黃、薄荷、升麻、甘草。氣虛加人參。便實加大黃。



發頤瘻。耳前後腫。荆防敗毒散。加大力。外二味拔毒散。明雄白礬研末。茶調敷。
捻頸瘻。喉痺失音。頸大腹脹。蝦蟆瘻。腹不脹。均用荆防敗毒散。加大力。外三妙
散。明雄白礬火稍研吹。

瓜瓢瘻。胸高脅起。嘔血如汁。生犀散。犀角、黃連、花粉、人中黃、蒼朮、陳壁土、氣虛
加人參、便閉。加大黃。

楊梅瘻。偏身紫塊。忽發徽瘻。三黃湯。生地、赤芍、元參、大黃、人中黃、黃連、丹皮、滑
石、甘草。渴加石膏、葛根。

疖瘻瘻。發塊如瘤。偏身走痛。人中黃散。人中黃、雄黃、硃砂研末。桔梗、薄荷、甘草、
煎湯下。便閉。加大黃。

葡萄瘻。青紫斑點狀。若葡萄。羚羊散。羚羊角、生地、元參、麥冬、黃芩、知母、銀花、姜
蠶、大力、羌活、防風、甘草、竹葉。

錦霞瘻。渾身斑疹。痛癢非常。辱用飲犀角、大力、赤芍、生地、荆芥、防風。渴加石膏、

粉葛。



扣頸瘧。疫火迷心。袖繩欲縊。香附、鬱金、雄黃為丸。以開膻中之鬱。再加二陳。以祛膈中之痰。更加羌活、細辛、鬼箭羽、丹參、赤小豆。通心瀉火。自愈。
軟脚瘧。溺清泄白。足腫難移。白虎湯。加蒼朮。

以上除扣頸瘧、軟脚瘧外。皆風寒包火。凝聚三陽。使經絡不通。激成赤腫。宜外風散寒。內清邪熱。通用敗毒散加減。毒盛加硃砂。以瀉君火。重加入中黃。以瀉臟熱。赤腫甚者。針去惡血。此專言瘟疫熱證也。

斑疹

清臣曰。傷寒斑疹。由於失表。瘟疫斑疹。由於失下。傷寒出斑。最險。瘟疫出斑亦危。色紅者吉。色黑者凶。發在周身者輕。發在心窩者重。出肌膚間。如花瓣。不刺手為斑。出肌膚外。如粟粒。刺手為疹。有陰毒、陽毒之分。陽毒宜舉宜化。

陰毒宜溫宜散。

凡出斑疹。邪在經而不在于胃。治以正病為主。斑疹為輔。脈洪手足溫。斑點紅赤。且大為陽斑。脈微手足冷。斑點淡紅。且隱為陰斑。

陽斑犀角地黃湯。加升麻、紫草或黃連解毒湯。加犀角、元參、升麻、甘草或消斑
湯。元參、麥冬、硝一丹皮、錢升麻、白芷、硝二白芥沙參、錢二

陰斑陽虛附子理中湯。陰虛附子理陰煎。陰陽並虛大溫中飲。

感冒

清臣曰。冒風感寒有傷風、傷寒、兼火、兼食、血虛、氣虛、陰虛、陽虛之別。按病立方。隨手奏效。

感冒有汗為傷風。加味桂枝湯。桂枝、羌活、防風、白芍、甘草、姜棗。氣虛加沙參。
感冒無汗為傷寒。加減麻黃湯。麻黃、羌活、防風、紫蘇、甘草、姜棗。血虛加生地。
感冒兼火。冲和靈寶飲。生地、川芎、羌活、防風、葛根、白芷、柴胡、黃芩、石膏、薄荷、甘
草、姜棗。

感冒兼食。行氣香蘇散。香附、紫蘇、陳皮、川芎、麻黃、羌活、烏藥、枳殼、甘草、姜棗。有
汗去麻黃。加桂枝。因溼加蒼朮。食重。加山楂、神曲。
感冒屬血虛。四物合小柴胡湯。加桂枝。



感冒屬氣虛。補中湯加羌防、白芷。

感冒屬氣血兩虛。八珍湯去焦术加黃芪、炒羌活、防風、桂枝。

感冒屬陰虛。理陰煎加麻絨、柴胡。

感冒屬陽虛。理中湯加麻絨、柴胡。

感冒屬陰陽兩虛。大溫中飲。

瘧疾

清臣曰。瘧疾有四。曰風。曰寒。曰痰。曰食。因風、寒、痰、食客於半表半裏。陰陽相搏。為寒為熱而瘧疾成。治法無汗務使出汗。有汗務要收汗。有風者消風。有寒者散寒。有痰食者化痰消食。表邪重者先解表。裏邪重者先解裏。熱多宜涼。寒多宜溫。久瘧宜補。不可純用攻伐。

風瘧。熱多寒少。有汗。桂枝湯加羌防、半夏。或小柴胡倍人參加桂枝、白芍。寒瘧。寒多熱少。無汗。麻黃湯加羌防、半夏、生姜。或附子理陰煎加柴胡、麻黃。痰瘧。寒熱並增。痰涎湧盛。小柴胡加枯礬、白芍。或理脾滌飲加葶藶、白芍。



食瘧。寒熱相半。痞滿惡食。小柴胡加蒼樸茶服。青皮草果。或清脾飲。焦术、茯苓、半夏、青皮、柴胡、黃芩、厚樸、草果、甘草、紅米、生姜。

瘧瘧先熱後寒。加減桂枝湯。桂枝、白芍、石膏、知母、甘草、粳米。或生地、首烏、黃芩、柴胡、二母、滑石、甘草。

癰瘡單熱不寒。加減白虎湯。生地、石膏、麥冬、知母、貝母、黃芩、柴胡、甘草、竹心車前。或首烏、當歸、沙參、陳皮、柴胡、知母、貝母、石膏、甘草、竹心。

牝瘧。單寒不熱。加味麻桂飲。熟地、當歸、麻黃、肉桂、陳皮、炙草、燒姜。或桂附理中湯。加苓、夏。

瘧夾瘧疫。加減達原飲。檳榔、厚樸、草果、知母、黃芩、柴胡、蒼朮、陳皮、半夏、茯苓、麥芽、炙草、生姜。便閉。加大黃。

間日三日夜發。四物合小柴胡。加升麻。或生地、當歸、川芎、黃柏、知母、升麻、甜酒。一日二三發。附子理中湯。或六君子湯。并加升柴。脾虛久瘧。補中湯。倍人參。加苓、夏、煨姜。或六君子加草果、烏梅。

腎虛久瘧。八味丸加首烏、鱉甲。或右歸丸加首烏、鱉甲。

瘧入三陰。久瘧不止。附子理中加砂半、草果。或經驗方黃芪、焦朮、茯苓、當歸、首

烏、玉竹、附子、炮姜、草果、炙草、姜棗。

元氣大虛。久瘧不止。十全大補湯加鱉甲。或濟川飲條參、北芪、焦朮、熟地、當歸、首

棗仁、附子、肉桂、燒姜、桂元。

瘧疾三方

第一方。陳皮、半夏、茯苓、靈仙、蒼朮、厚樸、黃芩、柴胡、青皮、檳榔、炙草、生姜、井水河

水煎頭痛加白芷。一方加烏梅、茵陳。

第二方。首烏、生鱉甲、知母、焦朮、當歸、靈仙、柴胡、黃芩、陳皮、茯苓、炙草、生姜、甜酒。

井水河水煎。

第三方。人參、焦朮、黃芪、當歸、陳皮、柴胡、升麻、炙草、姜棗。熱加首烏、知母。寒加附子、炮姜。

截瘧

宋西橋方。新筆調硃砂於餅上。寫天火燒太陰。地火燒太陽。五雷靈不滅。燒斷諸不祥。重寫三次。後錄病人姓名。預前食。自止。

袁子才方。勃瘡勃瘡。四山之神。使我來縛六丁使者。五道將軍。收汝精氣。攝汝神魂。速去速去。免逢此人。發時朗誦不斷。即止。

神應瘡疾丸。白砒一兩。菜豆子四兩。研末糊丸。大明雄水飛為衣。壯者五丸。兒三丸。預前冷水下。忌熱物半日。即止。

沙糖飲。白糖四兩。燒酒半斤。臨發時。盪滾。盡量調飲。加紅米研末。尤效。

灸瘡疾穴道

大椎 三椎 開使 命門 聰諳 至陰 太谿 脾俞

又病人仰臥。草量兩乳平中折斷。從乳比至下頭盡處是穴。男左女右。灸三壯。

痢疾

清臣曰。痢有四端。一曰陷邪。一曰時毒。一曰秋燥。一曰滑脫。初起多屬溼熱。

歷久多屬虛寒。行血則便膿自止。調氣則後重自除。赤傷血分。白傷氣分。
白並行。氣血兩傷。屋漏塵腐。險危宜慎。

陷邪者。六經之邪陷入而為痢也。宜分經用藥。病在三陽。人參敗毒散加芩葛
硝黃。病在三陰。砂半理中湯加附子、吳萸。

時毒者。厲疫流行。人觸之而為痢也。宜寬腸下滯太承氣湯加歸芍、芩連桔梗。

或濟川飲當歸、白芍、檳榔、厚樸、黃芩、知母、萊菔、大黃、滑石、甘草。

秋燥者。秋分後燥金主氣。大感之而為痢也。宜養陰潤燥舒氏方。生地、阿膠、麥

冬_兩、桔梗、甘草_{各五錢}或生地、阿膠、瓜蔞、桔梗、雞子黃。

滑脫者。脾腎陽衰。中氣下陷而為痢也。宜溫補收濬。真人養臟湯。人參、焦朮、炒
芍、肉桂、附子、廣香、肉蔻、诃子、粟殼、甘草、燒姜、棗子或黃芪、焦朮、半夏、砂仁、炮
姜、附子。故紙、益智。

赤白相雜。救絕神丹。當歸、白芍、各一滑石、錢枳殼、檳榔、錢二萊菔、錢半廣香、甘草、
錢一薤子。或調血湯。當歸、白芍、陳皮、黃連、大黃、廣香、甘草、車前。



單紅不白調血飲。當歸、白芍、枳殼、黃連、地榆、木通滑石、甘草或當歸、赤芍、地榆、槐花、黃連、大黃、紅花、燈心。

單白不紅附子理中加砂半、丁香或異功散加瓦砂、姜桂、滑脫加升柴、噤口痢熱證參連飲入參、黃連。吳萸水炒石蓮、甘草、糯米加沙糖、白蜜、姜汁服。冲服寒證砂蔻六君加炮姜。

統治紅白禁口、於痢用大蒜、薤子合搗為丸每服三錢立愈。

初起宜下鏡花緣方、蒼朮、杏仁、羌活、略二生軍、熟軍。

略一川烏、甘草各兩研末。

每服四錢小兒二錢孕婦忌服赤痢燈心湯下白痢生姜湯下。

生姜湯下。

下後宜調歸芍煎當歸、白芍、滑石、檳榔、枳殼、廣香、甘草、薤子、赤痢加紅米。白痢加炮姜。

寒者宜溫附子理中加砂半故紙、吳萸。虛者宜補四君子加黃芪、山藥、砂仁。

