

瘍醫大全目錄

卷三十九

救急部

解救砒霜門主論 附方


救誤服蒙汗藥門主論 附方

救飲鴆酒藥門主論 附方

救誤服銀煖門主方

救誤服水銀門主方

救誤吞五金門主方



救誤吞針門主方

誤吞諸木竹釵門主方

救誤吞磁鋒門主方

解誤服銀粉門主論

附方

解誤服銀硃腦黃門主方

驗中蠱毒門主論

附方

解中斷腸草毒門主論

解中藥毒門主論

附方

解服鹽鹵門主論

附方



南京中醫藥大學圖書館藏

中飲食門主論

附方

解燒酒毒門主論

附方

解中煤炭毒門主方

解中閉口椒毒門主方

救誤食桐油毒門主方

救誤吞田螺門主方

救誤吞桃李門主方

救誤食豬骨門主方

救誤吞雞骨門主方



北京

中医药大学图书馆

所有

救誤中猪肉毒門主方

救誤吞頭髮門主方

救誤吞蜈蚣門主方

救誤吞螞蝗門主論

附方

救誤中蛇虺百蟲毒門主方

解中蜈蚣毒門主方

解中蜘蛛毒門主方

解中蚯蚓毒門主方

解中瘟牛肉毒門主論

附方



解中馬肉門主方

解中犬馬肉門主方

解中河豚毒門主論
附方

解食魚中毒門主方

解食黃鱧魚毒門主方

解誤食毒蟹毒門主方

解中蠶毒門主論

解中野菌地蕈靈芝毒門主論

解豆腐毒門主方



北京中醫藥大學圖書館藏

解麪毒門主方

解中白菓毒門主方

解中輕粉毒門主方

救六畜瘟疫法

解中櫻桃毒門主方



瘍醫大全卷三十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

救急部

凡解一切中毒以及誤吞金石虫蟄等證俱彙於此部中以便檢閱參治

增錢之柏東陽
男 權燮用和 全校

解救砒霜門主論

雷真君曰世人有服砒霜之毒五臟欲裂者腹必大
痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也急用瀉毒
神丹飲之如立時大瀉則生否則死矣此砒毒已
入於臟非可用羊血生甘草上吐能愈特又變下
法救之飲之如不瀉此腸已斷矣又何救乎倘用
之早未有不生者不可執吐法而無變通若初飲
砒霜但飲甘草羊血立吐而愈如不吐速用瀉毒
神丹瀉之則無不救矣

活人錄

凡中砒毒其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐
面色青黑四肢極冷者是

凡服砒人不可仰臥恐毒流四肢難治愈後須忌百
日烟酒姜椒煎炒

願體集

凡中信毒因氣惱自服者急用香油一碗灌之或吐

或下卽活若係酒調者難救其毒發散於週身也

陳遠公曰服砒毒疼欲死若不急救必腐腸胃吐紫

血而死蓋砒石乃天生之石不曾經火煅煉何毒

至此不知砒石生南岳之山鍾南山火毒又經火



氣則其恆大熱有火毒加之大熱酷烈之至安得
不殺人哉性又善走砒石下喉必升降於腸胃之
上下往來數十次腸剝皮穿人乃死矣疼欲死者
正毒氣上下攻也毒藥之橫莫此爲甚治法必吐
出其毒然不能盡出其毒也必用解毒之味但初
下喉以羊血吐之亦有能生之者食久入胃則無
益矣宜用救死丹久暫皆可救用生甘草一兩元
參二兩地榆五錢瓜蒂七箇水煎下喉卽吐煮渣
服之又吐砒毒全解矣

甘草解毒得瓜蒂必上兩而吐砒能上升故引之盡

出也然砒又下行得元參地榆解大腸之火毒
之大毒已從上而出走下者亦餘毒耳得二味解
之則上下共相解紛毒又何能施其燥烈哉况元
榆俱潤中解毒所以能制毒也此方十可活八若
不吐者此腸胃已壞不可救矣非方不效也倘藥
不及煎於飯鍋中煮灌之庶不至因循失救也

[illegible]

解救砒霜口主方

解信毒法

願體集

速取梁上燕子窠用井水三四大碗放水桶內將手多攪調之用夏布手巾如榨腐法濾去泥葉取所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醖

初中砒毒

雷真君活人錄吐法

生甘草叁兩急煎湯加羊血半碗和勻飲之立吐即愈飲之不吐速用下法

瀉毒神丹

雷真君活人錄下法



當歸 三兩

大黃 一兩
白礬 一兩

生甘草 五錢

水煎湯數碗飲之立時大瀉則生否則死

又方

黑鉛一兩磨水灌之

凡中砒霜一切毒藥垂死者

急用上號潔白糖龍花淡豈豉甘草各等分研勻
冷水調灌卽甦

又方



無名異

卽漆匠用者

和生雞蛋清攪勻服之

又方

陳壁土攪水灌之

又方

急飲人溺及人糞汁或金汁灌之

又方

虎耳草葉洗淨搗汁攪冷水灌之

又方

牙硝不拘多少研末冷水調下



瘧醫大全

又方

生鴨血灌之

又方

小蘗根搗汁灌之

又方

大黃明礬研末新汲水調灌之得吐利卽解

誤中砒毒橫身紫纍百解不效此名砒霜纍瘡

黃土地上挖一斗大坑以井水滿之攪令渾濁以
一碗與之少刻又與之待渾身紫纍俱散一吐卽



雖雖冬月間亦宜用此法必效

解砒霜及一切草藥六畜肉中毒

白花藕豆經過霜者生收晒乾研末用新汲水間

服三錢

又方

真萊豆粉

黃土各四兩

研極細用生雞蛋清九個共一處以浸萊豆冷水和稀服之卽解若有黑羊血再灌碗許更妙

又方

