

續廣達生編

卷之四目次

產後論

產後三禁論

產後常用湯方

產後血暈症治

產後氣脫症治

附產後氣脫案

脫症宜服蔓論



南京中医药大学图书馆版权所有

經房室生經
卷之四
開脫症辨

產後惡露不下症治

產後惡露不止症治

產後暴崩症治

產後尋勞症治

產後遍身疼痛症治

產後頭痛症治

產後心疼症治

產後腹痛症治



南京中医药大学图书馆版权所有
1661

產後小腹痛症治

產後兒枕痛症治

產後腰痛症治

產後脇痛症治

產後血氣痛症治

產後脚氣症治

產後寒熱辨論並症治

產後發熱症治

產後乍寒乍熱症治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

產後傷寒症治

產後中風症治

產後汗出不止症治

產後發瘧症治

產後譫語症治

附產後譫語案

產後顛狂症治

產後眼見黑花昏眩症治

產後不語症治



南京中医药大学图书馆版权所有

產後脹滿吐惡症治

產後霍亂吐瀉症治

產後發渴症治

產後口乾痞悶症治

產後鼻衄症治

產後咳嗽症治

產後泄瀉症治

產後痢疾症治

產後大便閉澀症治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

產後小便閉症治

產後淋瀝症治

產後小便頻數及遺尿症治

產後瘧疾症治

產後浮腫症治

產後乳病症治

產後子腸不收症治

產後子宮脫出症治

擦破膀胱症治



產後癰塊症治

產後陰戶雜病症治

產後怪疾治法

附花顛症治

產後痘疹症治



南京中医药大学图书馆版权所有

續廣達生編卷之四

周登庸先生纂輯

產後章

同志諸君子重梓

○產後論

新產之後。百脉空虛。風寒易入。最宜調攝得法。所最危者。暈脫二證。其餘雜證。多屬外感內因。外感者。感冒風寒。暑濕也。內因者。內傷飲食藥餌也。調治者。或宜古人產後以補虛爲主。俱證以末治之說。卽有外邪。全不清理。而妄投滋補者有之。或泥產後惡露宜淨。不可驟用棧。誓之說。卽遇虛脫。亦不培補。而妄投寒涼者有之。又或

飲食不節起居不時以致積滯成病而妄用剋伐消導者亦有之此皆不知臨症變通拘泥不化者之所爲也今將產後諸症臚列一篇以便臨證施治庶天下後世之產母同登壽域矣

有歌曰產後總宜大補虛寒涼攻發害非一雜症皆爲末病看培養元氣爲中的

又歌曰三日之內血宜流熟地白芍忌酸收生化湯與黑神散生新化舊二方求歸朮妙湯眞保產三方斟酌不須憂

○產後三禁論

觀病機機要云。治胎產之病。當從厥陰症論之。宜無和。氣及上二焦。是爲三禁。謂不可汗。不可下。不可利。小便。發其汗。則同傷寒下早之症。利大便。則脉數而傷脾利。小便。則內亡津液。胃中枯燥。但使不犯三禁。則榮衛自和。而寒熱自止矣。凡用治之法。如發渴則白虎。氣弱則黃耆。血痛則當歸。腹痛則芍藥。大抵產病天行。從加減柴胡。雜症從增損四物湯。宜察脉證而用之。詳此說。雖爲產後之大法。然病變不同。倘有是症。則不得不用是。

藥所謂有病則病受之也。第此經常之法固不可不知。而應變之權亦不可執一也。



北京中医药大学图书馆版权所有

○產後常用湯方

生化湯

此方去舊生新。極平極穩。凡產後無論有病無病。

病。三日前能服數劑。使惡露盡去。新血速生。誠產後之

要藥也。世俗每以紅糖下瘀。反致損胃。戒之。

當歸

五錢

川芎

二錢

桃仁

十粒

去

黑姜

一錢

炙草

二錢

每日一劑

水煎熱服四五劑爲度。

黑神散

治產後惡露不盡。血氣攻心。腹痛等症。

肉桂

當歸

白芍

黑姜

生地

黑荳

炒

水煎水。

酒兌服。



右方酸收之劑。三日前不宜用。世人動云。芍藥地黃。乃產後忌藥。不知三日內為忌藥。五日外為要藥。且去血過多。正宜酸收。

歸朮保產湯 此方產後三五日外服之極妙。

當歸 川芎 白朮土炒 黑姜各錢半 生地七錢 白芍七錢

陳皮 香附炒各五分 甘草一錢 酒水各半煎服。

產後聖方

人蔘三錢 歸身一兩 川芎五錢 芥穗炒一錢 益母草二錢

附加減法。右方為主。倘有風加柴胡五分。有寒加肉



桂一錢。血不淨，加山查十粒。血暈，加炮姜五分。鼻中衄血，加麥冬二錢。夜熱，加地骨皮一錢。食滯，加山楂五粒。穀芽一錢。有痰，加白芥子五分。餘斷不可侵入。此方純補氣血而不治表，所以為妙。屢治產後無不神效。

產後代棧湯 產後最宜服棧，但貧者不易得，今酌定一方代之。

黃芪

蜜炙八錢

熟地

四錢

白朮

土炒

歸身

酒洗各三錢

茯苓

炙草

淮牛膝

炮姜

各一錢

益母草

二錢

水煎服

錢氏生化湯

治產後諸症，乃錢氏世傳常用之妙方。

當歸錢五川芎錢二炙草分五黑姜分三桃仁十粒去皮尖及雙仁不用熟地

三錢殊二枝水二鍾煎八分溫服。一方無熟地。又有

去熟地加益母草錢二三炒荊芥分六七者。此一防血暈之

一法也。

附加減法。凡胎衣不下。或血冷氣閉。血枯氣弱等症。

連服二三劑。卽下。或用此湯送益母丸一粒。蓋益母草

行血養血。性善走而不傷人者也。一血暈虛暈加酒

炒荊芥六七分。一氣虛氣脫。倦怠無力。加人蔘炙黃

耆。一陽虛厥逆。加附子肉桂。一脈虛煩渴。加麥冬



北五味。一氣壅有痰。加陳皮。竹瀝。一血虛血燥。便結。加麻仁。杏仁。苳蓉。一多汗不眠。加茯神。棗仁。黃連。上體多汗。加麻黃根。下體多汗。加漢防己。一煩熱。加丹皮。地骨皮。一口噤如風。反張。痙瘓。加荊芥。防風。各三四分。一惡露未盡。身發寒熱。頭痛。脇脹。其小腹必然脹痛。加紅花。丹皮。肉桂。各三四分。元胡一錢。一內傷飲食。加山楂。陳皮。砂仁。或神麴。麥芽。一外傷寒濕。加蒼朮。或白朮。一血積食積。胃有燥糞。臍腹脹痛。加酒炒大黃二錢。一產後下血不止。或如屋漏水。沉黑。

不紅。或斷。或來。或如水。或有塊。淋瀝不休。此氣血大虛之候。不可妄用寒涼。其脉浮脫。可加附子。輩諸陽藥。否則無救矣。

按會稽錢氏曰。嘗論產症。本屬血虛。陰亡陽孤。氣亦俱病。如大補。則氣血陡生。倘失調。則諸邪易襲。四物避芍藥之寒。四物得姜桃之妙。氣母耗散。法兼補虛。食必扶脾。勿專消導。熱不可用芩連。恐致宿穢凝滯。寒不宜用桂附。反招新血流崩。三陽見裏症之多。似可汗也。用麻黃則重竭其陽。三陰見表症之劇。似可下也。用承氣則