

急報科

二



急救須知

女科調經

香附陳皮
茯苓甘草

婦人氣盛於血，每多無子。尋常頭暈，膈滿怔忡，香附

童便浸炒四兩，陳皮去白二兩，茯苓去皮木一兩，

五錢，甘草炙一兩，爲細末，不拘時，白湯調下二三

錢。丹婦人經脉不調，或前或後，或多或少，產前

胎不安，產後惡血不下，兼治寒熱勞腰脊痛，骨節

煩疼，用丹參洗淨切晒爲末，每服二錢，溫酒調下。

丹參

當歸乾漆

葶藶蒲黃

金墨當歸

紅花

魚膠新綿

明理 婦人血氣臍下氣脹月經不利血氣上攻欲

嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性二錢爲末煉蜜

丸梧子大每服十五丸溫酒下永類 二神丸治婦

人血氣作痛及下血無時月經不調用葶藶鹽炒

蒲黃炒等分爲末煉蜜丸梧子大每空心溫酒服

三十丸兩服卽止陳氏 月經逆行從口鼻出先以

金墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一

鍾半煎八分溫服其經卽通商便 魚膠切炒新綿

蒲黃乾漆

茜根

薏苡根
酢石榴根

凌霄花

大黃

燒灰每服二錢米飲調下卽愈

鄧事

婦女月經不

通生蒲黃乾漆炒爲末各三錢紅花煎酒調服立

通

聖惠

茜根一兩煎酒服之一日卽通甚效

得效

薏苡根一兩水煎服不過數服效

上海

川酢石榴

根東行者一握炙乾水二大盞濃煎一盞空心服

之未通再服

斗門

凌霄花爲末每服二錢食前溫

酒下

徐氏

乾血氣痛錦紋大黃酒浸晒乾四兩爲

末好醋一升熬成膏丸芡子大臥時酒化一九服

養蘭子仁

乾漆牛膝
生地

大便利一二行紅漏自下乃調經仙藥也或加香

附集
驗

宿有風冷留血積聚月水不通養蘭子一

升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗

浸封五日後每飲三合日三服

聖惠

萬病丸治女

人月經淋閉月信不來遠臍寒疝痛及產後血氣

不調腹中結癥瘕不散諸病乾漆炒令烟盡生牛

膝酒浸一宿焙各一兩爲末生地黄汁一升入石

器內慢火熬至可丸如梧子大每服二丸空心米

紅花蘇木
血竭

川芎

飲下。
救

經脉不通、頭紅、花蘇木、血竭各三錢、好

黃酒二大碗、將花木熬數沸、取出去渣、以血竭另

研細、投入熱服、汗出自通。

急救

經水三箇月不行

驗胎法、川芎生爲末、空心煎艾湯服一匙、腹內微

動者是有胎、不動者非也。

靈苑



馬齒莧
子

益母草

夏枯草

酸漿草
白扁豆

垂根童便

赤白帶崩

赤白帶下。不問老稚孕婦悉可服。取馬齒莧搗絞汁。

三大合。和鷄子白二枚。先溫令熱。乃下莧汁。微溫。

頓飲之。不過再服。即愈。海益母草花開時采搗。

為末。每服二錢。食前溫湯下。集夏枯草花開時。

采。陰乾為末。每服二錢。食前米飲下。家三葉酸。

漿草。陰乾為末。空心溫酒。每服三錢七。干白藕。

豆炒為末。用米飲。每服二錢。聖韭根搗汁和童。

香附赤芍

雞冠花

葵花

冰片

便露一夜空心溫服取效。上海赤白帶下及血崩

不止香附子赤芍藥等分爲末鹽一捻水二盞煎

一盞食前溫服。聖惠婦人白帶白雞冠花晒乾爲

末每日空心酒服三錢赤帶用紅者。集效帶下臍

腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾爲

末每空心溫酒服二錢七赤帶用赤葵白帶用白

葵。聖惠赤白帶以冰片一分五釐吹入陰戶即愈

急救

沙參

硫黃鷄子

糯米花椒

破仁

益智仁
貫衆

地錦草

白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參爲末每

服二錢米飲調下

證治要訣

用硫黃二分研末入鷄

子內飯上蒸熟服三次愈

急救

女人白淫糙糯米

花椒等分炒爲末醋糊丸梧子大每服三四十九

食前醋湯下

簡便

婦人血崩縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢

方眼

取

益智子炒研細米飲入鹽服一錢

產寶

貫衆半兩

煎酒服之立止

集簡

地錦草蒸熟以油鹽薑淹食

急救

白帶

血崩

五

赭石

蒸餅

槐耳

蘇沙

熟艾阿膠
乾姜

火漆

之飲酒一二盃送下或陰乾爲末薑酒調服一二

錢一服卽止

得效

赭石火煨醋淬七次爲末白湯

服二錢

普濟

陳年蒸餅燒存性米飲服二錢

集簡

不問年月遠近用槐耳燒存性爲末每服方寸匕

溫酒調下

產寶

蘇沙爲末酒服三五錢

事親

連日

不止熟艾鷄子大一團阿膠炒爲末半兩乾薑一

錢水五盞先煮艾薑至二盞半傾出入阿膠烺化

分三服一日服盡

保驗

火漆不拘多少入無油鍋

桂心

胡桃肉

絲瓜棕欄

白扁豆花

荆芥穗

化炒黃色烟淨白烟起退火取出研為末每服三

錢空心好酒調服即安至重者不過三服急救桂

心不拘多少砂鍋內煨存性為末每米飲空心服

一二錢名神應散良方胡桃肉十五枚燈上燒存

性研作一服空心溫酒調下神效集老絲瓜燒

灰棕欄燒灰等分用酒或鹽湯服即止奇效白藕

豆花焙乾為末每服二錢空心炒米煮飲入鹽少

許調下即效奇效荆芥穗於麻油燈上燒焦為末

蓮蓬殼荆芥穗

杏仁黃皮

椒目

赤芍香附

桑耳

石韋

每服二錢童便服良方不拘冷熱用蓮蓬殼荆芥

穗各燒存性等分為末每米飲下二錢聖惠諸藥

不效者服此立止甜杏仁上黃皮燒存性為細末

每服三錢空心熱酒調下急救崩中帶下椒目炒

研細每溫酒服一錢金匱赤芍藥香附子等分

為末每服二錢鹽一捻水一盞煎七分溫服日二

服十服見效名如神散良方崩中帶下桑耳炒黑

為末酒服方寸七日三服取效千金石韋為末每

陳壺盧
房

香附

新綿

檳榔

五靈脂

服三錢溫酒服甚效

總錄

赤白崩中陳壺盧瓢炒

存性蓮房煨存性等分研末每服二錢熱水調服

二服有汗為度即止甚者五服止最妙忌房事發

物生冷

上海

或五色漏帶用香附子去毛炒焦為

末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下或

加櫻灰

本

一笑散治血崩新綿一口燒灰研末

空心酒調下立止

女科

檳榔燒灰存性研末溫酒

下

世傳

五靈脂炒令烟盡為末每服一錢水酒童

急救

血崩

七

桃仁

夏枯草

櫻櫚烏梅

乾姜

櫻櫚白礬

烏梅肉百

草霜

便各半蓋煎服科女 桃仁燒灰研細食前溫酒下

二錢大 夏枯草燒灰存性為末空心米飲調下

世傳 櫻櫚皮烏梅肉各一兩乾薑一兩五錢俱燒

存性為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服

不過三服科女 櫻櫚皮白礬俱煨為末酒調下二

錢楊氏 烏梅醋浸一宿去核研膏入百草霜細末

搗丸梧子大每空心淡醋湯下三四十九科女

經血不止

白芍香附

熟艾

生地黄汁

紅雞冠花

陳蓮蓬殼

木賊草

烏龍尾荆

芥穗

經水不止白芍藥香附子熟艾葉各一錢半水煎服

之補遺生地黄汁每服一盞酒一盞煎服日二次

金千紅雞冠花一味晒乾爲末每服二錢空心酒

調下忌魚腥猪肉集效陳蓮蓬殼燒存性研末每

服二錢熱酒下名瑞蓮散經驗木賊炒三錢水一

盞煎七分溫服日一服聖惠烏龍尾炒烟盡荆芥

穗各五錢爲末每服二錢茶下聖濟月事未止行

急救

二經血不止

八

月經紙

茜根阿膠
柏葉黃芩
生地髮灰

房淋瀝不住者，卽以本身經紙晒乾爲末，少許掩

舌上，白酒送下，立效。

急收

五旬後經水不止者，作

敗血論，用茜根一兩，阿膠側柏葉炙黃芩各五錢，

生地黃一兩，小兒胎髮一枚燒灰，分作六帖，水一

盞半煎七分，入髮灰服之。

經驗