

杏苑生春

卷之四



發刻醫家必究本方生春四卷下

中暑嘔吐煩渴飲飲以黃連香需散治之

或批他本散亦治之
方見三卷內

中寒嘔吐四肢厥冷飲食不下以附子理中湯治之

方見本
卷前

病脾胃虛弱羈風挾痰宿食不化而作嘔者是也

治法當治中為本驅風導痰祛宿食為標是以用白朮補中氣

神麴麥芽消宿食天麻驅風茯苓半夏豁痰用橘紅生薑

散逆氣以止嘔吐

方東垣茯苓半夏湯

白朮 一錢

神麴 八分

麥芽 一錢

天麻 七分

茯苓 一錢

半夏 五分

橘紅 一錢

生薑 五片

右咬咀水二鍾煎一鍾溫服

飲食所傷心下痞滿嘔吐不止以枳實二陳湯治之

方見三
卷內

治中脘停寒作痛法當補中散寒是以用人參白朮炙甘草諸甘溫以補中乾薑丁香諸辛熱以散寒生薑散逆氣以止嘔吐

方理中丁香湯

人參五錢

白朮

甘草多七分

丁香七分

乾薑七分

生薑七片

○右井水二鍾煎一鍾溫服

○噎膈

噎症乃膈之漸也為因憂思驚恐或先富後貧情思不樂鬱結日久不得舒散以致血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入必屈曲而下名曰噎其槁在下與胃為近食雖可進難盡入胃良久復出名曰膈又名翻胃必大便燥少若羊糞然治雖不同病出一體況此症發於五旬之

後血氣衰弱治故難愈當噎初萌未至於隔之即可與潤血湯和膈潤燥仍令常飲新溫牛乳細呷每頓進一盃或間飲甘蔗汁及製燒梨與食藥中少加驢屎防其或生蟲切不可撓其胸痞悶水物妨碍便進香竄熱藥雖暫舒泰殊不知血液被耗愈使胃涸津竭不能當也翻胃乃食一日半日翻出如故其因有四氣虛者補脾益氣血虛者滋養榮血痰飲者順氣消痰氣鬱者疎流氣聚但並執燥須用養心此症膠固非比乍然嘔吐也

○噎膈脈訣

難經云脈格則吐逆○脈經云緊而滑者吐逆寸弱而瀉胃反千金云寸緊尺瀉其人胸滿不能食而吐吐爲下之故此不能食設言未止者此爲胃反故反爲之微瀉

金匱云病人脉數則熱當消穀引飲而反吐者因反發汗令
是陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故
也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐為胃反胃
及下之令脉反弦故名曰虛又云跌陽脉浮而濇浮則為
虛濇則傷脾脾傷不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名
曰胃反脉緊而濇其病難治

噎膈反胃之症其因有三中氣虧敗曰津液枯涸曰火熱上炎
治療大法中氣虧敗者補中益氣為主津液枯涸者生津
益血為先火熱上炎者滋陰降火為本

噎膈反胃之症大約有四曰血虛曰氣虛曰熱曰痰
如氣虛者脉必緩而無力治宜四君子湯為主加減
如血虛者脉必數而無力治宜四物湯為主加減

若是熱者。脉必瀉而數。宜清涼飲子。或承氣湯加減。

如因痰者。寸關脉沉而滑。挾滯氣者。寸關脉沉而瀉。並宜以

陳湯爲主。加減佐以薑汁韭汁。童便竹瀝爲主方。更無其
隨症加減。

如因七情鬱結致氣噎者。王方加香附撫芎。木瓜檳榔瓜萋仁
之類。

大都此症多生於血枯血陰也。陰主靜。必須內外而靜。則臟腑
之火不起。使金水一臟得養。則陰血自生。腸胃津液傳化
得宜而病自愈。

張機峯云。此病乃神思間病。惟內觀自養可以卻之。此言深得
病情之要旨也。

噎而食物必屈曲及水飲難下。以潤血湯如大便結閉。加酒炒

大黃少許

方潤血湯

當歸鬚

一錢二分

川芎

一錢

麻仁

一錢

桃仁

去皮

紅花

酒洗三分

甘草

生四分

赤芍藥

黃芩

生地黃

七分

橘皮

去皮七分

右咬咀水煎熟食前服

噎塞不通病人氣血未衰暫與香砂二陳湯加紅花桃仁稍寬

止服

方香砂二陳湯

香附子

一錢

砂仁

七枚

半夏

一錢五分

茯苓

一錢五分

橘皮

一錢

甘草

五分

右咬咀水煎熟食遠服

病嘔噦痰多咽喉枯澀噎食不下之症此乃中氣虧敗運動失常以致津液凝聚成痰不復榮養二焦是咽喉枯槁噎食不下是也

治法當補益中氣為主故用人參白朮甘草等補中以健運動為本桔梗半夏生薑以豁痰涎枳頭糖下噎食白荳蔻萆澄茄枇杷葉溫脾和胃下氣以止嘔噦木香沉香以散鬱滯

方五噎散

人參

三兩

白朮

三兩

甘草

炙一兩

桔梗

一兩

半夏

五錢

生薑

二錢

枳頭糖

三兩

白荳蔻

五錢

萆澄茄

三錢

枇杷葉

五錢

木香

五錢

沉香

一兩

右共為末薑湯調服

治食物之後冷涎不已。隨即翻出。或心腹覺疼。以大藿香散去。

桂主之。或霍香安胃散。二方俱見本卷前

治七情氣鬱成痰。氣噎痞痛喘悶。法宜和氣豁痰為要。故用桔

梗利氣。瓜蒌半夏豁痰。

方瓜蒌仁湯

桔梗 二兩 枳殼 一兩 瓜蒌仁 四兩另研 半夏 五錢

右件共為末。以薑汁糊丸。每密糖湯下。五七十丸。日三服。

心胸痞悶。痰涎上壅。食物即吐。以香砂安胃散。王。之。此。反。佐。之。

法病若稍退止服。方見本卷前

被物噎塞致喉間如碍。水飲難下。痰涎壅上。治以透膈散。

方透膈散

橘紅 一錢 茯苓 八分 半夏 八分 桔梗 八分



黃芩

四分

木香

四分

甘草

炙三分

瓜蒌仁

七分

杏仁

六分

砂仁

七枚

枳實

五分

生薑

五片

右咬咀。水煎熟。不拘時服。

病氣逆吐痰嘔食不下。此乃中氣虧敗運動失常。以致腹內陽

氣不得四達。上逆而作嘔吐。以致三焦津液不得四散。以

養經絡。鬱而成痰。遂使咽喉一燥。噎食不下是也。

治法宜補中氣為主。是以用人參白木等補中氣。以健運動。半

夏生薑豁痰散逆氣。以止嘔吐。白蜜潤燥。以下食。

方十全半夏

人參

四兩

白木

一兩

半夏

五錢

生薑

五錢

白蜜

八兩

右咬咀。先將水一斗置蜜內攪一二百遍。令勻。再入前藥煮。

至五升每溫服一升

翻胃多渴以白朮散主之

方見三卷前

翻胃倦怠以清氣健脾湯此亦開胃補脾之藥倘見吐酸口燥

不宜多服

方清氣健脾湯

本香

四分

人參

一錢

白茯苓

白朮

各一錢

橘皮

八分

半夏

八分

白豆蔻

三分

香附子

六分

甘草

五分

砂仁

七枚

生薑

五片

右咬咀水二鍾煎一鍾食遠溫服

病上焦氣鬱不舒上冲嘔食不下脉浮而洪是也

石宜健脾散鬱而吐自愈食自下故用白朮茯苓健脾結梗作

舟楫以載藥半夏橘紅枳實厚朴等以散上焦之鬱氣

和中桔梗湯

白朮 三錢

茯苓 一錢

桔梗 七分

半夏 六分

陳皮 二錢

枳實 八分

厚朴 一錢

右吹咀水鍾半煎一鍾調木香末一錢隔宿空心服三服氣漸下吐漸止去木香加白芍一錢黃芪二錢煎服病愈卽已如大便秘硬食不盡下用大承氣去硝服之微利爲度再將前藥補之

翻胃食物一日半日吐出如故此胃弱不溫不能消化糟粕隨氣逆上而出也以丁香二陳湯主之方見本卷前

病胸膈不利大便燥結氣喘而喘食不得下此乃中氣不充鬱不行以致周身津液凝結爲痰不得滋潤臟腑遂使腸胃枯槁大便不得下通中焦氣逆上壅而爲胸膈痞滿喘嘔

噎食不下之症是也。

〔治〕法宜補中散鬱為主。用人參甘草補中健脾。不香檳榔厚朴。

枳實散滯除痞。蒲藿香和胃而止嘔噦。大黃當歸潤燥而

通大便。

〔方〕人參利膈丸

人參 四兩

甘草 一兩

木香 二錢

檳榔 五錢

枳實 一兩

厚朴 二兩

藿香 二兩

大黃 一兩

右件各為細末。糊丸薑湯下。

翻胃。石氣虛。以四君子湯。方見木。○血虛者。以四物湯。見三

○痰飲者。以二陳湯。方見三。○氣鬱者。以木香調氣散。

為主。加減調治。但兼熱證。加薑汁沙黃連。方見三

經云。三陽結謂之臍。三陽者。大小腸膀胱也。結熱結也。蓋小腸

與心相爲表裏而心生血脉是以小腸結則血脉燥咽喉
乾枯大腸以傳導爲重若大腸熱結則大便不通膀胱爲
津液之腑故膀胱熱結則津液枯槁小便不利是以三陽
熱則下竅不通而反上行是以噎食不下從上湧出此乃
腸胃熱結所致故河間多用三承氣湯以致腸胃結熱而
獲效由此故也下後則當以生津養血之劑調之俗醫不
察此理專用辛香之劑止嘔止吐乃是以火濟火其害可
勝言哉

○嘈雜吞酸吐酸

嘈雜乃心中似飢煩雜不安懶於飲食謂之心嘈此乃痰因火
動或酒過濕滯或肥人痰熱皆便然也治法皆以炒山梔薑汁
炒黃連爲主隨症加減吞酸卽蕪酸乃濕熱鬱積於肝而出伏

在肺胃之間飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也治以萊菔黃連各炒隨時令迭其佐使以蒼朮茯苓爲主取萊菔順其性而折之此反之佐也吐酸是痰火宿食鬱遏胃脘或平時津液隨上汁之氣鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸水吐出此素問謂熱言其本也其有鬱積之久不能自久湧而出伏於肺胃之間咯不得上咽不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表得暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦可暫解此東垣爲寒言其末也有朝食甘美至晡時心腹刺酸吐出如醋此是血虛火盛而然三者俱是土氣不足木火用事治若辛熱之藥皆當禁也只宜糲食蔬菜自養則病易安

○吞酸吐酸脉症

脉沉而遲者胸中有寒飲○脉洪者濕熱在膈間時吐酸木欲

成飢胃

吐酸之症以病机言之屬於濕熱以臟腑言之屬於脾胃以病

邪言之屬痰飲宿食治療之法熱者以寒清之脾濕者以

苦燥之痰飲者豁之利之宿食者消之導之各宜類究毋

執一端

如食鬱挾痰宜二陳湯加南星黃芩之類

如食鬱吐酸平胃散加炒神麴炒萊菔薑棗同煎

凡吐清水宜陳壁土炒蒼朮白朮同茯苓滑石陳皮同煎服

凡治酸必用吳茱萸者乃順其性而折之也

嘈雜或食後腐作酸臭心中煩雜治以保和湯

左保和湯

橘皮 去白

茯苓 各一錢 五分 半夏 一錢 二分

南星 一錢



山梔仁炒

白朮一錢

黃芩炒

甘草五分

生薑五片

○如熱甚加青黛五分

右吹咀水二鍾煎一鍾食前服

嘈雜濕痰氣滯。不喜飲食。以前胡湯加蒼朮香附子。

方前胡湯

前胡

半夏

橘紅各一錢

杏仁

紫蘇子

枳實

各五分

桑皮

八分

甘草

四分

生薑

五片

右吹咀水煎熟食遠服

肥人嘈雜。以前胡湯加撫芎蒼朮治之。

治濕熱鬱成酸味上戕。法當疎鬱滯清濕熱為主。是以用吳茱

萸橘紅等諸辛以疎鬱。蒼朮燥濕。芎連等以清熱。

方吳茱萸丸

