

心痛



小兒心痛當於大人心痛門參用之

心痛吐水者蟲痛 心痛不吐水者冷心痛

錢氏靈礬散 治小兒蟲咬心痛欲絕

五靈脂 貳錢

白礬 火飛半錢

右同研每服一二錢水一鍾煎至五分溫服無時

當吐出蟲

聖惠治小兒心痛但覺兒將手數數摩心腹卽啼是

心痛不可忍宜服芍藥散方

赤芍藥

人參 去蘆

白朮

黃芩

川大黃 微炒

當歸 已上各壹分

右擣羅爲麤散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

茅先生治小兒心痛金鈴散

金鈴子 炮去皮核

蓬莪朮 炮各壹兩

茴香

木香 炮

荊三稜 炮各半兩

右爲末每服一錢半錢用熱酒調下

煩躁

薛仲景云火入於肺則煩入於腎則躁夫心者君火也火王則金燔水虧而火獨存故肺腎合而爲躁也活人云但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒鼻不疼故知非傷寒也頭不痛脉不緊故知非裏寒也不可發汗攻下當與竹葉湯兼嘔者與橘皮湯又心虛則先煩而後渴翁翁發熱其脉浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾而內熱故屬陽躁者肢體躁動或裸身欲入井中爲外熱故屬陰外熱者無根

之火也是以爲虛在小兒當辨其嘔煎不安是煩嘔
嘔不定是躁嘔煎者心經有熱精神恍惚煩滿生驚
嘔嘔者心經有風煩躁驚搐也熱甚者黃連解毒湯
輕者導赤散風熱者至寶丹脈數而實便閉有熱者
神芩丸此皆實熱之治法也若煩而頭痛短氣口乾
咽燥不渴者虛也用四君加芩歸因藥攻伐而作渴
者用竹茹湯煩而不得眠者酸棗仁湯心神顛倒煩
熱欲吐者朱砂安神丸面戴陽目內赤六脈洪大按
之全無者血虛發躁用當歸補血湯若躁而裸體欲
入井中脈沉細或浮大按之如無者此皆陰盛發躁

也宜用參附湯有回生之功

清熱解毒丸

治五臟積熱毒氣上攻胸臆煩悶咽

喉腫痛赤眼壅腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡
精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒面赤身
熱心煩躁而渴飲食不下

寒水石

石膏

各捌兩

青黛

肆兩

右研末入青黛和勻蒸餅七箇水調爲丸如芡實
大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下
如中諸毒並宜服之及驚風潮熱痰涎壅塞心胸
煩躁頰赤多渴坐臥不穩每服半粒量大小加減

竹茹湯

吐

橘皮湯

橘皮

壹兩半

甘草

炙

竹茹

各半兩

人參

貳錢五分

右每服五錢薑水煎食前服

黃連解毒湯

治時疾三日汗已解若煩悶乾嘔口

燥呻吟發熱不眠

黃連

炒叁錢

黃檗

炒半兩

梔子

炒肆枚

黃芩

炒貳錢

右每服二三錢水煎未効再服亦治熱痢

導赤散心

至寶丹

治諸驚癇心熱及卒中客忤煩躁風涎搐

搦或傷寒狂語伏熱嘔吐

生犀角

鎊

生玳瑁

鎊

琥珀

朱砂

水飛

雄黃

水飛各壹兩

金箔

伍拾片一

銀箔

伍拾片

片腦

壹匙

麝香

壹錢

牛黃

半兩

安息香

壹兩半為末西掬去砂取壹兩酒煎成膏

右各另研為末和勻入安息香膏如乾入熟蜜少

許丸桐子大每服一二丸人參湯化下量兒加減

用之

神芎丸 治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳

蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便

澀滯或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃 生 黃芩 各貳兩 生牽牛末 壹兩

滑石 肆兩 黃連 薄荷葉

川芎 各半兩

右爲末水糊丸如桐子大每服三四丸溫水下

酸棗仁湯

酸棗仁 去殼取仁 甘草 炙 生地黃

梔子仁 麥門冬 人參

當歸身 各等分

右剉細加燈心水二盞煎七分去滓溫服不拘時

朱砂安神丸 心

當歸補血湯 熱



注夏

薛脾爲太陰位屬坤土喜燥而惡濕故凡脾胃之氣不足者遇長夏潤溽之令則不能升舉清陽健運中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰不收兩脚痿弱嗜卧發熱精神不足飲食少思口中無味呼吸短乏氣促目中視物眊眊小便赤數大便不調名曰注夏此皆稟賦陰虛元氣不足之證丹溪補陰論言之詳矣育子者其可不知冬月養陽之道乎治法用補中益氣湯去升麻柴胡加炒黑黃礬主之若

因勞役發熱血虛脉大者用當歸補血湯氣血兩虛者八珍湯肝腎陰虧者地黃丸大便作瀉者人參理中湯若乳母肝火乘脾寒熱少食者柴胡梔子散胃火作渴者竹葉石膏湯小兒多因乳母之氣不調而致當戒怒氣調飲食適寒溫則可以遠病矣又如今人夏月皆以香薷湯浸冷代茶飲之殊不知香薷利水大損元陽厚朴剋伐大瀉真氣况脾性喜溫而惡寒夏月陰盛於內冷啜傷脾若胃強有火濕熱爲病之人固無大害其脾胃虛弱中氣不足者必爲腹痛少食泄瀉寒中之疾矣此大人亦所當戒者况小兒

乎慎之慎之

補中益氣湯 虛熱

當歸補血湯 虛熱

八珍湯 虛羸

地黃丸 腎

人參理中湯 吐瀉

柴胡梔子散 發熱

竹葉石膏湯 發熱

清暑益氣湯 治暑邪干衛身熱自汗

黃芪

蒼朮 泔浸去皮 各壹錢

升麻 柒分

人參

白朮

陳皮 炒

神麴 炒

澤瀉 各伍分

甘草

黃蘗 酒浸 炒

當歸身

麥門冬 去心

青皮炒

葛根各參分

五味子攷粒

右水煎服

清燥湯 治小兒自汗或因熱傷元氣大小便秘澀

黃芪炒

蒼朮各伍分

白朮

陳皮

澤瀉

人參

白茯苓

升麻

麥門冬去心

當歸身

生地黃

神麴炒

猪苓

黃檗酒拌炒各參分

五味子伍粒

黃連炒

甘草炙各貳分

右薑一片水一鍾煎服

舌

舌者心之候脾之脉絡於舌也二經有熱無所於泄而發於舌如舌絡微緊時時舒舌謂之弄舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重舌舌漸漸腫大塞滿口中謂之木舌

曾凡患此證是脾與心肝屢受極熱有所謂重舌木舌又謂之舌黃鵞口名雖異皆熱也大抵重舌生於舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉係舌傍肝之絡脉係舌本心之絡脉係舌根凡此三經或爲濕熱風寒所中則舌捲縮或舒長或腫

滿宜消黃散綠袍散主之及當歸散羌活散與服

當歸散

發熱

羌活散

發熱



錢弄舌者脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌治

勿用冷藥及下之當少與瀉黃散漸服之

田氏云若肥實者用

牛黃散

治之

或欲飲水醫疑為熱用冷藥下之者非也

飲水者脾胃津液少故也又加面黃肌瘦五心煩熱

即為疳宜加胡黃連輩

若大病未已用藥後弄舌

者凶

薛小兒舌微露而即收者名弄舌此屬心脾

虧損用溫脾散補之舌舒長而良久不收者名吐舌

乃心脾積熱用瀉黃散主之或兼口舌生瘡作渴飲

冷屬胃經實熱亦用前散作渴飲熱屬胃經虛熱用
四君子湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用七
味白朮散口角流涎或腮頰患腫胃虛風熱也先用
人參安胃散次用七味白朮散若午後甚者脾血虛
也四物多加參朮茯苓未應用補中益氣湯及審五
臟相勝若因疳瘦所致當參諸疳門

瀉黃散 脾

溫脾散 腹脹

白朮散 渴

人參安胃散 脾

四物湯 失血

補中益氣湯 虛羸

重舌 湯重舌附舌下近舌根生形如舌而小謂之重