

傷寒補天石
四



續傷寒補天石卷下

心悸

悸動原來有九症臍下奔豚桂枝湯
動悸小柴和胃府水乘心悸伏苓行

誤大青身動動古
來真武應如神

心悸者築築然怔忡不能自安是也有氣虛有停飲

氣虛者陽氣內弱心中空虛而爲悸又自汗下後正

氣虛而亦悸與氣虛而悸又甚皆須先治其氣也停

飲者飲水過多水停心下心火惡水不能自安雖有

餘邪必先治悸與水也如小便利而悸者伏苓桂枝



白木湯小便少者必裏急猪苓湯

猪澤滑伏膠

傷寒二三

日心中悸而煩小建中湯

桂枝赤芍棗飴糊

經云先煩而悸

者此爲熱先悸而煩者此爲虛故宜小建中湯太陽

發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝甘

草湯

二味用甘瀾水煎服

桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入

脾而緩中發汗後其人臍下悸欲作奔豚伏苓桂枝

大棗甘草湯

伏苓能伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘瀾

水者揚之無力陽明心下悸小便不利心煩喜嘔小

柴胡加猪苓湯少陽耳聾目赤胸滿而煩妄加吐下

則悸而驚小建中湯桂枝赤芍有熱小柴胡湯柴胡黃芩

人參少陰四逆湯附子甘草其人或悸四逆散柴胡枳實

甘草加桂枝心下有水氣厥而悸當先治水伏苓甘草

湯伏苓桂枝甘草生薑不然水入胃中必作利也

驚惕

驚惕者心中惕然而驚也火劫驚惕救逆湯桂枝湯中土芍

藥加蜀漆龍骨下後煩驚柴胡龍骨牡蠣湯柴胡龍骨參鉛

續傷寒論卷下

經傳身利天石

蠟大黃桂

伏棗同姜

膠麥冬

麻子仁

遂生驚惕者宜安神養心血之劑

心下滿

心下滿者當心下高起滿鞭是也不經下後而滿者

治有吐下之分若下後心滿者症有結胸痞氣之別

發熱者小柴胡治之按之汨汨有聲而濡者停水也

五苓散

桂枝白朮
猪苓

主之按之鞭痛者宿食也輕則消



導重則承氣下之寒在胸中心下滿而力飢不能食
瓜蒂散吐之陽明病心下滿鞭者不可下下之利不
止者死脉浮大有力心下鞭有燥渴譫語大便實者
此屬臟病宜攻之大抵心下滿胸中滿腹中滿俱不
可用甘甜之物蓋甘能補氣填實也外用姜擦法生
去汁取渣炒熟緝包熨以愈爲度惟熱結不可炒熟
餘結胸痞氣皆可用此法
按止言食縮屎在臟故
可下若食在胃口未
入于胃則不可下也

胸脇滿

胸脇滿者謂表邪傳裏必先胸以至心腹入胃是以

胸滿多帶表症宜微汗脇滿多帶半表半裏症小柴

胡湯和之凡治痞滿俱用柴胡桔梗湯

柴胡半夏甘草

亮桔梗如未效者合小陷胸一服如神蓋枳壳瀉至

高之氣枳實瀉至低之氣故心之上胸之分枳壳瀉

之心之下胃之分枳實瀉之瓜蒌仁瀉肺洗滌胸中

痰垢之要藥故胸滿而煩者加之

結胸痞氣

結胸痞氣者謂太陽自汗常服桂枝湯

桂枝赤芍姜棗甘

誤下之邪氣乘虛結于心下滿而硬痛者此為結胸

太陽無汗當服麻黃湯

麻黃桂枝杏仁甘草

而誤下之邪氣乘

虛結于心下但滿而不痛者此為痞氣凡結胸從心

下至小腹鞭滿而痛手不可近者為大結胸大陷胸

湯

甘遂芒硝與大黃

止在心下按之方痛者為小結胸小陷

胸湯

黃連半夏瓜蒌仁

冷水啜灌熱不得去煩滿無熱症者

為寒結胸三物白散

貝吉三分芭豆一分

或只實理中湯

人參

白木草乾姜加只實主之心下怔忡頭微汗出但結胸無大熱者

為水結胸伏苓半夏湯

伏苓半夏陳朴姜加腹皮梗木通蒼木吐衄血

不盡蓄在上焦漱水不欲嚥胸滿硬痛者為血結胸

犀角地黄湯

犀角生地芍丹皮

發熱微惡寒支節煩疼心下

支結外症未去者為支結柴胡桂枝湯

柴胡半夏人參甘桂枝芍

藥姜棗煎若胸脇滿而微結者為微結柴胡姜桂湯

柴胡甘草

天花粉桂枝牡蠣乾姜增

又有作酸惡食胸滿硬痛者為食結輕

則消導重則承氣喘渴咳嗽胸脇滿痰痛者為痰結

加味二陳湯

伏苓半夏甘草橘紅杏連吉梗瓜蒌同

若心下脹滿不痛為

痞氣瀉心湯

半夏黃芩乾姜參黃連甘草一同增

經曰按之痛寸脈浮

關脈沉名曰結胸凡結胸脈浮大者猶帶表症當吐

之未可下也下之者死結胸症悉其煩躁者亦死若

兼斑黃狂亂呃忒及脈微細沉小手足逆冷者死

凡心下鞭按之痛關脈沉者實熱也心下痞按之濡

關脈浮者虛熱也大黃黃連瀉心湯心下痞惡寒者

表未解也表解乃可攻痞解表桂枝湯

桂枝赤芍姜棗甘攻

痞大黃黃連瀉心湯心下痞而復惡寒汗出者虛熱

內伏陽氣外虛也附子瀉心湯

附子大黃黃芩黃連

協熱利

止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯

桂枝人參甘木姜

表

未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大

虛表裏不解故加桂枝甘草于理中湯也汗出胃虛

客氣上逆心下痞鞭乾嘔食臭脇下有水氣腹中雷

鳴下利者生姜瀉心湯

生姜甘參芎連棗

下後胃虛客氣上

逆下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭乾嘔



心煩者甘草瀉心湯

甘草連半棗乾姜

汗後胃虛是外傷陽

氣故加生姜下後胃虛是內傷陰氣故加甘草心下

痞鞭噫氣不除者旋復代赭湯

旋復人參甘草姜半夏大棗代赭

覆之鹹以契痞鞭代赭之重以鎮虛逆生姜半夏之

辛以散虛痞人參甘草大棗之甘以補胃弱痞不解

漉渴小便不利者五苓散心中痞鞭吐嘔下利者大

柴胡湯

芍半柴芩實大黃

胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者

此胃有寒也宜吐之瓜蒂散若不因下而為滿者表

邪傳至胸中未入乎腑症雖滿悶尚爲在表正屬少陽部分只宜小柴胡加枳桔以除其悶若未效宜小陷胸湯

黃連半夏
瓜蒌仁

一服如神

凡治結胸先理其氣

用只桔以寬之隨用姜渣擦之最效

胸中冷結厥第六

胸中冷結厥者謂手足冷脉仁緊心下滿而煩飢不能食者此病在胸中宜吐之寸脉微浮或伏胸中病鞭氣上沖咽喉不得息此胸中有寒宜吐之又有痰

實結胸亦宜吐之並用瓜蒂散

懊惱

懊惱者鬱悶不舒之貌蓋表症誤下正氣內虛陽邪

內陷于心胸之間重則爲結胸也大抵邪結胸中宜

吐邪結胃腑宜下發汗吐下後虛煩不得眠若刺者

必反覆顛倒心中懊惱與夫下後煩熱胸中窒者下

後身熱不去心中結胸者並用梔子豉湯三味苦寒

苦以湧吐寒以勝熱少氣者加甘草以益氣嘔者加

續傷寒論

生薑以散氣下後心煩腹滿臥不安者梔子厚朴

湯

梔子厚朴只實

九藥下之身熱不去微煩者梔子乾姜湯

陽明下後懊憹而胃中有燥屎承氣湯下之陽明無

汗小便不利心中懊憹必發茵陳湯

茵陳梔子大黃利之

身痛

脉緊而浮身熱痛太陽經病不堪任更兼中濕并風溫若是陰家脉帶沉

身痛者雖曰太陽表邪未解又有溫經發汗不同如

發熱惡寒頭疼身痛此太陽症也汗出則愈無汗麻

黃

麻黃桂枝杏仁甘

有汗桂枝湯

桂枝芍藥甘草

三時冲和湯

九味

羌活細蒼芍羌

防芷地芩甘同加減冲和湯吐利厥逆體痛此少陰

症也溫之則愈四逆湯陰症吐利厥冷發熱體痛霍

亂吐利體痛此表裏俱寒也先溫裏四逆湯

附子草乾姜

後攻表桂枝湯蓄血症體痛下盡黑物則愈桃仁承

氣湯

大黃桂枝桃甘硝

溫症體痛利小便則愈五苓散加蒼

朮羌活汗後脈虛體痛桂枝芍藥人參湯勞倦脈虛

體痛補中益氣湯

補中益氣參芪升當歸柴胡木共陳

加蒼朮羌活血

虛發熱體痛脈浮數無力四物湯中加黃相知母羌

續傷寒論卷下

活痰症骀痛二陳湯加蒼朮羌活身痛與身重有辨
身重不能轉側者下後血虛津液不榮于外也柴胡
龍骨牡蠣湯身痛不能轉側者風濕相搏子經而裏
無邪也桂枝附子湯桂枝甘附
素生姜大抵傷寒煩熱身痛
卽是熱痛汗出則解無熱比利身痛卽是虛寒溫之
則愈不可悞也

身痒第九

身痒者謂太陽病未解面赤身痒者以不能得小汗