

傷寒舌鑑



南京中医药大学图书馆版权所有
1964

自序

嘗讀仲景書。止言舌白胎滑。並無黃
黑刺裂。至金鏡錄。始集三十六圖。逮
後觀舌心法。廣至一百三十有七。何
後世證變之多若此。寧知傷寒自表
傳裏。舌胎必由白滑。而變他色。不似

伏邪瘟疫等。熱毒自內達外之一病。
便見黃黑諸胎也。觀仲景論中。一見
舌白胎滑。即言難治。安有失治而致
變者乎。所以仲景止言白胎已見一
班。不煩瑣屑。後人無先聖治未病之
能。勢不得不反覆辨論。以啓蒙昧。蓋



邪氣入裏。其虛實寒熱之機。必現乎舌。非若脉法之隱而不顯也。况陰盛格陽。與邪熱鬱伏。多有假證。假脉。惟驗舌上胎色之滑燥厚薄。昭若冰鑑。無所遁形。由是取觀舌心法。正其錯誤。削其繁蕪。汰其無預于傷寒者。而



參入家大人治按所紀及已所親歷
共得百二十圖。命曰傷寒舌鑑。授之
剖劂以公同志臨證之一助云。

康熙戊申如月誕先張登書于雋水

堂



南京中医药大学
1951
南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒舌鑑目錄

白胎舌 二十九圖

黃胎舌 一十七圖

黑胎舌 一十四圖

灰色舌 一十一圖

紅色舌 二十六圖

紫色舌 一十二圖

徽醬色胎舌 三圖

藍色胎紋舌 二圖

妊娠傷寒舌 六圖



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

傷寒舌鑑

清

長洲張登誕先彙纂

同邑邵之鵬三山較

日本

大泉前田安宅子仁

男

典子守

訂

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白胞。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒、發熱。在太陽經。則頭痛身熱。項背強。腰脊疼等證。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖證有煩躁。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經。

者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。腎虛者。理中湯溫之。如白色少變黃者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌亦有外證。不可忽視也。

舌苔白者。大都屬寒。惟大不寐。脾金虛。或亡火。舌中青。舌尖赤者。皆肺之不固。是寒客入肺。之證。其舌苔微小。則寒邪在裏。主嗜酒多食。白舌。大限白苔。白膩。再大白苔。白

白頭舌譜

日本 大根蒲田安谷年
同邑僧 太叔山
吳所處 翁叔山
李中藥



微白滑胎舌

微白

淡紅

薄滑白胎舌

薄白

深紅

此太陽裏證舌也。二三日未曾汗。故邪入丹田漸深。急宜汗之。或太陽與少陽合病。有此舌者。柴胡桂枝湯主之。

寒邪初入太陽。頭疼身熱。惡寒。舌色微白有津。香蘇散。羌活湯。之類發散之。

厚白滑胎舌



厚白

乾厚白胎舌

乾厚白

病三四日。其邪只在太陽。故胎純白而厚。却不乾燥。其證頭疼發熱。脉浮而緊。解表自愈。
病四五日。未經發汗。邪熱漸深。少有微渴。遇飲生冷。停積胸中。營熱胃冷。故令發熱煩躁。四肢逆冷。而胎白乾厚。滿口白屑。宜四逆散加乾薑。

白胎黃心舌白胎黃邊舌白



此太陽經初傳陽明府病舌也。若微黃而潤。宜再汗。待胎燥裏證具。則下之。若煩躁嘔吐。大柴胡湯加減。亦有下淡黃水沫。無稀糞者。大承氣下之。

舌中見白胎。外有微黃者。必作泄。宜用解毒湯。惡寒者五苓散。

乾白胎黑心舌白滑胎尖灰刺舌

乾黑


白

白


此陽明府兼太陽舌。其胎邊白中心乾黑者因汗不徹傳至陽明所致必微汗出不惡寒脉沉者可下之如二三日未曾汗有此舌必死。

此陽明府兼少陽舌也。三四日自利脈長者生弦數者死。如有宿食用大承氣下之十可全五。

白胎滿黑刺乾舌滑胎心舌



白胎滿黑刺乾舌滑胎心舌



白胎中生滿乾黑芒刺乃少陽之裏證也。其證不惡寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。

白胎中黑爲表邪入裏之候。太熱讞語。承氣等下之。倘食復而發熱。或利不止者難治。

白胎見於一邊。無論左右。皆屬

半表半裏。並宜小柴胡湯。左加

葛根。右加茯苓。有欬嗽引脇下

痛。而見此舌。小青龍湯。夏月多

汗。自利。人參白虎湯。

半邊白滑舌

白

白滑


黑黃

舌滑白藏結


或左或右。半邊白胎。半邊或黑
或老黃者。寒邪結在藏也。黃連
湯加附子。結在咽者。不能語言。
宜生脉散合四逆湯。可救十中

丁二

白胎燥裂舌



白胎斑舌



白胎中有黑小斑點亂生者。乃水來尅火。如無惡候。以涼膈散承氣湯下之。十中可救一二。

傷寒胸中有寒。丹田有熱。所以舌上白胎。因過汗傷營。舌上無津。所以燥裂。內無實熱。故不黃黑。宜小柴胡加芒硝微利之。

舌胎白而根黑。火被水尅之象。
雖下亦難見功也。

白胎黑根舌

黑
白

黃

白

白尖黃根舌

黃

白

邪雖入裏。而尖白未黃。不可用承氣。宜大柴胡湯加減。下後無他證。安卧神清可生。倘再有證。多誤。

此陽明裏證舌也。黃乃土之色。
因邪熱上攻。致令舌有雙黃。如
脈長惡熱轉失氣煩躁者。大柴
胡調胃承氣下之。

白胎雙黃舌

黑舌白

黃白舌

白舌白

白胎中見黑色兩條。乃太陽少
陽之邪入於胃。因土氣衰絕。故
手足厥冷。胸中結痛也。理中湯
瀉心湯選用。如邪結在舌根咽
嗌。而不能言者。死證也。