

金匱要略今釋 卷三

王薪華



金匱要略方論合釋卷三

川沙 陸彭年淵雷 撰述

受業妻嘉定沈本琰 參校

○肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七

論三首 脈證四條 方十五首

此篇所論皆呼吸器病。脈經與痰飲欬嗽合爲一篇。方十五首。併數炙甘草湯則十六首。肺痿據蘇遊許仁則之論。乃卽今之肺結核。肺癰乃眩括惡臭性或稱敗性腐枝氣管炎。枝氣管擴張。肺壞疽。肺膿瘍諸病。欬嗽上氣。則呼吸器病之通常證候。所眩尤廣矣。聞之太炎先生云。漢魏人喜服石。多用鍾乳。鍾乳爲炭酸鈣之結晶。其標悍之性。往往令疽發於背。然特能抵抗結核菌。故漢魏人病發背者。多病肺結核者少。淵雷謹案。本篇麥門冬湯。可用於肺痿而不稱肺痿。治肺痿者。惟甘草乾薑湯一方。及新附四方。今驗之。肺結核證。皆不對。豈仲景不常見此病。故不究其



治法歟。所見肺結核之證候。多有宜柴胡湯竹葉石膏湯者。其他如大黃蠅蟲丸。瀉心湯。乾薑黃連黃芩人參湯。三物黃芩湯等。亦往往適用。若用後世方。則莫如丹溪葛可久十藥神書亦佳。

問曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬口中反有濁唾涎沫者。何師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥欬。卽胸中隱隱痛。脈反滑數。此爲肺癰。欬唾膿血。脈數虛者。爲肺痿。數實者。爲肺癰。

尤氏云。此設爲問答。以辨肺痿肺癰之異。熱在上焦二句。見五藏風寒積聚篇。蓋師有是語。而用之以爲問也。汗出嘔吐。消渴。二便下多。皆足以亡津液而生燥熱。肺虛且熱。則爲痿矣。口中反有濁唾涎沫者。肺中津液爲熱所迫而上行也。口中辟辟燥者。魏氏以爲肺癰之痰涎膿血。俱蘊蓄結聚於肺臟之內。故口中反乾燥。

而但辟辟作空響燥欬而已。然按下肺癰條亦云其人欬咽燥不渴多唾濁沫則肺癰肺癰三證多同。惟胸中痛脈滑數。唾膿血則肺癰所獨也。比而論之。癰者萎也。案
作肺萎源如草木之萎而不榮爲津燥而肺焦也。癰者壅也。如土之壅而不通爲熱聚而肺癰也。故其脈有虛實不同而其數則一也。

丹波氏云。肺癰非此別一病。即是後世所謂勞嗽耳。外臺蘇遊傳屍論云。其初得半臥半起。號爲殮蝶。氣急欬者。名曰肺癰。許仁則論云。肺氣嗽者。不限老少。宿多上熱。後因飲食將息傷熱。則常嗽不斷。積年累歲。肺氣衰。便成氣嗽。此嗽不早療。遂成肺癰。若此將成。多不救矣。又云。肺氣嗽。經久將成肺癰。其狀不限四時冷熱。晝夜嗽。常不斷。唾白如雪。細沫稠粘。喘息氣上乍寒乍熱。發作有時。脣口喉舌乾焦。亦有時唾血者。漸覺瘦悴。小便赤。顏色青白。毛聳。此亦成蒸。又云。肺氣嗽。經久有成肺癰者。其狀與前肺癰不多異。但唾悉成膿出。陳氏婦人良方劫勞散證治云。勞嗽寒熱盜汗。唾中有紅線。名曰肺癰。註家俱爲別病。而詮釋之者。何快與駢。



南京中医药大学图书馆版权所有

同梁書姚僧垣曰。大黃快藥是也。魏云辟辟唾聲。恐非。蓋辟辟乾燥貌。張氏醫通云。言欬者。口中不乾燥也。若欬而口中辟辟燥。則是肺已結癰火熱之毒。出見於口。此說近是。

元堅云。口中反有濁唾涎沫。蓋係于該言稠痰白沫者。本經所謂痰者。非今之所謂痰。次條曰多唾濁沫。皂莢丸條曰時時唾濁。桔梗湯條曰時出濁唾。五藏風寒篇曰肺中風吐濁涕之類。皆今之稠痰也。蓋肺萎液燥。而口中有唾涎。故下反字也。

仁存孫氏方曰。詳觀肺癰肺痿二證。實難治。要之。肺癰則閒。有可愈者。亦須肺未穿。故可救。但肺痿罕有安者。蓋其肺枯竭乾燥。何由而得潤。所以難愈。

義金
慨述

淵雷案。肺結核之病。由結核桿菌竄入肺組織而起。菌之所至。先起炎症。上皮細胞繁殖堆積成一硬固小結節。故曰結核。其始小如粟粒而半透明。繼則漸大。變爲黃色不透明之硬核。結節中無血管。故不得榮養。易於壞死。壞死後成黃色乾

不睡。謂肺瘡誤也。

酪狀物謂之乾酪變性久而軟化成糜粥狀與痰唾同排出於外

結節之中部成空洞空洞之大小或僅如豌豆或過於胡桃空洞內壁又分泌多量膿液適爲結核菌之良好培養基空洞多者全肺有如蜂房此肺結核之解剖狀況也古人名爲肺痿者蓋知其病源在肺而病人羸瘦萎悴故也蘇遊許仁則之論但言病之經過及證候猶爲覈實後人鑿說痿字以爲肺葉萎而不榮則望文生義矣又古人不知結核菌而以亡津液爲肺痿之病源雖似膚廓其實切當何以言之西醫之治肺結核絕無良藥惟務美食將息知榮養佳良者能抵抗結核菌已亡津液卽失榮養之謂西醫之美食榮養乃補救於旣病之後仲景謂重亡津液則推原於未病之先其歸一而已矣夫臨渴而掘井孰若未雨而綢繆與其病後美食榮養孰若平時保全津液西醫知重預防不知津液之可貴未達一閑欬唾膿血以下脈經千金別爲一條此就欬唾膿血一證辨肺痿肺癰也舊注以欬唾膿血屬上讀謂膿血肺癰所獨有非是蓋肺痿肺癰外證之異肺癰則



南京中医药大学图书馆版权所有

屬實其欬劇其膿臭其人不甚羸瘦肺痿則屬虛其欬不劇或竟不欬其膿不臭其人羸瘦殊甚如此而已。

問曰。病欬逆脈之何以知此爲肺癰。當有膿血吐之則死。其脈何類。師曰。寸口脈微而數。微則爲風。數則爲熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脉。風舍於肺。其人則欬。口乾喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血爲之凝滯。畜結癰。膿吐如米粥。始萌可捗。膿成則死。

多唾濁沫。趙刻本作時唾濁沫。今從徐鎔本改。此條大意以風與熱爲肺癰之原因。蓋惡臭性枝氣管炎。枝氣管擴張。肺壞疽。肺膿瘍等多係續發病。其原發病必有欬嗽。欬嗽則因外感風寒而起。故謂之風。肺癰初起。有機能亢盛之證。故謂之熱耳。以呼吸不利。欬嗽口乾諸候分屬於風熱。未免鑿說。欬逆而脈微數亦不足以斷定肺癰。案脈經肺痿肺癰篇類此者更有六條。皆是叔和家言。非仲景舊文。

不可從矣。

危氏得效方云。始萌易治。膿成難治。診其脈數而實。已成微而濇。漸愈。面色白。嘔膿而止者。自愈。有膿而嘔食。面色赤。吐膿如糲米粥者。不治。男子以氣爲主。得之十救二三。婦女以血爲主。得之十全七八。歷試屢驗。

李氏入門云。肺癰脈數而虛。口燥咽乾。胸脇隱痛。二便赤澀。欬唾膿血腥臭。置之水中則沈。

潘氏醫燈續焰云。試肺癰法。凡人覺胸中隱隱痛。欬嗽有臭痰。吐在水內沈者。是癰。膿浮者是痰。丹波氏云。案今驗果如其言。又以雙箸驗之。其斷爲兩段者是膿。其粘著不斷者是痰。亦一試法也。

蘭臺軌範云。肺癰之疾。膿成亦有愈者。全在用藥變化。漢時治法或未全耳。

上氣面浮腫。肩息。其脈浮大。不治。又加利。尤甚。

丹波氏云。上氣諸家不釋。攷周禮天官疾醫職云。嗽上氣。鄭玄注。上氣逆喘也。此

一節卽是肺脹不治之證。淵雷案上氣肺脹之證。枝氣管性氣喘急性和枝氣管炎
枝氣管肺炎及肺氣腫俱有之。氣喘發作時雖甚困苦卻不致命。其發常於夜間
睡後。惟枝氣管炎及肺氣腫往往發鬱血性水腫而死。蓋因劇欬不已呼吸困難。
肺循環先起鬱血。馳至心室起代償性肥大。瓣膜閉鎖不全。全身靜脈鬱血遂發
水腫。然其致死之故不死於水腫。乃死於血壓之下降也。肩息者呼吸困難之故。
面浮腫者鬱血性水腫之故。脈浮大者心室代償性肥大之故。又加下利則胃腸
亦病。舊說以脾胃爲後天水穀之本。凡慢性病末傳見脾胃病者爲死期已近之
候。

上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈。

喘而躁者呼吸困難。肺循環鬱血之候。故知欲作風水。風水者水腫而汗出惡風。
詳水氣病篇謂之肺脹者。枝氣管性氣喘及慢性枝氣管炎發作時。肺部胸廓常
高張故也。發汗則愈者。汗劑能通利血循環。且鬱血時之滲出液從汗腺排出不

致竟成水腫故也。用治風水亦沈氏以爲卽下文小青龍之證是也。

丹波氏云。肺脹一證。諸家未有云後世某證者。攷下文云。肺脹欬而上氣。又云。欬而上氣。此爲肺脹。由此觀之。卽後世所謂呷嗽哮嗽之屬。巢源云。痰氣相擊。隨嗽動息。呼呷有聲。謂之呷嗽。本事續方云。哮嗽如拽鋸。是也。淵雷案。呷嗽哮嗽之證候。卽枝氣管性氣喘。枝氣管炎。及枝氣管肺炎也。

肺痿。吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者。屬消渴。

吐涎沫不渴。遺尿。小便數。皆是枝氣管性氣喘之證。病在呼吸器。而證候見於排泄器。故古人謂肺爲水之上源。又謂肺主行水。素問經脈別論云。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。此雖謬於生理。然觀察病變藥效。良信。因此之故。呼吸器病。見排泄障礙者。謂之上虛不能制下。謂之肺



南京中医药大学图书馆版权所有

中冷矣。傷寒金匱中凡云所以然者皆辭氣卑弱理致渺茫若非叔和附益亦是後人注文然擇而用之君子不以人廢言可也。眩而多涎唾皆肺胃寒證故以甘草乾薑湯溫之此條雖稱肺痿實非肺結核病以其不欬故不得爲肺脹以其不唾膿血故不得爲肺癰但以吐涎沫而謂之肺痿可見古人於病名殊疏略不足據若服以下九字脈經無之千金第十七卷肺痿門云服湯已小溫覆之若渴者屬消渴法稻葉元熙云若服湯已渴者屬消渴是假設之詞與吳茱萸湯條得湯反劇者屬上焦也傷寒論二百四十九條同例。

甘草乾薑湯方

甘草

炙四兩

乾薑

炮二兩

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

此卽傷寒論厥逆而煩躁吐逆之方用法方解互詳傷寒論今釋

青州醫談云甘草乾薑湯治毒迫心下而盜汗者又治胸中痛左臥則左痛右臥

則右痛者。皆毒迫心胸所致也。氣上迫喘欬。汗出多之症。有多吐涎沫者。世醫不知此方治汗。此方所以能治汗者。氣逆盛。毒氣自內發於外故也。

類聚方廣義云。老人平日苦小便頻數。吐涎短氣眩暈。難以起步者。宜此方。

方函口訣云。此方雖簡。其用甚廣。用於傷寒煩躁吐逆。用於肺痿吐涎沫。用於傷胃吐血。若虛證喘息。則用此湯下黑錫丹。凡肺痿寒證。其人肺中冷氣虛不能溫布津液。津液聚而化爲涎沫。故唾出多。然非若熱證之唾凝而重濁也。又不欬咽乾遺尿。小便數。有此等證者。與此方奇效。又病人嫌服此方不欬。只多吐涎沫而不唾者。案當是有涎沫而無痰也。用桂枝去芍藥加皂莢湯。奇效。又不煩躁。但吐逆。難用苦味藥者。用此方弛之。有速效。

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之。

外臺第十卷。上氣喉中水雞鳴門。引小品水上。有如字巢源云。肺病令人上氣。兼胸鬲痰滿。氣行壅滯。喘息不調。致咽喉有聲。如水雞之鳴也。丹波氏云。水雞二種。

本草蘇頌云。鼈卽今水雞是也。又司馬相如傳顏注庸渠。一名水雞。卽本草所謂鶴也。此云水雞。蓋指鼈而言。取其鳴聲連連不絕耳。

射干麻黃湯方

射干十三枝一法三兩

麻黃四兩半升

生薑四兩半升

細辛

紫苑

款冬花各三兩

五味子半升

大棗七枚

半夏大者洗八枚一法半升

右九味。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

千金第十八卷欬嗽門。用射干三兩。半夏半升。外臺第十卷上氣喉中水雞鳴門。引小品。用射干十二枚。皆用東流水煮。

丹波氏云。此治肺脹之方。凡本篇諸條。肺痿肺癰之外。悉屬肺脹。讀者宜自知耳。類聚方廣義云。治久欬不止。或產後喘欬。頸項生痰癰。累累如貫珠者。去細辛五味子。倍射干。加皂角子。有效。兼用南呂丸。

湯本氏云。先師和田啓治急性肺炎。先以桔梗白散取吐下。後用本方。然本方有細辛紫苑款。冬花等溫藥。故熱發時不可輕用。淵雷案。急性肺炎之發熱。固屬熱證。然細辛非薑附之比。不在禁例。紫苑款。冬花又非細辛之比。湯本之說太拘泥。方函口訣云。此方用於後世所謂哮喘。水雞聲。形容哮喘之呼吸也。合射干紫苑款。冬之利肺氣。麻黃細辛生薑之發散。半夏之降逆。五味子之收斂。大棗之安中。成一方之妙用。僉勝於西洋合鍊製藥。

欬逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠。皂莢丸主之。

唾。趙刻本作吐。今從徐本愈本改。徐氏云。此比水雞聲。乃欬而上氣中之逆甚者也。尤氏云。濁。濁痰也。時時吐濁者。肺中之痰。隨上氣而時出也。然痰雖出而滿不減。則其本有固而不拔之勢。不迅而掃之不去也。皂莢味辛入肺。除痰之力最猛。飲以棗膏。安其正也。

皂莢丸方

皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味。末之。蜜丸梧子大。以棗膏和湯服三丸。日二夜一服。

魏氏云。皂莢驅風理痺。正爲其有除瘀滯垢之能也。如今用皂莢澡浴。以除垢膩。卽此理也。蘭臺軌範云。稠痰粘肺。不能清滌。非此不可。淵雷案。本草別錄云。皂莢療腹脹滿。消穀除欬嗽囊結。案當是氣管枝囊狀擴張思邈云。沙牛白羊酥除胸中客熱。益心肺。

此方專事滌痰。以皂莢有石鹼質故也。然蕩滌刺激之力甚大。一日用量不得過梧子大三丸。老人虛人更宜審慎。

欬而脈浮者。厚朴麻黃湯主之。

丹波氏云。千金厚朴麻黃湯治欬而大逆上氣。胸滿喉中不利。如水雞聲。其脈浮者。方與本篇同。案本篇唯云欬而脈浮。恐是遺脫。千金所載。卻是舊文。元堅云。水飲上迫。脈必帶浮。不必拘表證有無。此二方證。謂本方及下澤漆湯均是上焦蓄飲。而以脈浮沈爲別者。蓋以勢之劇易。及水飲上迫與內結之異耳。注家特就邪爲分。殆非通

論。

厚朴麻黃湯方

厚朴

五兩

麻黃

四兩

石膏

如鵝子大

杏仁

半升

半夏

半升

乾薑

二兩

細辛

二兩

小麥

一升

五味子

半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服。

元堅云此方證係寒飲迫肺而無風寒外候故於小青龍湯中去桂枝以厚朴降逆爲君其佐用杏仁亦猶桂枝加厚朴杏子湯之例況配以石膏其驅飲之力更峻。

淺田氏云此方藥味似小青龍加石膏湯而優於降氣之力故用於喘息上氣者有效若治溢飲則宜小青龍加石膏又與射干麻黃湯互用惟此方宜於熱甚而脈浮者異於彼方之無熱又富貴安佚之人過食膏梁腹滿而欬者此方加大黃

有效麻黃與大黃伍兩解表裏與千金黑散同意頗有奇趣。淵雷案此方卽小青龍加石膏湯以厚朴杏仁小麥易桂枝甘草。小麥緩和收斂不利逐水方中亦少除痰之藥故知此方治欬逆上氣胸滿而痰不多者射干麻黃湯治欬逆上氣而痰多者小青龍加石膏湯則治欬逆上氣而表熱盛者千金黑散出第五卷少小嬰孺序例中其方乃麻黃大黃杏仁也。

脈沈者澤漆湯主之

此條徐沈諸家注本合上爲一條尤氏於脈沈上補欬而二字丹波氏云千金澤漆湯治上氣其脈沈者本篇亦似脫上氣二字尤氏云此不詳見證而但以脈之浮沈爲辨而異其治仲景之意蓋以欬皆肺邪而脈浮者氣多居表故驅之使從外出爲易脈沈者氣多居裏故驅之使從下出爲易亦因勢利導之法也。

澤漆湯方

半夏

半升

紫參

五兩
作紫苑

澤漆

三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生薑

五兩

