

卷五

寒濕條辨



傷寒瘟疫條辨卷五

醫方目錄

吳茱萸湯

小建中湯

附黃耆建中湯

當歸四逆湯

附加吳茱萸黃生薑湯

乾薑附子湯

桂枝新加湯

黃連阿膠湯

桂枝去芍藥加

蜀漆龍骨牡蠣

救逆湯

附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

加味溫膽湯

竹葉石膏湯

附人參竹葉湯

疎表湯

桂枝附子湯

附去桂加朮湯

人參固本湯

當歸六黃湯



黃耆湯

柴胡桂枝乾薑湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

大陷胸湯

附大陷胸丸

小陷胸湯

小半夏加茯苓湯

附小半夏生薑湯

枳實理中丸

海蛤散

枳殼桔梗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆花代赭石湯

桂枝加芍藥湯附桂枝加黃連湯

柴胡加桂枝湯

柴胡養榮湯

附柴胡清燥湯

五福飲

附七福飲

四君子湯

附香砂六君子湯

四物湯

附八珍湯十全大補湯

二陳湯

犀角大青湯

大建中湯

麻黃芍藥人參湯

四逆散

桂苓甘朮湯

甘草桔梗湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

葛根黃連黃芩湯

五味子湯

蘇陳九寶湯

十棗湯 附控涎丹

茯苓甘草湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾薑湯

丁香柿蒂散

滌痰湯

理中安虬散

烏梅丸

麻黃升麻湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝去桂加白朮湯

玉泉散

六一散

桂枝甘草湯

桂枝加附桂湯 附陽旦陰旦湯 甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

附芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

生地黃連湯

茯苓四逆湯

附六味回陽飲

導赤散

導赤瀉心各半湯

知母麻黃湯

黃連犀角湯

雄黃銳丸

百合地黃湯

三甲散

桂枝加附子紅花湯

黑龍丹

麻仁丸

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

大營煎

五苓散



猪苓湯

解毒承氣湯
附陷胸承氣湯

桂枝加厚樸杏仁湯
梔子柏皮湯

麻黃連軛赤小豆湯
金沸草散

地榆散
桃花湯

桂枝加桂湯
麻黃附子甘草湯

白通加人尿猪膽汁湯
去人尿猪膽汁即白通湯

桂枝二越婢一湯
八正散

太平圓酒
升麻龍甲湯

玉樞丹
撥正散



半夏散及湯

苦酒湯

猪膚湯

當歸導滯湯

芳香飲

三合湯

滾痰丸

文蛤散

白散

加味茵陳蒿湯

正方一百零十
附方二十



本草綱目卷之六	白芷	治寒濕	治寒濕	治寒濕	治寒濕	治寒濕
----------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------



寒溫條辨卷五

吳茱萸湯厥陰頭痛嘔而吐沫少陰犯真寒吐利
手足厥煩燥欲死及寒邪入陽明食穀欲嘔者
並此方主之

吳茱萸揀淨三錢生薑三錢大棗三枚人參一錢水煎溫服

厥陰肝也寒邪內格故嘔而吐沫厥陰與督脉會於
巔故頭痛少陰腎也腎藏中寒則上格乎陽而為嘔
吐經云腎主二便腎寒則大便不禁而為利下手足
得陽氣而溫內有真寒故令手足厥冷煩燥者陰盛



格陽故令陽煩陰燥其證多危故曰欲死吳茱萸辛
熱而氣厚專可開豁胸中逆氣經曰氣為陽氣厚為
陽中之陽故能走下焦而溫厥陰少陰也臣以生薑
散其寒也佐以參棗補中虛也

小建中湯

傷寒三四日心悸而煩及少陰惡寒腹

中急痛此方主之加黃耆蜜炙三錢名黃耆建中湯

白芍

酒炒四錢桂

甘草

炙各二錢生薑

大棗

二枚飴糖三錢

水煎去渣入飴糖溶化服

醫方考曰小建中湯宜用肉桂枝則味薄故用之以



解肌桂則味厚故用之以建中也愚按開後人補中益氣無窮之法門

此方是也

續論曰桂枝湯中白芍桂枝等分用白芍佐桂枝以治衛氣小建中湯中白芍四錢桂枝二錢用桂枝佐白芍以治榮氣更加飴糖以緩其脾故名之曰建中則其功用大有不同耳

當歸四逆湯手足厥寒陽邪陷內脉細欲絕陰盛四肢逆冷

此方主之

當歸 日芍 桂枝 各二錢 細辛 通草 甘草 各一錢

錢四
分
大棗二枚
水煎溫服
加吳茱萸二錢
生薑二錢

酒煎名當歸四逆加吳茱萸生薑湯治前證內

有久寒者

手足厥寒脉細欲絕似乎陰證之極蓋緣陽邪傳入厥陰榮分以本虛不能作熱故厥而脉細欲絕也此為陰陰是持厥鬱陽邪故用桂枝細辛以解表曰芍甘草以瀉熱當歸以和厥陰之榮血通草以通太陽之本府使陽邪得從外解原非治陰寒四逆之藥也故藥宜歸芍以濟陰不宜薑附以劫其陰也是證也

自表入裏雖曰傳至厥陰始終只是陽證與陰寒直
中三陰不同故不用四逆湯而用桂枝湯加當歸細
辛通草耳明者自知之

按昔人云人有陰血虧於陽分不能勝辛熱者更宜
此湯主之殊不知此唯有陽邪者宜之若無陽邪而
見此證則是陰血大虧矣投之禍不旋踵蓋細辛爲
少陰中表藥隨桂枝湯以解肌加當歸以和榮血至
於通草甘淡微寒能瀉丙丁能通水道爲虛寒者禁
用此湯治法本是和榮血以緩脉使陽邪得從肌表



而散或從膀胱而泄也若循其名以治陰虧寒中之
四逆則謬甚矣觀於傷寒論曰若其人素有久寒者
宜當歸四逆湯加茱萸生薑主之正如四逆散本以
散傳經之熱邪腹中痛者方加附子則當歸四逆湯
非治陰寒四逆之藥也明矣更有一等固守王道之
醫辯證不明遇有厥逆脉細之證不敢用四逆湯但
曰用當歸四逆湯極爲穩當不知此湯乃桂枝湯加
當歸細辛通草耳細辛隨桂枝湯止能解表通草又
爲疏通最有力之藥當歸一味果足以治陰寒四逆

耶藥不對證果可謂之穩當耶甚矣其不明於製方之理而以舛錯誤病也予前所云用方貴明其所以然者正謂此也

乾薑附子湯

少陰誤下復發汗晝日煩燥夜而安

靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者此方主之又陰盛格陽目赤面赤煩渴引飲脉來七八至按之則散為無根之脉以此方加入參主之

乾薑

二兩
附子 三錢

水煎溫服或云冷服



此卽四逆減去甘緩之甘草爲回陽重劑若加增藥
味反牽制其雄悍之力必致迂緩無功矣乾薑辛以
潤燥散煩和表裏之誤傷附子熱以溫中固表調陰
陽於旣濟陽回卽可用平補之藥益陽旣安堵卽宜
休養其陰切勿過用辛熱轉生他患也審之慎之

桂枝新加湯 汗後身痛脉沉遲者此方主之以桂
枝湯解汗後之風邪加參芍益不足之血脉亦
兩解表裏安內攘外之一法曰新加者因發汗
新虛明非桂枝湯中之舊法也