

医学六要



治法彙五卷

肝江

張

纂

金增

玉甫堂

校

脹滿

有寒有熱有氣滯有氣虛有血虛俱屬脾

寒初起脉沉伏或食寒涼傷脾而脹屬寒平胃

理中湯辛以散之

熱脉弦數膏粱酒色傷中濕熱鬱于中而脹者

屬熱小便必短數苓連梔子滑石苦以洩之大



南京中医药大学图书馆版权所有

便秘而脉數有力者遇僊丹或茵陳梔子大黃湯以通大便

氣虛脉緩弱無力或氣口大四倍于人迎食少倦怠朝急暮寬屬中氣虛補中益氣湯加厚朴氣不運加木香不能食者先用六君子湯

血虛脉弦數或瀉黑瘦口乾二便阻澀暮急朝寬屬血虛四物加二冬蘇子紅花桃仁泥以生血潤燥有火加薑製黃連大便秘用搜風順氣

丸一二服

氣滯脉沉結、或伏、或弦、晝夜不減、頻歎、氣屬氣滯、因暴怒、或抑鬱而成、用木香、流氣飲、或七氣湯、增減、

三錫曰、脹滿悉屬脾虛、運化不及、濁氣填塞所致、初起微佐以消化、舒鬱爲先、勢盛而二便澀滯者、微利之、弱人或稍久、一切病後、瘡疽後、產後、必參朮芪芍、大補脾氣爲主、而佐以消化、厚朴、木香、黃連、三類然、王道無近功、必數十服、以漸取效、常見用商陸、牽牛等行水法、一瀉卽消、

三日後復起而死者比比皆是良由病家不明
理醫者求速效天人天年悲哉歷考古今明醫
無踰于丹溪東垣薛新甫王損菴矣豈肯曠日
持久而不知尅伐之功速耶其如中氣何可與
高明言難與俗人道爾

肥白人腹脹多是濕痰二朮二陳平胃五苓加
減瘦人腹脹是熱用炒黃連厚朴白芍香附

炭血有口嗜煎煇及熱酒物致血蓄于中而脹
者大便必見黑物抵當湯丸下之不若桃仁承

氣湯加紅花蘇木、韭汁佳。

宿食如氣口緊滑、惡心飽悶而脹者，是食積口

乾內熱者，木香、檳榔丸，或枳實導滯丸下之。

初起挾寒食而脈弦者，木香、厚朴、丁香、砂仁、神

麴、香附。

內有濕熱外被寒鬱而脹者，用藿香、麻黃、升麻、

葛根、桂枝亦表散之。

怒則氣逆，兩脇脹滿，兩手脈弦，青陳皮、木香、梔

子、仁、蘆薈甚者，當歸、蘆薈丸。



厚味太過脾傷運化不及而脹者二朮二陳加
薑製黃連薑製厚朴蘿菔子或保和丸
因食肉過多而脹者山楂枳朮香附半夏麴有
火加炒芩連

脹而喘喘則必生脹脹則必生喘二者相因之
病脾不運而濁火上炎肺不得清則喘肺氣被
鬱喘而不得下降則脹治分新久虛實初起脉
實者二陳蘇子葶藶洩之二便通暢喘脹俱減
其功易



久病中氣弱、食少多鬱、悞人必用參朮補中藥、佐黃芩、麥冬以清肺、其效難、醫者不可因其難而妄攻下也、

丹溪曰、痺腹脹乃脾虛之甚、必用大劑參朮、佐陳皮、曰、茯苓、朮、厚朴之類、或曰、腹已脹矣、反用參朮何耶、曰、乃內經塞因塞用之法、正氣虛而不能運行、濁氣滯塞于中、今扶助正氣使之自然健運、邪無所留、而脹消矣、

素問曰、下氣虛乏、中焦氣壅、欲散滿則恐虛其

下欲補下則滿甚于中况少服則資壅多服則
宣通遂乃峻補其下以疏啓其中則中滿自消
下虛自實乃塞因塞用也如下痢日百度反用
大黃通利乃因通而用通故曰塞因塞用通因
通用且參朮之性少用則滋壅于上多服則峻
補于下又曰中滿者必須峻補其下以疏啓其
中然氣旣得峻補則上行而啓其中焦運行之
令使之疏通乃軒岐奧旨世多不解因吐者而
發明之

補脾藥必佐薑製厚朴以其溫能益氣辛能寬
脹也

王損菴曰每見俗工不明其道專守下之則脹
已者一法耳雖得少寬一二日然真氣未免因
瀉而下脫而邪氣既不降必復聚成脹遂致不
救可勝嘆哉因書一二證以驗之嘉定沈氏子
年十八患胸腹身面俱脹滿醫治半月不效診
其脉六部皆不出也於是用紫蘇桔梗之類煎
服一盞胸有微汗再服則身盡汗其六部和平

之脉皆出一二日其證悉平。又一男子三十餘
胸腹脹大發煩躁渴面赤不得卧而足冷予
其人素飲酒必酒後入內奪於所用精氣溢
邪氣因從其上逆逆則陰氣在上故爲臍脹其
上焦之陽因下逆之邪所迫壅塞於上故發煩
躁此因邪從下而上盛於上者也於是用萸棗
黃附子人參輩以退陰逆水冷飲之以解上焦
之浮熱入咽覺胸中頓爽少時腹中氣喘如牛
吼泄氣五七次明日其證愈矣。風寒暑濕脹



藿香正氣散

七情脹五膈寬中散木香流氣

飲沉香降氣湯

或飲食所傷脾胃虛弱以藜

水穀聚而不化此寒濕鬱遏而脹香砂調中湯

大怒而脹分心氣飲

憂思過度而脹紫蘇

了湯濕熱內甚心腹脹滿小便不利大便滑

泄及水腫大橘皮湯

失饑傷飽痞悶停酸早

食暮不食名穀脹大異香散

鷄矢醴治心腹

脹滿旦食不能暮食由脾元虛弱不能尅制於

水水氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣

不宣流上下痞塞故令人中滿旦陽氣方長穀
氣易消故能食暮陰氣方進穀不得化故不能
食其脉沉實滑病名穀脹用鷄矢白半升以好
酒一斗漬七日每服一盞食後臨臥溫服脾土
受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有
聲怔忡喘息名水脹大半夏湯煩躁水迷
忘驚狂痛悶喘惡虛汗厥逆小便多大便血名
血脹人參芎歸湯有因積聚相攻或虛或脹
者初用七氣消聚散日久元氣虛脾胃弱而脹

者、參朮健脾湯、少佐消導藥、
瘀蓄少血而脹、

腹皮上見青紫筋、小水反利、脉乳瀉、婦人多有、

此疾、先以桃仁承氣湯、勢重者、抵當湯、如虛人、

不可下者、且以當歸活血散調治、
勞倦所傷、

脾胃不能運化而脹者、補中益氣湯、加減法見、

勞倦門、
大病後飲食失調、脾胃受傷、運化且、

難而生脹者、先以化滯調中湯、次以參苓白朮、

散瀉利後、并過服通利藥、以致脾胃太弱而脹、

專以補脾為主、若瀉痢未止、間用胃風湯、
喘、

滿不得臥、虛則人參生脉散之類、實者葶藶湯
之類、胸膈滿脹、一身面目盡浮、鼻塞欬逆、清
涕流出、當用小青龍湯二三服、分利其經、却進
消脹藥、經久患泄瀉、晝夜不止、乃氣脫也、宜
用益智子煎濃湯服之、愈、凡腹脹、小腹脹、皆
有腎熱、三焦虛寒、石水、腸癰、女勞疸、
診法曰、脹滿脉弦、脾制于肝、洪數熱脹、遲弱陰
寒、浮為虛滿、緊則中實、浮則可治、虛則危急、高
陽生曰、腹脹浮大是出呢、虛小病深、命應促、

平胃理中湯

補中益氣湯

見勞傷門

遇倦丹

茵陳梔子大黃湯

見濕門

六君子湯

見脾胃門

搜風順氣丸

見風門

木香流氣飲

見氣門

抵當湯

見蓄血門

桃仁承氣湯

見蓄血門

台法彙五卷

長清



南京中醫藥大學圖書館版權所有

濟世靈丹卷三

當歸龍薈丸

見脇痛門

保和丸

見傷食門

藿香正氣散

五膈寬中散

見反胃門

沉香降氣湯

見氣門

木香流氣飲

見氣門

香砂調中湯

治飲食所傷脾胃嘔吐胸膈噎

噎或胸腹脹痛

藿香

砂仁

各一錢二分

蒼朮

米泔浸二錢

厚朴

薑

