

衛生家寶湯方

五

中國中醫研究院圖書館藏善本已出版書目

衛生家寶湯方

六卷

南宋

朱端章撰

簡易普及良方

六卷

明

彭用光撰

本草單方

十九卷

明

繆希雍撰

藥性通考

八卷

清

劉漢基撰

醫學金針

四卷

清

潘 爵撰

諸症辨疑

四卷

明

吳 球撰

百病問對辨疑

五卷

明

張 昶撰

主 編

胡國臣

編 委

王樹芬

朱占瑞

金 立

嚴康維

審 訂

傅景華



〔京〕新登字 027 號

責任編輯 徐岩春

題 字 王榮安

攝 影 孫一星

中國中醫研究院圖書館藏善本

衛生家寶湯方 宋 朱端章撰

中醫古籍出版社出版

新華書店北京發行所發行

北京大興韓營古籍印刷廠印刷

一九九四年三月第一版

一九九四年三月第一次印刷

ISBN—80013—491—5/R·488

定價五〇〇元



衛生家寶卷第五



凡八門

癰疽發背疾方肆拾玖道

療癰方陸道

諸漏方拾壹道

惡瘡疥癬紫白癰等疾方貳拾壹道

一切眼疾方陸拾陸道

口齒烏髭鬚方參拾參道

耳疾方陸道



諸喉風方戴拾陸道

口噤直覺覺舌卷餘未重

心肝肺古刺針重

肺經穴刺紫白刺善刺古刺針重

肺經穴刺重

肺經穴刺重

肺經穴刺重

小八

謝上表寶卷卷五

分



治癰疽發背等疾

灸發背

凡覺背上腫硬疼痛用濕紙貼腫上先乾處是頭
碾大蒜十頭入淡豉半合乳香一塊如龍眼大細
碾隨瘡大小用竹片作圈子竹片滴三分許隨腫
大小頓在瘡上杵所碾藥末填平鋪艾灸痛處以痒
為度以痛為度然後服白散子貼清涼膏若方腫
硬未有頭則當日腫消若已有頭則即時膿潰妙
不可言方具在後

又灸法

癰疽有脚以生姜用大黃黃丹法製一夜切為片

艾炷灸之脚自縮矣極妙

治癰疽生於腦髀背腋乳神効瓜蒌散

瓜蒌一箇

去皮焙研為末
如急用只爛研

甘草半兩

用生

通明沒藥一分

研

乳香一錢

別研

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升

清汁分作三服病在上食後服病在下食前服

毒已結成即膿化為黃水毒未成即於小便中出疾

有火字



甚再合服以退為妙

靈寶膏治一切癰疽發背

大瓜蒌

十枚隔二三年陳者去盡皮留核
子約有半升許用砂盆研細如粉

滴乳香

十塊如大指
大研細如粉

新胡桃

十枚不油者去
皮膜細研如膏

右用白沙蜜十兩同前藥於銀石器中極慢火熬

三時辰其稠如飴糖多合少合准此每服二匙無

灰酒半盞調下不拘時甚者不過三兩服安其効

如神

托裏散



滴乳香紙上焙過軟候冷研細合萊豆粉對用甘草
煎湯調下一日服兩服不妨每服一大錢不拘時
候

立効散治發背及諸般癰瘡

皂角刺半斤

揀去枯者細剉
炒黑色為度

甘草二兩

炒黃
色

瓜蒌五箇

去皮瓦
仁炒黃

乳香半兩

沒藥一兩

右五味為末每服二錢酒調下

桔梗湯治肺癰初萌

桔梗

甘草

薏苡仁

各二兩

右為麝末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

五香連翹湯治有名無名癰疽惡瘡已破未破疼痛

皆可服

黃熟沉香

青木香

母丁香

當門麝香

川升麻

桑上寄生

連翹

乳香

木香

獨活

去髮洗

牛舌大黃

去皮淨洗

右各等分共焙乾碎剉為剉散每服四錢水二盞

煎至一盞須用銀鉚煎如魚用銀一片食前空心

服第二次煎茅一次滓用水一盞煎至半盞茅三次用四錢末水二盞煎至一盞茅四次又煎茅一次滓水一盞半煎至半盞二遍煎滓共成四服

白散子治癸背候取下毒氣次用清涼膏貼之

白附子半兩

半夏

一分

姜製

香附子半兩

黑牽牛二兩

半生半炒

甘遂一分

以大麥炒黃赤色去麥不用燙

極熯火炒

右為末量患人虛實加減每服一錢以蜜酒調下續飲溫酒

一盞候所苦處刺痛為度微利三五行泻出惡物即差次用



膏藥貼之氣盛者每服二錢余更裁度

昇麻湯治肺癰吐膿血作臭氣胸乳皆痛

川昇麻

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

芍藥

牡丹皮各半兩

甘草三分炙

右為麤末每服一兩水一升半煎至五合去滓溫

服日三服

綠雲散治五毒發瘡生於背胸

金星鳳尾草

四兩乾秤形如鳳尾葉背有金星者

甘草節一分

右慢火焙為末分作四服每用紅酒一升煎三五沸



沸入冷酒二升和勻量力飲以醉為度立効如曾
服金石菜反者此菜尤妙

抵聖散治發背癰疽及一切瘡瘍腫毒

瓜蒌四兩

皮去

何首烏四兩

大山次菰二兩

甘草節二兩

地榆二兩

沒藥一兩

乳香半兩

麝香一錢

別研

右為末每服三錢溫酒調下連二服立便住痛一

日三服

麒麟竭散大治癰疽瘡毒至妙

麒麟竭研

赤茯苓為末

白茯苓為末

沒藥研

甘草節搥碎

已上各一兩

老天蘿子一箇

連皮切破
新者二箇

右用蜜一兩無灰酒二升於銀石器中煎天蘿子

甘草節至三盞分三服調前藥如曾服金石毒藥

先喫猪羊血方得服藥如不曾服金石藥只是氣

結更不必用猪羊血却以天蘿子酒調併進三服

其瘡自穿痛立止未成膿者即自消散已穿後又

進三服候膿化取下積熱毒如魚涎並不動藏府

次用後服

二妙散治癰疽止痛消毒

荷葉一兩

藁本半兩

右為末每用三匙水二椀慢火煎至一椀半放溫

淋洗

治指癰痛徹骨髓脚跟腫痛止痛膏

泥蜂窠

作窠於壁上螟蛉窠也或擡椅下間有之

乳香

少許

右同碾勻用新冷水調塗之痛立止

一方用醋調

七聖散消熱毒赤腫疼不可忍

每次用末二匙以冷水調

黃芩一兩 去黑心 大黃一錢 滑石四兩

右為細末用冷水調掃腫亦疼處如乾即再掃
治癰疽發背熱熨法

凡初覺腫或做瘡用牛皮膠煮令稀稠得所如鎔
化攤在紙上於覺處或做瘡處敷貼次用軟布帕
二條於釀米醋內煮令熱灑出遞去於膠紙背上
乘熱熨不可令布帕冷 怕二條不可灑出常留一條在醋內候一條冷即於
醋內換熱煮以冷怕再如瘡痒時須忍痒不可住
煮更去用之不可歇
熨直候膿出將盡即濃剪貫衆湯候溫洗去膠次

日看瘡中尚有膿出即是未効再如前將膠紙於
瘡上用墊醋布依舊熨令膿盡後用貫仲湯如前
洗去膠次日更看尚有膿又如前法熨膿盡瘡乾
為度然後用生肌紅玉散摻在瘡上即以萬金膏
貼每日上一次或兩上

淋洗法療癰疽敗爛膿水不絕

黃耆

當歸

白欬

敗醬

甘草

各二兩

黃芩

川芎

赤芍藥

各一兩

生

