

長沙方歌括要卷之二

傷寒論辨卷之二



張仲景傷寒論原文淺註卷六

閻長樂陳念祖修園集註

辨厥陰病脈證篇

○內經云厥陰之上風氣主之中見少陽是厥陰以風爲本以陰氣爲標而火熱在中也至厥陰而陰已極故不從標本從於中見也厥陰氣之爲病中見少陽氣化則消渴厥陰肝木在下厥陰心包在上風木氣上撞心心中痞熱火能消幾胃受木慾物故食故虽飢則上於膈故食則吐衄厥陰之標陰在下有陰無陽故而不欲食衄感風木之氣而生衄聞食臭利不止

此言厥陰自得之病乃厥陰病之提綱也

○厥陰風厥陰中風同氣相感也風爲木主氣病浮爲陽脈今脈微浮以陽病而得陽脈故爲欲愈若不浮不得陽脈也故爲未愈

述此言厥陰中風有欲愈之脈有未愈之脈也三陽經中風有中  
風形證傷寒有傷寒形證三陰中唯太陰篇有太陰中風四肢煩  
疼太陰傷寒手足自溫二證而少陰厥陰但有中風之脈而無中  
風之證蓋二經受病邪入已深風寒形證更無分別但陰經之脈  
當沉細今反浮者以風爲陽邪元氣復而邪將散故脈見微浮也  
浮則欲愈矣若脈不浮是邪深入不能外散故爲未愈

厥陰病欲解時從丑至卯上何也少陽旺於寅卯從丑至卯陰盡而陽生也解於此時者中見少陽之化也  
此言厥陰病愈之時也

厥陰病陰之極也若

渴欲飲水者得中見之化也得中

之病即從中治宜

小小與之愈若多與則

入於太陰  
而變證矣

此言木火亢盛得水濟之則陰陽氣和而病自愈  
男元犀按水爲天一之真以水  
濟火貴乎得當此曰欲飲水者與消渴引飲有重輕也

述厥陰篇自提綱後止此三節提出厥陰病其餘則曰傷寒曰病

曰厥曰下利而不明言厥陰病者以厥陰從中治而不從標本也

○手冷至肘足冷至膝爲四逆諸四逆厥者多屬陽氣大虛寒邪直入之證而熱深者亦間有之虛寒厥逆故不可下固不待言卽熱深致厥熱盛於內內守之真陰破爛幾亡不堪再下以竭之吾爲之大患其戒曰此皆

不可下之

推前言之虛之家卽不厥逆其亦然凡陰虛陽

述此起下文諸節厥逆之意

陰陽寒熱原有傷寒先

得厥陰之厥後得少陽中見發熱旣得熱化

標陰則互換之理厥陰傷寒先

自止

醫者治之得法從此厥不再作而利亦不見

時而利者必時

於熱再下矣否則復得標陰之氣仍如前之

不可下也

不可下也

亦然

傷寒論演說 卷二  
厥復利 循環不已而病勢日加矣

### 此言陰陽寒熱互換之理也

然而寒熱勝復復傷寒始

得時卽得少陽發熱既至六日一經已過復中見之熱化以有熱於

作再經不得

矣

視乎胃氣厥陰傷寒始

中見之熱化以有熱於

矣

少陽中見厥反至九日厥

之久而卽不利前詳其義茲不復贅大

凡厥利者當不能

之化其

厥反於九日厥

故能任所勝之氣而相

食今反能食者恐爲除中

何以謂之除中以其除去中氣求救於食如燈將滅而復明之象也當以索餅試之

矣

索餅爲肝之穀食以索餅而不暴發熱者知胃氣尚在

故能任所勝之氣而相

能勝胃氣今

安此必

其熱來而愈夫厥陰之厥熱最喜熱來誠熱暴之熱一來卽久出而復去也

可以厥回利

矣

三日脈之其熱續在者

乃中見之熱化猶存期之旦曰寅夜半子丑卽一陽之生氣有主期之旦曰卯夜半而

愈所以然者本發熱六日厥反九日今復續發熱三日并前六日亦

爲九日

期無太過相應故期之曰日夜半愈若再後三日脈之

不及而

過

矣

矣

而脈數其熱不罷者此爲中見太陽熱氣有餘逆於心發癰膿也  
此論寒熱勝復之理而歸重於胃氣也

○弟賓有按索餅素餅也不入葷腥故名素夜半陽生旦日陽長  
陽進而陰退也

述此節大意謂發熱則厥利止熱去則復厥利故厥陰發熱非卽  
愈候厥利轉爲發熱乃屬愈期耳是以厥轉爲熱夜半可愈熱久  
不罷必發癰膿可知仲景不是要其有熱要其發熱而厥利止厥  
利止而熱亦隨罷方爲順候何註家不達此旨強爲註釋以致厥  
陰篇中無數聖訓反成無數疑竇耶

前言脈數爲熱傷寒脈遲大七曰正藉此陰盡出陽之期得陽之而  
便知脈遲爲寒氣而可望其陽復也醫者不知而

反與黃芩湯微其熱則唯陰無陽矣蓋厥陰爲陰之盡當脈運爲裏

以得陽爲主忌見遲脈而反見之

脈運爲裏

寒今與黃芩湯復除其外熱則內外腹中應冷當不能食今反能食

此名除中

謂中氣已除而外去

必死

由此觀之傷寒以胃氣爲本之旨愈明矣

述此承上文脈數而推及脈遲反覆以明其義

厥傷寒先病標陰厥後得中見發熱既得熱化其下利必自止而反汗出

陰之氣而厥後之化而發熱化其

咽喉中痛者

陰液泄於外而火熱炎於上也內經云一陰一陽結謂之喉

其喉爲痺

所以然者以下利不當有汗有汗發熱之時陽無汗則熱

則陽熱反從汗而上升也最妙是發熱守中而無汗與厥

應而利必自止若

厥止而不止是陽熱陷下

必便膿血夫旣下陷而爲便膿血者

則陽熱不復上升而其喉不痺

上下經氣之相通如此

述此言熱化太過隨其經氣之上而爲病也

厥傷寒

二二日

未愈過於三日之少陽則從陽而交於陰矣

至四五日

未愈過於六日之厥陰則又從

陰而復於陽矣陰陽不可見見之於厥熱二証在陰

而

熱者十二日之後遇

必厥以此知其深

厥深者熱亦深厥微者熱亦微

此陰陽往來之治復之理也

厥法

與微之病以和陰

而反發汗者必火

熱必上炎口傷爛赤

以厥

陰之脈循頰裏環唇內故也

應下之

以和陰之氣

而反發汗者必火

熱必上炎口傷爛赤

以厥

此一節遙承上節諸四逆厥者不可下之恐人泥其說而執一不通也諸家謂單指厥而言非是

按前云不可下者指承氣等方而言也此云應下之指熱證輕有

四逆散重有白虎湯寒證有烏梅丸是也

沈堯封云此正邪分爭一大往來寒熱病也厥深熱亦深厥微熱

亦微猶言寒重則發熱亦重寒輕則發熱亦輕論其常理也其有不然者可以決病之進退矣故下文卽論厥少熱多厥多熱少不知註傷寒者皆以熱字作伏熱解遂令厥陰篇有熱無寒矣不思烏梅丸是厥陰主方如果有熱無寒何以方中任用薑附桂辛椒大辛熱耶蓋厥陰爲三陰之盡病及此者必陰陽錯雜况厥陰肝木於卦爲震一陽居二陰之下是其本象病則陽泛於上陰伏於下而下塞上熱之證作矣其病藏寒竄上入膈是下塞之證據也消渴心中痞熱是上熱之證據也况厥者逆也下氣逆上卽是孤陽上泛其病多升少降凡吐呴氣上撞心皆是過升之病治宜下降其逆上之陽取內經高者抑之之法非必硝黃攻

丸實熟方爲下劑卽烏柏丸一方已具方中無論黃連烏柏裏相  
苦酸鹹純陰爲下降卽附于直達命門亦莫非下降藥也下之而  
陽伏於下則陰陽之氣順而厥可愈矣倘誤認爲外寒所束而反  
發其汗則心中痞熱之陽盡升於上而口傷爛亦矣

陰陽偏則病而平則愈厥陰傷寒病其標陰在下故厥五日過五日當復厥不厥者候之數當六日而仍厥而厥之終不過五日而以發熱五日較之則其平故知其不見其平而自愈

述此言厥熱相應陰陽平當自愈也

手之三陰三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也

此申明上文致厥之由併起下文諸厥之病承上接下之詞也  
按陳平伯云本條推原所以致厥之故不專指寒厥言也看用凡  
字冠首則知不獨言三陰之厥並該寒熱二厥在內矣蓋陽受氣  
於四肢陰受氣於五藏陰陽之氣相貫如環無端若寒厥則陽不  
與陰相順接熱厥則陰不與陽相順接也或曰陰不與陽相順接  
當四肢煩熱何反逆冷也而不知熱邪深入陽氣壅遏於裏不能  
外達於四肢亦爲厥冷豈非陰與陽不相順接之謂乎仲景立言  
妙如此

業周易圖按陰陽者厥陰少陽也厥陰統諸陰之極少陽總諸  
陽之始一行陰道而接於陽一行陽道而接於陰陰陽相貫如環

失無端此順接也否則陰陽之氣不交則爲厥矣

厥有相似者必須細辨吐蛻尤其顛然者也而躁而不煩與傷寒病煩而不躁爲少陰厥陰之真面目亦生證死證之大關頑偏微爲少陰而厥爲少陰至再復於七日陽八日不得陽熱之化不脈微之本脈而厥之陰證至太陽之明之八日特手足厥冷而周身膚亦冷其人躁動不能爲之守也此爲少陰孤陽外脫而陰亦之膚亦

絕厥非爲厥陰尤厥也蛻厥者其人當吐蛻以吐蛻爲厥陰主證之大眼目也今病

者不躁而靜中而復有時發煩與無暫安此爲藏寒蛻不安上入於膈

故因蛻之煩又因蛻上膈而煩之下膈須臾煩復止得食而嘔卽所謂飢不能食是也又煩者

謂氣上撞心蛻聞食臭出其人當自吐蛻卽所謂食則吐蛻是也厥心中熱是也

故凡厥陰之變證不一無論見蟲不見蟲蛻厥者以烏梅丸主之又辨其氣化不拘其形迹皆可約其旨爲

主久利方何也以厥陰證非厥即利此方不特可以治厥而並可以治利凡陰陽不相順接厥而下利之證亦不能舍此而求

此借少陰之藏厥托出厥陰之蛇厥是明托法節未補出又主久利四字言外見本經厥利相因取烏梅丸爲主分之爲蛇厥一證之專方合之爲厥陰各證之總方以主久利而托出厥陰之全體是暗托法作文有借賓定主之訣余請與儒醫說此腐話

### 烏梅丸方

烏梅三百 細辛六兩 乾薑十兩 黃連 一斤 當歸四兩 附子六兩炮  
桂枝六兩 人參六兩 黃蘖六兩 蜀椒四兩炒去汁

細辛桂枝人參黃蘖蜀椒皆殊異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧桐子大

先食飲服十九曰三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食等

厥陰不特藉少陽之熱化而傷寒

微從少陽之熱化則熱少之標陰則厥微惟其

尤藉少陽少陰之樞轉厥陰傷寒

微從少陽之熱化則熱少之標陰則厥微惟其

熱少厥微故手足指頭帶寒

少陽主陽之樞少陰主陰之樞轉不出故

不厥冷而止見少陽

少陽主陽之樞少陰主陰之樞轉不出故

少陽煩厥陰躁陰陽不能以數

若樞轉利而三焦之決瀆得氣

此熱除也然病以胃氣爲本故欲得食

和胃氣

必於食驗之其人其病爲愈若

其後必便

厥而嘔

小陰樞轉胸膈不外也陰陽並

而出也

逆不得外出內傷陰絡

月經煩滿者

以陽樞轉不出也陰陽並

其後必便

其後必便

血

內經云陰絡傷則便血是也

以上俱言厥陰藉少陽之熱化之外又藉其樞轉且

又藉陽樞挾陰樞而俱轉也

熱邪內陷既爲便血證矣而寒邪內陷其證若何

病者手足厥冷

厥陰之中見之化而標陰之爲病重矣胸在上而主

陽腹在下而主陰今陰邪  
各從其類不結於上故  
以厥陰之脈過  
陰器抵少腹  
此冷結在少腹膀胱關元也

結於下故以按之而痛者

以手按之而痛者

小腹滿

以按之而痛者

述上節熱邪樞轉不出逆於陰絡而便膿血此節寒邪樞轉不出  
逆於膀胱閑元而爲冷結也○膀下四寸爲中極三寸爲閑元少  
陽之氣出於中極循閑元而上

厥傷寒發熱四日厥反三日復熱四日爲厥與熱之日數比較厥少熱多者陽進而陰氣退其勢當易愈若寒去熱不除者陽氣太過其後必使膿血

此節言陰陽勝負可以日數之多寡驗之也○厥陰病多有便血  
者以厥陰主包絡而主血也

述張註而經云人之傷於寒也則爲熱病熱雖盛不死是傷寒以  
熱爲貴也然熱不及者病太過者亦病故此二節論寒熱之至小  
以明不可太過與不及也

厥傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病勢爲進即其厥與熱之數比較寒之數而熱數少陰氣盛而陽氣退故其病爲進也

上節言熱勝於厥而傷陰此節言厥勝於熱而傷陽也陳平伯云  
上條以熱多而病愈本條以厥多而病進註家皆以熱多正勝厥  
多邪勝立論大失仲景本旨如果熱多爲正勝當幸其熱之常在  
以見正之常勝何至有過熱便膿血之變且兩條所言之厥皆因  
熱深非由寒勝發熱與厥總是邪熱爲禍有何正勝邪勝之可言

乃仲景以厥多爲病愈厥多爲病進者是論病機之進退以厥爲熱邪向內熱爲熱邪向外凡外來客熱向外爲退向內爲進也故熱多爲病邪向愈之機不是病邪便愈之候所以縱有便膿血之患而熱逼營陰與熱深厥逆者仍有輕重若是厥多於熱者由熱深壅閉陽氣不得外達四肢而反退處於邪熱之中復申之曰陽氣退故爲進見厥多熱少因陽氣退伏不因陽虛寂滅於熱深之病機爲進也此雖引而不發之旨然仲景之意自是躍如奈何註家不能推測反將原文蒙晦耶按此說未免矯枉過正

○厥陰有不治之傷寒六日厥陰主氣既至七日得陽熱之化陽欲絕而不行於脈微陽欲絕而不手足厥冷虛陽在上而不煩眞陰在下而不煩能下交於陰故煩能上交於陽故煩故用藥微行於四肢故