

濟陰綱目卷之十四

關中

武之望叔卿父著輯

武林

薛

芳汝楫父訂正

西陵

汪淇懌漪子箋評

天都

查

望于周父參閱

○世瀉

郭稽中曰產後腹痛及泄利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤曰肱脇臍脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以爲積滯取之禍不旋踵謹之謹之

陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之旣云飲冷當風何所不至寒熱風濕才屬外因喜怒憂思還從內性况勞役饑



飽皆能致病。若其洞泄可。服調中湯。赤白帶下。非此能愈。各隨門類別有三方。

此十一法須

體酌純熱然

只用八方加

減可謂要而

約矣而八方

之中以六君

子加味者五

補中益氣者

一而益黃四

神八味腎氣

等藥或兼或

減真切感當

於此得心其

他亦可變通

矣又何患方

之不廣用之

不神歟

薛氏曰產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當
而治之若米食所傷用六君加穀蘖若麪食所傷用六君子加麥
蘖若肉食所傷用六君加山查神麴丸兼嘔吐皆加藿香若兼嘔
酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮
薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中
益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若
脾土虛寒當用六君子加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及
四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便
澀滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若腎



北京中醫藥大學圖書館藏

氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞胎主於胃而繫於腎况九月十月乃育與膀胱所養必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也

一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣余以爲脾胃瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一婦產後泄瀉兼嘔吐噯酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君子炮薑爲主佐以越鞠丸而噯酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

一產婦泄瀉年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛目吐



六君加木香
薑桂而此止
加炮薑一味
爲主是又下
必拘於一定
之法矣

此法據前條
止用補中四

痰三碗許。脉洪大。重按全無。此命門火衰。脾土虛寒。而假熱也。吐
痰者。乃脾虛不能統攝歸源也。用八味丸補火以生土。用補中益
氣湯兼補肺金而脾胃健。
一產婦腹痛後重。去痢無度。形體倦怠。飲食不進。與死爲鄰。此脾
腎俱虛。用四神丸十全大補湯而愈。但飲食難化。肢體倦怠。用補
中益氣而康。

神而此又加
一十全大補
可見須因症
用藥毋執泥
也
此症若只擬
前法而用六
君補中不用
升陽益胃使

一婦人五月患痢。日夜無度。小腹墜痛。發熱惡寒。用六君子湯送
香連丸二服。漸愈。仍以前湯送四神丸四服。全愈。至七月終。怠惰
嗜臥。四肢不收。體重節痛。口舌乾燥。飲食無味。大便不實。小便頻
數。酒慄惡寒。悽慘不樂。此肺與脾胃俱虛。而陽氣虛寒不伸也。用
升陽益胃湯而痊。

非活法故知
立言之中
有不言之妙
所謂不盡意
也
丹溪云泄瀉
症最惡一切
湯飲石山亦
然所謂理無
二致也

江石山治一婦產後滑泄。勻水粒米弗容。時即泄下。如此半月餘。眾皆危之。或用五苓散。平胃散。病益甚。汪診之。脉皆濡緩。而精也。此產中勞力以傷其胃也。若用湯藥。愈滋胃濕。非所宜也。全以參

白朮散。除砂仁。加陳皮。肉豆蔻。煎薑棗調服。旬餘而安。

治產後腸胃虛怯。冷氣乘之。腹脇刺痛。泄瀉不止。

良薑

當歸酒

肉桂不見

白芍炒

川芎

附子

炮去皮尖
各一兩

人參

甘草

炙各
半兩

右咬咀。每服三錢。水煎服。

荳蔻理中丸。治產後元氣虛弱。臍腹疼痛。泄瀉不止。又治男子

脾胃虛弱。久泄不止。

人參

白朮

乾薑

甘草

炙各
五錢

肉豆蔻

煨
七錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十九空心米飲下酒者
麪糊丸亦可

神効參香散

治產後脾胃虛寒泄瀉洞下及痢疾日久穢積

盡滑瀉不止此收澁如神

人參

木香各二錢

肉豆蔻

煨

白茯苓

白扁豆

各四錢

陳皮

罌粟殼

去帶醃醋
各一兩

此收澁之劑
陳皮與罌粟殼
相等得處方
之妙

右為細末每服一錢七清米飲調下食遠服

萬歷己亥余官金陵內人十二月產難經宿始娩越旬日洞瀉
點水入口即下內人恐懼大哭自謂必死余偶有此藥用一錢
以米飲調服纔下瀉即止真起死迴生之藥也

○痢疾

大全云產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或



痢赤爲熱青
白爲寒此古
人之論自河
間論出不分
五色均以爲
熱豈古今不
同歟大槩始
於傷寒久變
爲熱故熱者
多而寒者少
未可執以無
寒也必因症
求之爲當

勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風食乘虛入於腸胃
若誤食生冷則難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變爲痢
也若血滲入大腸則爲血痢難治世謂之產子痢也得冷則自或
如魚腦得熱則赤黃或爲驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血
相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產
後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下痢又右
產後氣血不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則
溫之冷熱相搏則調之滑者澀之虛羸者補之水穀不分者當利
小便若產婦情性執着不能寬解須當順其氣未有不安者也
薛氏曰前證白屬氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利
一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹服

者果脉大無理尋愈

力何不溫補

而乃用黃芩

芍藥湯者以

纏墜極痛之

症為積滯未

去也故從症

不從脉焉一

凡胃氣虛不

能致津液以

養臟腑而渴

者宜一味曰

木煎湯代茶

庶無水腫之

患

流氣飲子。又小腹一塊不時上攻飲食愈少。此脾胃虛寒肝木剋

侮所致。用補中益氣加木香吳茱萸漸愈。又用八珍大補兼服調

理尋愈。

一婦產後痢未至月滿。因食冷物及酒。冷熱與血攻擊滯下。純血

纏墜極痛。其脉大無力。口乾用黃芩芍藥湯三服而安。

產後下痢作渴者。水穀之精化為血氣津液。以養臟腑。臟腑虛燥

故痢而渴。若引飲則難止。反溢水氣。脾胃既虛不能剋水。水自流

溢浸漬皮膚。則令人腫。但止其渴痢則自瘥。

薛氏曰。痢證若渴而不喜飲食。屬胃氣虛不能生津液。宜用七味

白朮者。夜間發熱口渴。屬腎水弱而不能潤。宜用六味丸並佐以

益氣湯以滋化源。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

此以四物湯
去川芎加艾
膠所以止血
也而歸甘各
用三兩為君
所以和氣血
而止腹痛耳
妙在甘以緩
之

白芍

阿膠

艾葉

熟地黃

各一兩

當歸

甘草
各三兩

右咬咀水煎分二服空心飲

加味四君子湯 治產後赤白痢神効

人參

白朮

白茯苓

甘草
炙

黃耆
各一錢

瞿麥

炙去蒂
五分

右剉水煎

以上二方治虛滑

白頭翁加甘草阿膠湯

治產後下痢虛極脈經作熱痢重
下新產虛極者

白頭翁

甘草
炙

阿膠
炒各二兩

黃連

黃蘗

白頭翁湯原
仲景治協熱
赤痢藥而脈
經加膠甘以

常試之味
參朮粟穀豈
在虛滑不飲
分兩此方重
而前方妙在
虛一為血虛
二方一為氣
虛一為血虛



治熱產極虛
然非熱病下
血其敢用乎

前以四君藥
克治氣虛而
滑此以四物
藥壳以治血
熱虛滑氣血
之分智者自
辨而止瀉之
劑并滑勿投
慎之
此方以三黃
解毒為主非
真熱勿用辨
之

秦皮
去皮各三錢

右剉作二服水煎納膠令消盡溫服

槐連四物湯

治產後熱滑血痢臍腹痛

當歸

川芎

赤芍藥

炒

生地黃

槐花

黃連

炒各一錢

御米殼

去蒂蜜炙五分

右剉水煎服

黃連丸

治產後熱滑赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連

四兩

黃芩

黃柏

各二兩

梔子仁

阿膠

蒲黃

各一兩

當歸

二兩半

右爲末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲下日三夜一

以上三方治熱滑



北京中醫藥大學圖書館藏
1664

以下出症字
字真切不落
神効參香散 治痢疾日久穢積已少腹中不痛或微痛不窘但

一空用此方
者須知集方
滑溜不止乃收功之後藥也

之心所謂無
妄之藥勿試
方見前泄瀉

也
以血瀉而用
一方 治產後血瀉不禁餘血作痛兼塊屬寒滑者

姜桂人所難
桂心 乾薑 各等分

信而謂寒滑
右爲末空心酒調服方寸七

不禁又所當
以上二方治寒滑

遵大聖道愛
神仙感應丸 產後固無積痢多有因食葷味早亦作瀉痢者百

休認之
無一生非此方不能救之三二服立止不然在萬日月致不救

此方以神仙
也如不因食葷者不可服

感應爲各必
致泄者脾虛

非虛語然以
必辨故用參

神麴炒一人參 枳殼麴炒去穢赤石脂 熟地



北京中醫藥大學圖書館版權所有

米而神麴爲
 化食之用秘
 壳佐之赤石
 脂固之似矣
 而熟地何爲
 也大抵腎者
 胃之關產後
 腎虛氣不能
 固故用之歟
 於食薑不食
 薑可服不可
 服之理自非
 常人所知
 凡治積方不
 等而此所藥
 方一用地黃
 石脂此用連
 翹好墨亦大
 異也其他不
 過溫氣行氣

右爲細末每服三錢空 心米飲調下

連翹丸 治產後久病赤白痢益因脾胃不和氣滯積聚所致

腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛危困者

連翹 陳皮 白 京三稜 各錢 肉桂 不見 檳榔

牽牛子 取頭 蓬朮 青皮 去白名 肉苳蔻 麩裏 好墨 各半

右爲細末麩糊丸如桐子大每服三十九丸米飲下或用水煎服

亦可

以上二方治積痢

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨 燒綿灰 血餘灰 并脂者 各等分



右爲細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

一方 治產後痢日五十行者

取木裏蜜炒黃急以水沃之令稀調得所服之卽愈

治產後諸痢雜方

取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

一方煮雞白食之

一方羊腎脂炒雞白空心食之

一方敗龜板一枚米醋炙研爲末醋湯調下

治產後血痢雜方

一方用阿膠二兩以酒一升半煮一升頓服

一方用生馬齒莧搗汁二大合煮一沸下蜜二合調頓服



以上雜治方

必効方 療產後痢而渴飲無度數

清心生液

麥門冬三兩

烏梅二十箇

右細剉水一升煮取七合細呬

經効方 療產後久痢津液涸渴不止

龍骨

十二分

厚朴

茯苓

黃蓍

麥門冬

人參

各八分

生薑

六分

大棗

十四枚

右細剉以水一大斗煮取七合空心分兩服

錄驗方

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜一枚黃泥糊厚五寸煨爛熟去皮絞汁服之痊

七味白朮散 治產後痢津液竭渴不止

為消渴所宜
故服之



北京中醫藥大學圖書館版權所有

大和脚以生津

六見前渴

以上治痢疾發渴。

○大便秘澁

郭稽中曰產後大便秘澁者何答曰產後水血俱下腸胃虛澁津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥屎在臍腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

薛氏曰前證因去血過多太腸乾澁不可計其日期飲食數多而用菜通之必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪膽汁潤之若服若寒疎通之劑反傷中氣或愈加難通或通而不止或成痞證也若去血過多者用十全大補湯若血虛火燥者用加味



四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故
仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則
矣

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖
倍余數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用
猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少或云
通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾
腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不
然多致不起

一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等藥致吐瀉不食腹痛胸痞

余用六君子加木香炮薑治之而愈

一婦人大便秘澀諸藥不應苦不可言令飲人乳而安

李氏曰產後大便閉者芎歸湯加防風枳殼甘草秘澀者麻

九或蘇麻粥蓋產後去血多則鬱冒鬱冒則汗多汗多則大便閉

皆血虛也

調導散 治婦人產前產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳殼各四錢 甘草炙二錢

右咬咀每服一兩用生薑三片棗一枚水煎溫服忌動風物

麻仁九 治產後去血過多津液枯竭不能轉送大便閉澀

火麻仁研如泥 枳殼麩炒 人參各一兩 大黃半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九空心溫酒米飲任下未

用防風者
欲降之必先
升之也

平金剛目
卷十四 大便秘澀
天德堂

