


傷寒舌鑑下



槐半


醫學叢書

1-68-2

藏



舌滑中灰



淡淡灰色。中間有滑
脂四五點如墨汁。此
熱邪傳裏而中有宿
食未化也。大柴胡湯
舌淡白而嫩黃色。

舌少黃根多黑灰

黃
灰

舌灰色而根黃乃傳厥陰而胃中復有停滯也傷寒六七日不利便發熱而利汗出不止者死。正氣晚也。



北京中医药大学图书馆版权所有

傷寒舌證

淡紫

灰

舌邊灰黑而中淡紫
時時自嚙舌尖爲夾
乃少陰厥氣逆上。非
藥可治。



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆所有

卷之三

三

中華書局影印

新編

卷之三

中華書局影印

新編

卷之三

中華書局影印

新編



试读结束，需要全本请在线购买：www.gutenberg.org

紅色舌總論

夫紅舌者。伏熱內畜於心胃。自裏而達於表也。仲景云。冬傷於寒。至春變爲溫病。至夏變爲熱病。故舌紅而赤。又有瘟疫疫癘。一方之內。老幼之病皆同者。舌亦正赤而加積胎也。若更多食。則助熱內蒸。故舌紅面赤甚者。面目俱赤而舌瘡也。然病有輕重。舌有微甚。且見於舌之根尖中下左右。瘡蝕脹爛。瀰細長短種種異形。皆瘟毒火熱蘊化之所爲也。其所治亦不同。當解者內解其毒。當砭者砭去其血。若論湯液。無

傷寒醫錄

卷三

過大小承氣黃連解毒三黃石膏等。此類而推可也。




南京中医药大学图书馆版权所有
1951

舌 中 純 紅



舌見純紅色乃遍發之邪熱初蓄於內也宜敗毒散加減或升麻葛根湯等治之

紅 中 淡 黑 舌




舌紅中見淡黑色而有滑者乃太陽癧也如惡寒有表證雙解散合解毒湯微微汗之汗能急下如結胸煩燥直視者不治



北京中医药大学图书馆版权所有

紅中焦黑舌



舌見紅色中有黑形
如小舌乃癟毒內結
於胃火極反兼水化
也宜涼膈散若黑而
乾硬以指甲刮之有
聲者急用調胃承氣
湯下之

紅中黑斑舌



見小黑斑星於紅舌上者乃瘟熱乘虛人於陽明胃熱則發斑也或身上亦兼有紅赤斑者宜黑參升麻湯化斑湯等治之

古方

舌內黑尖紅

紅

黑

舌本紅而尖黑者足
少陰瘟熱乘於手少
陰地竹葉石膏湯


舌裂紋字人色紅



舌紅甚而又有紋者陽明熱毒熏蒸膈上故見人字紋也宜服涼膈湯如渴甚轉夫氣者大承氣下之




舌 紋 裂 斷 紅



相火來乘君位致令
舌紅燥而紋裂作痛
宜黃連解毒湯加麥
門冬寒潤之

紅內星舌




舌見淡紅色又有大
紅星點如瘡癧者溼
熱傷於脾土盦而欲
發黃之候宜茵陳蒿
湯五苓散選用



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

深紅蟲碎舌




舌紅更有紅點坑爛如蟲蝕之狀乃水火不能既濟。熱毒熾盛也。不拘日數宜小承氣湯下之不退再以大承氣下之。



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Traditional Chinese Medicine Library

紅色紫瘡舌

紅



瘟疫多有此舌其證

不惡寒便作渴煩躁

或歎渴者宜解毒湯

加黑參薄荷并益元

散治之。尺脉無者必

死。戰慄者亦死。