

兒科

瘡科

痘科

會約醫鏡



示

羅氏會約醫鏡目錄

兒科

治生下不啼

斷臍妙法

生下浴法

三週洗法

治臍濕方

夜啼治法

不乳而哭

小兒臍風

小兒臍病

口噤不乳

小兒急驚風

治急驚風

因證加法

急驚兼外感治法

治急驚單方

治心熱急驚

治肝熱急驚

治痰塞上焦

治痰滯驚風

治一切急驚

論小兒慢驚

治脾虛慢驚

治脾腎兩虛慢驚

治脾虛木旺慢驚

治驚嚇

論發搐

論小兒虛證絕證

論小兒諸熱

治表熱

治裏熱

治虛熱之輕者

治虛熱之甚者

治實熱

論小兒疳證

治小兒一切疳證

統治疳積 治疳

鼻齕 治疳諸瘡

外治疳齕臭爛

內治疳齕牙宣

治走馬疳

小兒睡法

調護小兒諸法

治瘡毒實證

以下三方次第以洗潰瘍

止潰瘡疼痛

治膿成自潰

鮮毒以生肌肉

収口摻藥

治肺癰

先治肺癰

繼治肺癰

治腸癰

治乳癰及一切大毒

治腸風下血

治痔漏下血

治廉瘡

治痔下血

頸核

癰疽惡瘡

疔瘡

破癰方

多骨疽

紫白癰風

梅瘡

腫毒初起

赤斑癢痛

癰癰不斂

男女下疳

下疳瘡

魚口瘡

瘤贅

脚瘡

大風癰瘡

濕瘡疥癬

瘡口不斂

香辦瘡

漆瘡

便毒便癰

乾疥

消風湯

膿瘡

砂核外治

瘡中有蛆

牛皮癬

護心散

血風濕瘡

天泡瘡

腎囊風

汗斑

湯火傷瘡

金瘡跌傷

丹毒

廉脛瘡

罨夾棍傷

肥瘡

脚指縫癢爛

久病睡法

羅氏會約醫鏡目錄

瘡科

論瘡證不一 虛實治法 論灸法散毒神方

用附子餅灸瘡潰易斂 論瘡毒用涼用熱之法

論表散之法 論下之毒之治 論腫證不一

論膿已成未成 論內證宜診脉 論毒結時治法

論膿深淺成否 論針法要恰當 瘡毒初起

瘡毒潰後不斂 治氣血兩虛腫毒 治瘡毒始終仙方

治瘡毒一切虛證 治瘡毒虧弱險證 以後論因證調治

治瘡毒純陽

外敷瘡毒純陽

治瘡毒半陰半陽

外敷瘡毒半陰半陽

治瘡毒純陰

外敷瘡毒純陰

論外敷涼藥之害

論止痛在對證用藥

外敷陽毒癰疽

外敷堅頑癰疽

治濕熱癰瘍

治一切腫毒

論收欬藥不可早用

治瘡毒又用收瘡口

論瘡宜用香藥

治瘡始末皆宜

論治宜因證

論疽潰後脉證吉凶

論瘡瘍勿早食肉

治一切瘡毒

治瘡潰爛及湯火傷敗

外治一切瘡毒始末俱效神方

治瘡毒初起先爲疏通

治瘡瘍始末神效

治毒護臟

治一切大毒神方

羅氏會約醫鏡卷十九

湖南整齋羅國綱振占氏著輯

俊賓初氏

胞弟羅國興盛世氏校定

英冠羣氏

男定泰鴻編次

兒科全書繼出先錄緊要
病證方論以便取用

治生下不啼或因產難或因冒寒急以綿絮裹抱懷中頻以

斷臍妙法

熱水浸胞衣。要用油帛作條。點燃於臍帶往來燎之。熱氣由臍入腹。便啼。然後洗浴。方可斷帶。

生下浴法

小兒生下。先斷臍。後洗浴。濕從臍入。或變臍風。且多死不治。即啼者。亦宜洗後。斷臍留四五寸。於臍帶近肚處。緊緊扎住。勿引風進肚爲妙。斷後用艾葉揉軟如綿。綢包護臍。永不肚痛。小兒生下。以益母草煎湯洗之。一世無瘡疥。又方用桃李梅葉煎湯浴之。亦妙。無葉時。用根浴。訖以輕粉少許摩身。不畏風。又解諸毒。

三週洗法

小兒洗三週。用猪胆汁三個。入水七八碗。煎至五六碗。待水溫。

治臍濕方

夜啼治法

和勿下生水。洗之時切莫濕臍。恐濕邪入肚。變生臍風。不如洗九週。待臍帶落。洗之更穩。

小兒臍濕。用髮灰。綿灰。毡帽灰。皆可敷之。但防外風襲入。不可久露

小兒夜啼。有向光而止者。有起坐而止者。可知抱兒者。平常宜

背光。或初啼。勿輕起坐。否則慣而難止。治法不一。錄之以脩

取用。黑牽牛末。錢一水調敷臍上。五倍子末。錢二津涎調敷

臍上。又甌帶懸戶上。又蟬脫用後半截。三個研末敷乳上。

令吮之。或用鈎藤湯調服。或用薄荷湯調服。又抱雞窠草

或猪窠草。密安蓆下。勿令婦知。又用硃筆於兒臍下書一

田字。○又燈花^{四三}顆塗乳頭上令兒吮之即燈草燒灰加辰

砂少許亦妙。○又用本兒初穿衣衫放瓶內。○又木香磨水

調乳香沒藥末少許煎數沸服。○又用柴頭一個長四五寸

削平一面硃砂水寫云撥火杖。撥火杖差來作神將捉着夜

啼鬼打死不要放急急如律令勅。敬以書之豎安房內席上

不乳而哭

凡初生小兒不乳而哭速看兒口中上腭牙藏等處必有白泡。

或黃泡俗名姜牙急用銀挖耳刮破之隨用絮抹乾勿使嚙

之。一刻即愈。或於刮破處以好墨塗之或以桑樹白汁塗之更妙

小兒臍風

凡小兒臍風可以預免於斷臍時勿使入風入水詳上斷臍法

內。至於有病撮口不乳治法不一。錄之。以便取用。白姜五
二枚炒研蜜調服。又鈎藤鈎甘草煎服。又將死危證搗
蒜安臍。以熟艾炙蒜上。要至口中有蒜氣方止。仍以蒜汁滴
鼻中。又用全蠍酒炙爲末。少加麝。以金銀煎水調半字服
之。又艾燒灰厚敷臍上。以綢絹裹之。又附子肉桂等分
爲末。以生姜自然汁調作餅二分厚。安臍上。帛蓋之用熨斗
以微火久熨。母服五苓散。加當歸吳茱萸木香乳香沒藥鈎
藤各一錢。或兒同服。更妙。若臍旁青腫。手拳口噤。啼不吮乳
者。凶。或用全蠍一二枚酒炙爲末。加麝少許。以金銀煎湯調服之

小兒臍病

口噤不乳

小兒臍帶。或有所犯而落。故根未斂。潰腫而成瘡者。宜白龍骨。黃柏。枯礬。爲末。敷之。○又蝦蟇燒末。敷之。○臍腫。荊芥煎湯。洗後。煨葱貼之。但須常看抱裙。勿有尿濕也。○臍突。其狀如吹起者。以臍下爲氣海。兒多哭。則氣動於中。自臍突於外。須設法使之不哭。方可養也。方用赤小豆。淡豆豉。天南星。白蘇。各一錢。爲末。搗芭蕉自然汁。調敷臍四傍。小便下。卽愈。

凡口噤不開。用天南星爲末。加片少許。以姜汁和之。擦牙齦。立開。○又猪乳汁。與兒吞之。善開口噤。○又不乳。或喉中有痰。如豆。葛藤燒灰。和乳汁服。○不乳屬臍風者。必唇青。口撮。若

小兒急驚風

無此證或不乳或吐乳有屬胎寒腹痛者用木香木瓜乳香沒藥各少許爲細末以當歸蘇葉煎湯調喂如無上證必母之乳汁多而傷也宜少節之自愈

急驚者陽證也蓋小兒之真陰未足故肝邪易動木生火火生風風熱相合則血虛而筋急而爲眩掉反張由是本邪侮土則脾病而爲痰壅吐瀉木盛金衰則肺病而爲喘促短氣木火上炎則心病而爲煩熱驚叫木火傷陰則腎病而爲血燥乾渴汗閉搐搦等證此非外來之風可以散也惟以清熱豁痰爲急但當分微甚而治之

治急驚風

清熱平肝湯新治急驚一切實證

龍胆草

胆南星

用牛胆套九次者佳

海石

法半夏

鉤藤

鉤盡

鉤用此味後入過煎無力各一錢

白芥子

炒研

淮木通

各八分

水煎就用

姜蚕

五分

全蠍

去足微炒五枚

片麝

各二厘

共研末調藥服如火之

甚者加黃連黃柏大黃之屬如之微者加元參知母黃芩

梔子之屬痰之甚者倍胆南星加天竺黃牛黃之屬痰之微

者加前胡陳皮

去白

貝母花粉之屬此外加硃砂能入心鎮驚

雄黃能破結開滯琥珀青黛亦清利之佐助冰片麝香乃開

竅之要藥至於姜蚕佐痰藥善能開痰去肝脾之邪則肝平

四證加法

急驚兼外
感治法

治急驚單
方

而風自息也。全蠍色青入肝。善走厥陰。味鹹降痰。故能治風。
較之姜蚕。此其次矣。蟬脫不過取其輕脫之義。不足恃也。凡
驚風之實邪。以痰火爲重。而風則次之。不得徒用剪風之藥。
也。或驚風有兼外感者。必脉息浮緊。寒熱頭痛無汗等證。
如防風羌活。荆芥乾葛。紫蘇獨活。細辛之類。可以暫用。無外
邪者。皆所切忌。又不可過用片麝。恐陽虧陰盛。而成慢驚。彼
防風辛熱。誤用殺人。更宜慎用。如月內驚風。用丹砂末塗
五心。以色赤入心。安神除熱也。若客忤卒死。用蜜調服。如驚
忤無聲。血入心竅。猪心血調服。如發搐之甚。同南星全蠍調服。

治心熱急驚

治肝熱急驚

備揀古來治急驚諸方以便取用

導赤散 治心火上炎。舌黃尿赤。口渴身熱。急驚實證。

生地 木通 甘草 麥冬各二錢 淡竹葉十皮 水煎熱服

瀉青丸 治小兒肝胆火急驚發搐眼赤上視等證

羌活 防風 當歸 川芎 山梔仁 胆草 大黃酒浸

煨透 共研細末蜜丸每用竹葉煎湯少加沙糖化下。急

驚風者肝風甚而心火從之為實邪也實則瀉之宜用瀉青

丸以瀉肝之風導赤散以瀉心之火如大便秘用蜜導法蜂

蜜三兩入鉄器內以火熬乾捻成挺子寸半長從穀道挿入