

十神湯方 藁鼻麻陳草蘇白芷加麻黃

芍藥青附時行瘧感胃效堪言陳皮甘草

川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加薑鹽

煎治風寒雨感頭痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻

塞○芍麻升葛蘇芷香附辛香利氣發表散

寒加芍藥者歛陰氣于發汗之中加甘草者

和陽氣疎利之劑也吳經曰此方用升麻乾

葛能解陽明瘟疫時氣若太陽傷寒發熱用

之則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

神木散局用甘草蒼朮藁本葛芷羌

二兩炙草細辛藁本白芷川芎羌活各一兩每服四錢生薑蔥白煎

祛風濕太陰羌活藁本陽明白芷此方與九

醫方全書卷之五

休寧汪 昂初菴著輯 男汪 端其兩

弟汪 桓殿武纂閱 姪汪 惟龍子錫

瀉火之劑火者氣之不得其平者也五藏六府各

有一失其常度則衝射搏擊而為火矣故丹溪曰

氣有餘便是火也有本經自病者如忿怒生肝火

勞倦生脾火之類是也有五行相剋者如心火太

盛必剋肺金肝火太盛必剋脾土之類是也有藏

府相移者如肝移熱于胆則口苦心移熱于小腸

則淋瀝之類是也又有他經相移者有數經合病

者相火起于肝腎虛火由于勞損實火生于亢害

燥火本乎血虛濕火因于濕熱鬱火由于遏抑又

有無名之火無經絡可尋無脈證可辨致有暴病

暴死者諸病之中火病為多不可以不加察也○

有以瀉為瀉者大黃芒硝芩連梔枳之類是也有

以散為瀉者羌防柴葛升陽散火之類是也有以

滋為瀉者地黃天冬玄參知母之類壯水之主以

制陽光是也有以補為瀉者參耆甘草瀉也之聖

藥也

神木散局用甘草蒼朮藁本葛芷羌

二兩炙草細辛藁本白芷川芎羌活各一兩每服四錢生薑蔥白煎

祛風濕太陰羌活藁本陽明白芷此方與九

味羌活湯意同加藁本除黃

芩生地防風較羌活湯更穩



北京中醫藥大學圖書館藏

本草綱目

瞿麥 陳皮為君二錢蒼木厚朴各一錢炙
草薢 草薢蒲霍香各錢半治癰瘡濕瘡時

海藏神木 蒼防草太陽無汗代麻黃木

防風各二兩炙草一兩用代仲
景麻黃湯 治太陽傷寒無汗

蒼木陽有汗此湯 各白木湯用代桂枝
湯以治太陽傷風有

汗二木主治略同特
有止汗發汗之異

麻黃附子細辛湯 景發表溫經兩法彰麻
景發表溫經兩法彰麻

細辛各二兩附子一枚炮○麻黃發太陽之
汗附子溫少陰之經細辛為腎經之表藥聯

屬其
若菲表裏兼治少陰反熱易能康 陰少

症脈沉屬裏當無熱今反
發熱為太陽表症未除

人參敗毒 散活人毒
即熱濕也

獨芎藭少許薑三片 時行感冒有功效
參實則傷其子

藥是也

黃連解毒湯 相傳此方為太倉公火劑而崔
氏治劉護軍又云其自製者

火熱表裏俱盛狂躁煩心口燥咽乾大熱乾嘔錯語不

眠吐血衄血熱甚發狂 為毒即火邪也邪入于陽則狂心
口燥咽乾火盛津枯也乾嘔熱毒上逆也錯語熱甚也

神也不眠陰未得復也傷寒吐衄血者當汗不汗蘊熱
逼血上行也發斑熱毒入胃也○崔尚書曰胃有燥葉

令人錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜承氣
湯通而錯語者

宜黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪火妄行故用黃

芩瀉肺火于上焦黃連瀉脾火于中焦 王海藏曰黃連
瀉心實瀉脾也

獨芎藭少許薑三片 時行感冒有功效
參實則傷其子

上海藏書館藏
上海圖書館藏
上海中醫藥大學圖書館藏

伏苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服一兩加薄荷生薑煎○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣甘桔參茯苓清肺強胃輔正匡邪也喻嘉言曰暑濕熱三氣胸中推此方為第一俗醫臧却人參會與
秦參為散毒散加入消風
他方有別耶
散見
風門
治亦同
合消風散名
消風敗毒散

再續散節
用參者其桂附羌葛秦細
辛加黃連薑黃陽盧無汗法當請人參黃耆
白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨薑
大棗煎○以參者甘薑桂附大補其陽助羌
防芍細散寒發表加芍藥者于陽中飲陰散
中有收也陶節菴曰發熱頭痛惡寒無汗服
汗劑汗不出者為陽虛不能作汗名無陽症
庸醫不識不論時令遂以麻黃重劑劫取其
汗誤人死者多矣又曰人第知參者能止汗
而不知其能發汗以在表藥隊中則助表藥

本草要表

從膀胱出蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大苦大寒
之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也
然非實熱不可輕投劉河間曰傷寒表熱極其身痛煩
可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能
退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚本氣損
虛而脈不能實擬更下之恐脫而立死不下亦熱極而
死或濕熱內蘊小便赤澀大便溏泄頻併少而急痛者
必欲作痢也並
宜黃連解毒湯

本方去梔子名栝皮湯治三焦實熱用粥丸名三補丸

治三焦有火噤燥喉乾二便閉結及濕痰夜熱經曰壯
少火生氣故少火宜升壯火宜降今以黃芩瀉上黃連
瀉中黃栝瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養
三焦皆
受益矣

本方去黃連加甘草名梔子栝皮湯仲景治傷寒
發黃身熱發黃胃有瘀熱宜下之發熱為熱未嘗實蓋
寒濕之症難于得熱熱則勢外出而不內入

發黃身熱發黃胃有瘀熱宜下之發熱為熱未嘗實蓋
寒濕之症難于得熱熱則勢外出而不內入
益友

而解

麻黃人參芍藥湯

東垣桂枝五味麥冬露

有量補虛人外感服之康

炙各一錢人參麥冬各三分桂枝五分五味

五粒○東垣治一人內蘊虛熱外感大寒而

吐血法仲景麻黃湯加補劑製此方一服而

愈原解曰麻黃散外寒桂枝補表虛黃耆實

表益衛人參益氣固表麥冬五味保肺氣

甘草補脾芍藥安太陰當歸和血養血

神散衛生用白芷其薑散諸相

白芷一兩甘草五錢淡豉五十一切風寒皆

粒薑三片蔥白三寸煎服取汁一服後單煎

矣故不必發汗利小便用梔子清肌表黃栢渴勝肌以

和解之按傷寒發黃有在太陽勝肌者與陽明瘧熱在

胃者不同故仲景亦有不可下當于寒濕中求之

若瘧熱在裏亦有麻黃連翹赤小豆湯發汗利水之

劑者方見本方去黃栢梔子加酒浸大黃名三黃湯心

傷寒論傷金治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸晒

九次蜜丸名三黃丸治三焦積熱頭項腫痛目赤口瘡

心膈煩躁大便秘結小便赤澀及消渴羸瘦由于火炎

水乾或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹

溪曰少陰不足亢陽無補致陰血妄行故用大黃瀉其

亢甚之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃

芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也

肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

中國醫藥大學圖書館版

攻憂之劑 七首附方四

大承氣湯 仲景用芒硝枳實大黃厚朴饒大

四兩酒洗芒硝三合救陰瀉熱功偏擅急下

厚朴八兩枳實五枚大黃治大實芒硝治大燥大堅

陽明有數條 二味治有形血藥厚朴治大滿

枳實治痞二味治無形氣藥熱毒傳入陽明

胃府痞滿燥實堅全見雜症三焦實熱並須

以此下之○胃為水穀之海土為萬物之母

四旁有病皆能傳入胃已入胃府則不復傳

他經矣陶節菴曰傷寒邪熱傳裏須看熱氣

淺深用藥大承氣最緊小承氣次之調胃又

次之大柴胡又次之益

瀉之劑若虛寒內傷吐衄前候服此則殺人矣楊仁齋

曰血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虛致寒

營氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是已法當溫中

使血自歸經宜理中湯加木香七氣湯加川芎或甘草

乾薑湯 本方加石膏淡豉麻黃名三黃石膏湯 別見表

甚効 本方水丸名三黃金花丸治中外諸熱寢汗咬牙夢語

驚悸吐衄淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃名梔子金花丸

去梔子加大黃名大金花丸治略同

附子瀉心湯 仲景治傷寒心下痞而復惡寒汗出者 傷

心下滿鞭而痛者為結胸為實鞭滿而不痛者為痞為

虛經曰心下痞按之濡關脈浮者大黃黃連瀉心湯心

瀉心湯

下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸痞皆熱故

攻之多寒劑此加附子恐三黃重損其陽非補虛也或

下後後汗或下後陽虛故惡寒汗出○諸瀉心湯皆治

傷寒痞滿滿在心胸不在胃也若雜病痞滿有寒熱虛

實之不同保命集云脾不能行氣于四臟結而不散則

為痞傷寒之痞從外之內故宜苦瀉雜病之痞從內之

益友

三

益友

益友

實可消羊用承氣通二便加羌活治風中風外故宜

輕投

調胃承氣湯仲景硝黃草大黃酒浸芒硝各一兩甘草炙五錢

甘緩微和將胃保用甘草甘以緩之微和胃氣勿令大泄下

朴實傷上焦不用厚朴枳實恐傷上焦氣壅之氣也

服之好

本香檳榔九張青陳皮枳殼相連連瀉隨

大黃黑兼香附芒硝水丸最之一切實

積能推蕩瀉痢食瘧用咸宜

炒黃柏酒炒黃連吳茱萸湯炒三稜我述並

醋者各五錢大黃酒浸一兩香附連生各二

大黃一兩黃連一兩黃芩一兩附子一枚炮去皮

此足太陽手少陰藥也吳鶴皋曰心下痞故用三黃以

瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽非三黃不能去痞熱

無附子恐三黃益損其陽寒熱並用斯為有制之兵矣

喻嘉言曰此邪熱既盛真陽復虛之症故于三黃湯內

加附子汁共成傾痞之功金匱有大黃附子湯亦同此

意大黃細辛各二兩附子一枚炮治脇下偏痛發熱脉

弦緊此寒也以溫藥下之陽中有陰當以溫藥下其寒

後人罕識其指○有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類

也有陰陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之



無痞滿後重之患矣連柏燥濕清熱稜莪行痞傷益下多亡陰陰者脾胃水穀之陰也胸中之氣因氣破血稍黃去血中伏熱並為推堅峻昂極虛下陷于心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿食之若全用氣藥導之則痞益甚甚而復下之氣愈不降不淨清陽終不得升亦通因通用之意也

枳實導滯丸
東垣
首大黃芩連麩不使苦
須兼血藥

澤瀉蒸餅糊丸
服濕熱積滯力能攘大黃一兩
本方去附子名三黃瀉心湯
見前
再去黃芩名大黃瀉心湯

瀉心湯
仲景
治傷寒心下痞按之濡
音關
關土脉浮
沉為實熱浮為虛

虛實服大黃根實瀉熱去積
芩連佐之以清熱者瀉佐之以利濕神瀉佐之以消食又恐聚故無取半夏生薑也活人云結胸與痞關脈須皆沉

苦寒力峻故加若還後重兼滯氣不香道滯
白木麻土固中

九加檳榔

濕脾金
參附與乾薑甘草歸硝大黃
傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生腹脹是已病發于陽

寒熱並行治寒積腹絞痛非常
人參附而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脫故大陷

芒硝各一兩大黃五兩當歸乾薑各三兩煎結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉服日三本方除當歸芒硝亦名溫脾湯治久心湯按發陽發陰諸解不同終成疑案李氏則以寒傷

本方全書火發五附子瀉心湯
半夏瀉心湯
益友



痢赤白脾胃冷食不消○硝黃以蕩其積蠱
附以祛其寒參茸當歸以保其血氣按古人
方中多有硝黃柏連與薑棗桂附寒熱並用
者亦有參朮硝黃補瀉並用者亦有大黃麻
黃汗下兼行者今人罕識其指故
錄此方以見治瘵之妙不一端也

竅導法通大便

仲景用竅熬如飴掄作
挺子搯鼻角末乘熱納

穀道中或將猪膽汁灌入項當大便
或搽鹽豉汁灌入項當大便

名猪膽汁導法仲景
不欲寒傷胃府陽

明無熱勿攻胃府無熱而便秘者為汁多
車攻津液不足不宜用蒸氣攻

此仲景心法後人罕知
故錄二方于坡下之末

涌吐之劑二首附方六○汗吐下和乃治瘵
之四法經曰在上者涌之其高者

因而越之故古人治病用吐法者最多朱丹
溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法
古方多有之惟以吐發汗者世罕知之今人
醫療惟用汗下和而吐法絕置不用可見時

為陰病熱陷為陽病然仲景所用皆寒藥未嘗有
所分也周揚俊則謂總屬下早致然似為近理

半夏瀉心湯

仲景治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞

身寒而嘔飲食不下非柴胡症

經曰傷寒五六日嘔而

藥下之柴胡症仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為
逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者
此為結胸也大陷胸湯主之若滿而不痛者此為痞
胡不中與也宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之
症非傳經
熱邪也

半夏

半斤黃連一斤黃芩甘草炙人參乾薑三兩大棗

十二枚

此手少陰足太陰藥也成氏曰否而不泰為痞苦先入

心瀉心者必以苦故以黃連為君黃芩為臣以降陽而
升陰也辛走氣散痞者必以辛故以半夏乾薑為佐以

師之缺略特補涌吐一門方藥雖簡而法不可廢也若丹溪用四物四君引吐又治小便不通亦用吐法是又

在用者之圖神矣

瓜蒂散中赤小豆

仲景甜瓜蒂炒黃赤豆共為末熟水或蘆水調

量虛或入藜蘆散

張子種去赤豆加藜蘆散防風一方去赤豆

加鬱金韭汁俱名三聖散

此吐實熱風痰

吐實熱藜蘆者藜蘆散

一味得服瓜蒂者

參蘆代之

仲景

或加竹瀝

板政四合治傷

寒後劇痰

丹溪治許白雲用瓜

吐不逆後以漿水和

烏附失服始得大吐

賣帶功能

燒鹽熱湯調服以指探吐治霍亂宿食冷痢等症干金曰凡病

宜吐大

勝用藥

分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必和其中故以人

參甘草大棗為使以補脾而和中

而大汗以解矣

舊註云此方藥位益木理中人參黃芪

細不可下者渴心渴主之脈有力者黃連渴心渴脈無

力者半夏渴心渴喻嘉言曰諸渴心渴原以滌飲此症

因嘔故推半夏為君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏

拂鬱于心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出

而熱非實穢又不能下行唯用苦寒從其部而渴之仍

慮下焦之陰邪上入兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞

而痞自散所以寒熱互用若陰痞不開陽鬱即鬱而未

成熱祇是土下陰陽部分拒格而成渴心之法概不可

溫補猶恐不足前法一無所用矣

本方除人參再加甘草

一兩合前四兩

名甘草渴心渴

仲景治傷

景怡傷

稀涎散
犀角白礬
犀角四挺去皮弦炙白礬一兩為末

每服五分。白礬酸苦涌泄能軟頑痰犀角辛鹹通竅專治風痰此奪門之兵也風初中時宜用之

或蒸蘆微吐
風中痰升人眩仆
當客氣上逆故使鞭也

先服此通其關
令微吐稀涎
通關散
用細辛

皂角
吹鼻得嚏
保生還
卒中者用此吹鼻有嚏者可治無嚏者為肺氣已絕

和解之劑
九首附方五

小柴胡湯
仲景
和解供生夏人參甘草從夏

用黃芩加薑棗少陽病此為宗
柴胡八兩半夏半升

人參甘草黃芩生薑各三兩大棗十二枚治一切往來寒熱胸滿脇痛心煩喜嘔口苦耳聾咳渴悸利半表半裏之症屬少陽經者但見一症即是不必悉具。臆府清淨無出無

是完穀不化
脇下有水
氣腹中雷鳴
下利
容氣上逆伏飲搏腸故痞

寒中風醫反下之下利穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而

滿乾嘔心煩醫復下之其痞益甚此非結熱也
以胃虛

為下後裏虛胃弱內損此氣故加甘草以和中益胃復其虛也

大要痞滿下利者為虛便閉者為實按甘草甘平能除滿以脾健故中滿症忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健

運則滿除也觀仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按此乃傷寒之下利腸鳴也雜症腸鳴亦多屬脾胃虛經

云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之苦鳴宜參木補劑加甘草芩連枳實乾薑等丹溪又曰腹中水

鳴乃火激動其火也宜陳二湯加芩連梔子李延曰自利舊分陰症陽症又分協熱協寒而治法相同陽症下

利亦必裏虛而表熱乘之雖太陽初症下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至于陰即協寒其症尤顯所以

云陽症下利誤溫則發黃出斑而此等支離處尤當詳辨
本方加生薑四兩名生

薑瀉心湯
仲景
治汗解後胃中不和心下痞鞭乾噫食

是完穀不化
脇下有水
氣腹中雷鳴
下利
容氣上逆伏飲搏腸故痞

入經在半表半裏法宜和解柴胡升陽達表
黃今退熱和陰半夏祛痰散逆參草輔正補
中使邪不得復傳入裏也

四逆散仲景**枳實芍藥散**仲景**枳實甘草湯**仲景

芍藥炒枳實麩此是陽和成厥逆陽邪入裏熱不殺

妙甘草炙等分是陽和成厥逆陽邪入裏熱不殺

不飲陰泄熱平刺扶草和逆柴胡散邪用平

黃連湯仲景**內用乾薑半夏人參甘草藏真**

用桂枝兼大棗寒熱平調嘔痛忘黃連炒乾

桂枝各三兩入參二兩半夏半升大棗十二

枚治胸中有熱而欲嘔胃中有寒而作痛或

丹田有熱胸中有寒者仲景亦用此湯○按

此湯與小柴胡湯同意以桂枝易柴胡以黃

連易黃芩以乾薑易生薑餘藥同其和解之意
但小柴胡湯屬少陽藥此湯屬太陽陽明藥也
中氣不和故乾嘔胃虛火盛邪熱不殺故完穀不
化腸下有水氣土弱不能制水故腹中雷鳴下利謂之
協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散邪利飲
益胃復陽劉河間曰渴而水穀變色者為熱不殺色而
澄徹清冷者為寒若肛門燥瀉小便黃赤水穀不化
猶為熱也此由火性急速食下即出無容剋化則清和
穀也
本方除黃芩大棗加枳實厚朴莽白朮茯苓
蒸餅糊丸名枳實消痞丸東垣別見消導門
白虎湯仲景**治傷寒脉浮滑表有熱裏有寒**浮為在表滑為在裏裏寒指傷寒即病熱之本因也**及三陽合病脉浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則頭**
上生汗手足逆冷自汗出者腹滿身重口不仁譫語陽明症也面垢少陽症也遺尿熱甚故識語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必額汗出而手足逆冷若自汗出者三陽通治陽明病脉洪大
陽熱甚也與此湯以解內外之熱
通治陽明病脉洪大
益友

葛湯

仲景

用甘草并二陽各利棗如煮

而長不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎目痛鼻乾不

陽少陽合病下利黃芩三兩芍藥甘草各二

得臥心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸症

甘芍大棗此方遂為治痢祖後人加味或更

脈洪大熱在表而後邪惡正故惡寒熱入裏而燥邪甚

利瀉泄也痢滯下也仲景本治傷寒下利

無畏故不惡寒反惡熱中風有汗傷寒無汗傳太陽明

名機要用此治痢更名黃芩芍藥湯潔古治

主肌肉故肌熱脈交頤中故目痛脈俠鼻金燥故鼻乾

痢加木香檳榔大黃黃再加生薑半夏夏

胃不和故臥不安人之陽氣晝日行陽二十五度平日

連當歸官桂名芍藥湯再加生薑半夏夏

屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒症中日晡潮熱

芍加生薑半夏夏湯仲景前症兼嘔此能平胃用芍藥與

為胃實無虛症胃熱失下則發斑

甘草等分名芍藥散逆止痛能和平

石膏一斤知母六兩甘草二兩粳米六合先煮石膏數十沸

白芍不惟治血虛兼能行氣腹痛者營氣不難

出再投藥米熟湯成溫服

和逆于內裏以白芍行營氣以甘草和逆氣

此足陽明手太陰藥也熱淫于內以苦發之故以知母

逍遙散局用當歸芍藥白芍加薑

苦寒為君熱則傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石

當歸酒拌白芍酒炒白朮土炒茯苓

滑石味皆甘寒凡藥津液內燥故以甘草粳米甘平益

各一錢甘草炙五分如煙薑薄荷煎

帶甘者皆瀉中有補

蒸功最奇

肝虛則血病歸功養血平肝木盛則土衰木草和中補土柴胡升陽

氣緩之為使不致傷胃也又煩出于肺躁出于腎

散熱茯苓利濕寧心生薑煖胃祛痰薄荷消風理血醫貫日方中案胡薄荷二味最妙益

清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉

木喜風搖寒即權萎滋則發生木舞則火鬱火鬱則土鬱土鬱則金鬱金鬱則水鬱五行

脾之火或濕其子或瀉其母心不常治陽明氣分熱

相因自然之理也余以一方法治調經入味丹

木鬱而諸鬱皆解逍遙散是也

也石膏甘草不但清裏兼能發表然必實熱方可用或

槐香正氣 散局 大腹蘇甘桔陳茶朴俱

虎湯症候投之不可救也按白虎症脈洪大有力類白

夏麴白芷加薑棗感傷外感 內傷風痺龍馬香

虎症脈大而虛以此為辨又按陰盛格陽陽盛格陰二

大腹皮紫蘇 訣令白芷各三兩陳皮白木土

症至為難辨蓋陰盛極而格陽于外外熱而內寒陽盛

炒厚朴薑沫炒半夏麴桔梗各二兩甘草一

極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必

兩每服五錢加薑棗煎○霍香理氣和中辟

陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外

六和湯局

藿朴杏砂星夏木瓜赤茯苓

中燥潤及舌胎淺深蓋舌為心苗應南方火邪在表則

去濕以輔正氣正氣通暢則邪逆自除矣

芒刺口有津液也又當用溫補之劑尤宜細辨李東垣

日邪在陽明肺受火尅故用辛寒以清肺所以有白虎

之名白虎西方金神也吳鶴皋曰如秋金之令行則夏

暑火之令行則夏

暑火之令行則夏

木參扁同甘草薑煎之六氣平

藿香厚朴杏仁

砂仁半夏木瓜赤茯苓白朮人參扁豆甘草

火之炎退成氏曰立秋後不可服為大寒之劑易老曰有是病則投是藥苟拘于時何以措手若以白虎為太

加薑蜜煎能禦風寒暑濕燥火六氣故曰六

寒承氣又何以行于冬合乎太陽發熱無汗而渴忌白

和○藿朴杏砂理氣化食參朮陳夏補正匡

虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

脾豆瓜祛暑赤茯苓行水大抵以理氣強肝為

主脾胃既強則或益香薑或蘇葉傷寒傷暑

諸邪不能表矣

用須明傷暑加香薷

清脾飲嚴用

用青朴柴苓夏甘苓白朮倍

更加草薑煎服熱多陽瘧此方佳

青皮厚朴醋炒

柴胡黃芩半夏薑製甘草炙茯苓白朮土炒

口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為

草菓煨加薑煎瘧不止加酒炒常山一錢烏

表未全罷尚屬太陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎

梅二枚大渴加麥冬知母○瘧疾一名脾寒

湯解表邪清裏熱加人參補氣生津○太陽病在表故

蓋因脾胃受傷者居多此方乃加減小柴胡

反惡熱間有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云

湯從溫脾諸方而一變也青柴平肝破滯木

夏平胃祛痰苓苔清熱利濕本草補脾諸中

加人參湯主之又云傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可

痛濕勞

劉草

陳皮芍防風白朮煎丸酌

或云表熱裏寒皆可服之一種發熱無汗其

亦治太陽

白朮土炒三兩白芍酒炒四兩陳皮炒補土

中喝

音謁

暑也身熱汗出惡寒足冷脈微而渴

亦治太陽

藥理肝脾

陳皮理氣補脾

若作食傷

背吳鶴皋曰傷食腹痛得瀉便減今

表裏之劑

入首附方五

大柴胡湯

仲景

用大黃枳實芒夏烏將煎

加薑棗表裏妙法內攻外攘

柴胡八兩大黃二兩

枳實四枚半夏半升黃芩芍藥各三兩生薑

五兩大棗十二枚治陽邪入裏表症未除裏

症又急者○柴胡解表大黃枳實攻裏黃芩

清熱芍藥斂陰半夏和胃止嘔薑棗調和營

衛按本方次方治少陽陽明

柴胡加芒硝湯

義亦爾

小柴胡湯加芒硝六兩仲景

仍有桂枝大黃湯

本草黃芩

表裏

以白虎湯治其氣分

亦治火傷肺胃傳為膈消

喻嘉言曰肺消以地黃丸治其血分腎消

濕溫脉沉細者

沉細屬濕先受暑後受濕暑濕相搏名

而譫語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人多得

之宜白虎

本方加桂枝名桂枝白虎湯

金匱治溫瘧但熱

無寒骨節疼痛時嘔本方加柴胡黃芩半夏名柴胡石

膏湯治暑嗽喘渴本方除粳米加人參名化斑湯治胃

熱發斑脉虛者

竹葉石膏湯

仲景

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

醫方金書

火卷五

白虎湯 竹葉石膏湯

益友

仲景桂枝湯內加大黃一兩芍藥三兩治太陽誤下轉屬太陰太實痛者

防風通聖散
大黃硝荊芥麻梔芍翹

甘桔膏 歸滑石薄荷芥木力偏饒裹麥

攻陽熱盛外科湯 毒總能消
防大黃酒蒸芒硝荊芥麻黃

黑梔白芍炒連翹川芎當歸薄荷白朮各五錢桔梗黃芩石膏各一兩甘草一兩滑石三兩加薑蔥煎

○防風麻黃薄荷發汗而散熱搜風梔子滑石硝黃利便而降火行水芍桔

石膏清肺瀉胃川芎歸芍養血補肝連翹散氣聚血凝甘朮能補中燥濕故能汗不傷表

下不傷裏也

五積散
治五般積寒積食積氣積痰積

芩歸枳桔薑甘枳朴陳皮半夏加薑

當歸川芎白芍茯苓桔梗各八分蒼朮白芷厚朴陳皮各六分枳殼七分麻黃半夏

傷寒解後餘熱未盡津液不足故虛羸少氣虛熱上逆故欲吐
亦治傷暑發渴脉虛
竹葉二石膏一人參三甘草炙二
把石膏片人參兩甘草兩
麥冬一升半夏升粳米

加薑煎

此手太陰足陽明藥也竹葉石膏之辛寒以散餘熱

人參甘草麥冬粳米之甘平以益肺養胃補

虛生津半夏之辛溫以豁痰止嘔故去熱而不損其真

導逆而能益其氣也

又方竹葉石膏木通薄荷桔梗甘草亦名竹葉石膏湯

治胃實火盛而作渴
李士材曰陽明外實則用柴葛升以解肌陽明內實則用承氣以攻

下此云胃實非有停滯但陽饑勝耳火旺則金困故以竹葉瀉火以桔梗救金薄荷升火于上木通泄火于下

甘草石膏直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣

各四分肉桂乾薑甘草各三分重表者用桂枝○桂麻解表散寒甘芍和裏止痛蒼朴平胃陳夏行痰芎歸養血茯苓利水薑芷祛寒濕枳桔利膈腸一方統治多病唯善用者變而通之
除桂枳陳餘略少三味生用餘藥微炒
料尤增散功溫中解表祛寒濕散痞調經
用各充陶節菴曰凡陰症傷寒脈浮沉無方均當服之亦可加附子

三黃石膏湯 蒼柏連梔子麻黃豆豉金盞
東細茶煎服 寒因熱用表裏三焦熱盛 石膏
 黃芩黃柏黃連各七錢梔子三十箇麻黃淡豉各二合每服一兩薑三片棗二枚茶一撮煎熱服治表裏三焦大熱譫狂斑痧身目俱黃○黃芩湯上焦黃連湯中焦黃柏湯下焦梔子通瀉三焦之火以清裏麻黃散散寒發汗而解表石膏體重能解肺胃之火氣輕亦能解肌也

升陽散火湯 東垣
治肌熱表熱四肢發熱骨節中熱
 熱如火燎捫之烙手此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土並宜服此
 脾主四肢四肢熱即行若鬱而不達則反以銷燦真陰而肌膚筋骨皆為之熱也若飲食填塞至陰則清陽不得上行故不能傳化也經曰火鬱發之

柴胡 八錢 **防風** 二錢 **葛根** 五錢 **升麻** 羌活 獨活 人參
白芍 五錢 **炙甘草** 三錢 **生甘草** 二錢
 此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌防以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使三焦暢遂而火邪皆散矣人參甘草健脾土而瀉熱芍藥瀉脾

六五青史表裏
 升陽散火湯
 一益友