

無醫  
自治  
百病治療丹方  
海左書局印行



南京中医药大学图书馆版权所有

無醫百病治療丹方卷四

第九編 口牙科

▲治口氣臭

治法 用香白芷七錢 研為細末 食後井水服一錢 能去氣臭

治法 用白芷七錢 甘草一錢 研為末 蘭水調服

(三)

治法 用枯礬入麝香少許 擦在牙上 其臭自止

(四)

治法 每夜臨睡之時 口內含荔枝肉一二枚 次日早上吐出 一星期  
內可愈 如茹香煎湯漱口 或以明礬加麝香少許 擦牙極效

(五)

治法 用丁香二錢 川芎二錢 白芷五分 炙草一錢 共為細末 蜜

丸如彈子大 含化

(六)

治法 用白花五錢 樟腦三錢 麝香三分 共研末 煉蜜為丸 每日早晚服五丸 温酒送下

(七)

治法 用兒茶四兩 桂花硼砂南薄荷葉各五錢 為末 甘草熬膏丸噙於口中

▲治口氣惡

治法 用正旦含井華水 吐棄廁下 數度後 必愈

▲治口瘻

治法 用檳榔灰一點 即愈

▲治口中蒜臭

治法 用好醋一口 便無臭味 取陰乾菊花食之

▲治鬼頭風吹歪口

治法 用白蔻硃砂草麻仁(去油)生黃鱔血 四味和勻搗爛 用布開糊

貼上 歪左則貼右邊 歪右則貼左邊 稍煖揭開 一息再貼 連

貼數日 即可平復

▲治口唇燥裂

治法 用橄欖泡湯服 核中仁研爛敷燥處 立效

▲治唇乾裂痛

治法 用桃仁搗爛 和豬肉敷之 即愈

▲治冬月唇乾血出

治法 用生豬油擦於患處 必愈

▲治唇繫作痛

治法 用五倍子詞子等分 研為末 敷於患處

▲治缺嘴唇

治法 用麻雀屎七粒 胡椒七粒 共為末 以燒酒調為麻藥 搽唇上  
然後將唇割開 以龍骨白朮為丸 塞在患處

▲治口中腫痛

治法 用生茄子皮 細灰研粉 與糖蜜拌和 滂於腫處 三四日可愈  
如牙齒等 亦可用 無生茄子 用乾茄蒂亦可

▲治唇痛

**治法** 用石菖蒲及芒硝粉 調以井華水塗之 須塗數次

▲治口中火瘡

**治法** 用冰片研末 用紙管吹之 使涎流出 約五次 可愈

▲治邪風歪嘴

**治法** 凢大風（俗名怪風）將嘴吹歪 用活鱔魚兩條 盛水盆內 以一條一手捉頭 一手捉尾 如嘴向那邊歪 即由歪向正拖 姑魚拖久 放入冷水盆中 再換再拖 以拖正者為度 用過之鱔魚入河中

▲治人中腫大

**治法** 用生蒲黃二錢 川連一錢 氷片一分 共為末 塗患處

▲治小舌猝腫

**治法** 用枯明礬稍加以鹽 研末塗之

▲治舌血出

**治法** 用炒蒲黃與青黛研末 以清水送下 或塗舌上

▲治縮舌

**(治法)** 用角刺針破舌尖 令其出去惡血 然後用蠟油塗點舌上 頓愈

但須先以手扯住 勿令縮入 如無角刺 用銀牙籤挑之 亦可

▲治牙痛

**(治法)** 用黃連浸高粱酒 取出含之

或用南瓜蒂浸食鹽內 取出風乾 取一小塊 嵌入齒間

(二)

**(治法)** 宜臨卧時 以新棉花浸人乳 置於牙之中間 輕輕啣住 痛可立減 若乳汁畧乾 再蘸仍置如前 明晨取出 則痛已愈

(三)

**(治法)** 用熟石膏研末 與白胡椒調和之 擦於痛處

(四)

**(治法)** 用明礬食鹽各等分 研成粉末 取棉花少許 潤以清水 蘸粉嵌於患處 靈驗無比 如覺跳痛 可用鴉片與丁香油(Cloves)

和合 滴於棉花上 塞痛處 痛即漸止 或以大蒜片貼耳門前  
後 及太陽穴 均效



(五)

治法 用黑葉荔枝薤 在泥內掘出 去皮取心 木鋸片 煎水 數次即止 向東方取者為佳

(六)

藥料 用白牙硝一錢 元明粉五分 雄黃(飛淨)五分 梅片一分  
治法 將各藥共為末 以蠟封固 如遇牙痛 將藥塗患處

(七)

藥料 用寒水石五錢 牙硝五錢 硼砂三錢 珠砂二錢 正冰片三分  
治法 將各藥研為末 塗患處

(八)

藥料 用黃柏一錢 黃連一錢 薄荷一錢 石羔一錢 黃芩一錢 青黛一錢 水片少許

治法 將各藥為細末 擦於牙上 極效

治法 用牛膝(去心鹽水炒)五錢 猪腰一對 (須原對為宜)熬粥食之

其效無比

(十)

〔治法〕用生榕梅樹蕊 煎水含之 即可止

▲治常時牙痛

〔治法〕用蒲公英（洗淨炒乾）一斤 胡鹽（為末）一兩 香附（研末）五分  
將二味藥末 和蒲公拌勻 醃一夜 分為二十團 用皮紙三層  
裹好 外用小繩紮定 或用蚯蚓糞和固 陰乾 以文武火煅紅為  
度 取出待冷 去泥為末 早晚擦牙 漱口吐嚥 如久行必效  
并可烏鬚

▲治一切牙痛

〔藥料〕用豬腳甲（燒灰存性）三個 蝎牛（俗名圓螺蟲連壳燒灰存性）三  
個 牙硝一錢 水片一分 兔角生用（五錢）

〔治法〕將各藥為末 擦在牙間 極效

(二)

〔治法〕用端午午時 採鷄腸草晒乾 研末擦之



(三)

藥料 用生地二錢 牛膝二錢 生石膏二錢 熟石膏二錢 母皮一錢

防風一錢 荆芥一錢 薄荷一錢 麻黃一錢五分 甘草一錢

治法 將各藥用淨水煎 空心服

附註 上門牙屬心 加麥冬川連 下正門牙屬腎 加知母黃柏

牙屬肝 加姜活一錢 下左牙屬胆 加胡柴梔子 上右牙屬太陽

加大黃枳殼 下右牙屬肺 加黃芩一錢 上兩邊牙屬脾 加白芍

虎桔梗 下兩邊牙屬胃 加白芷川烏 以上所加之藥 每味各重

一錢

▲治風牙痛

治法 用蒺藜根煅灰 擦牙 立刻止痛

▲治火牙痛

藥料 用熟地五錢 生石羔二錢五分 熟石羔二錢五分 圓肉五錢

服法 將各藥以淨水煎服 極效

▲治蟲牙痛



**治法** 用天仙子燒烟 以竹筒抵住所患之牙根 使烟薰之 即可止

(二)

**治法** 周結列阿曹篤(西藥房購) Creosote 一盞斯(即一兩) 用棉花作成一丸形 浸此藥水塞入牙孔上面 再用棉圓蓋填格外謹慎

(三)

**治法** 剪取桃枝 以棉布條裹其一端 薰菜油於燈上薰熱 置痛處灸其一端 至蟲斃痛止為度

▲治齲牙痛

**治法** 用烏賊骨研粉入醋調之 如左牙痛 則塗於左耳 右牙痛 則塗於右耳

▲治蟲牙痛

**治法** 用清水半面盆 內覆高腳碗一隻 另用整片之瓦 入火中煨極

燙 乃仰置於碗底之上 即撒薑子一撮於瓦上 立起臭烟 速以預製成之硬紙漏斗 如喇叭形者 斗徑可三寸尾長一尺餘可用

外國書面紙為之）罩其上 使烟氣從斗入 自尾端出 激射於牙縫間（宜閉目屏氣）則牙蟲紛紛即墮入盆中 如法施行 可用瓦替換 凡三四次 即可永無蛀痛之患

### ▲治牙痛要法

**治法** 牙痛係腎病之一種 患時寢食俱廢 坐立不安 其困苦莫能堪也 欲令免除此病 永久不發 無需醫藥 祇須於平時小便時 繫繫閉其牙關 切勿張口談笑 雖有同室人操鬪在旁 亦祇得暫時抱個人主之義 置之不問也 其他如應答人之呼聲者 更無論矣

**附註** 蓋尿洩之時 牙動齒振 腎經受病 而易致牙痛 如能堅持此法 即無有患此者 再人於小便時 其頭部往往作痙慄狀 俗名尿搖頭 此亦腎病之種也 能以此法行之 亦可當場見效

### ▲補蛀牙

**補法** 最簡便之法 莫若用橡樹膠 以滾水泡軟 塞於蛀孔 然後用冷水漱口 使其堅實 將來永無再蛀之患

▲止牙痛

治法 用黃紙一張 紙上書咒 折為七重 以鐵釘釘蟲字之頭於馬足  
再念咒語七遍 咒曰 蟲是江南蟲 却來喰吾牙 鈎在椽頭上 永世不還家

▲治牙痛神方

治法 用煅石羔七分 生地二錢 荆芥一錢 防風一錢 丹皮一錢  
生甘草七分 青皮六分 並加味同煎服

附註 如上門牙痛 係心火 加製半夏八分 麥冬一錢 下門牙痛  
係腎火 加知母一錢 炒黃柏一錢 兩邊上牙痛 係胃火 加白  
芷八分 川芎一錢二分 兩邊下牙痛 係脾火 加白朮八分 白  
芍一錢二分 左邊上牙痛 係胆火 加羌活一錢 龍胆草八分  
左邊下牙痛 係肝火 加柴胡一錢 黑山梔一錢 右邊上牙痛  
係腸火 加炒枳殼一錢 製大黃一錢 右邊下牙痛 係肺火 加  
桔梗一錢 炒黃芩一錢 輕者一服 重者二服 即可全愈

避忌 孕婦忌丹皮川芎大黃三味



▲治牙痛及喉痛

藥料 用大南星十二個 半夏二兩 白礬二兩 甘草一兩五分 桔梗  
一兩五錢 陳皮五錢 朴硝二兩 生薑四兩 青梅子一百枚

治法 先將朴硝并鹽研末 醃梅兩日 俟梅汁出後 將前之藥末摻勻  
撈梅晒乾 以磁罐收貯 遇有鵝喉 及牙痛喉痛 取梅含之立消

▲治牙流血不止

治法 用蚕繭連肉存性 點流血處 或用胎髮團煨 焦存性敷之

▲治牙疳

藥料 用人中白三分 枯硼三分 寒水石(煅)五分 青黛(飛淨)五分  
生石羔五分 文蛤五分 正銅綠三分 冰片二分 孩兒茶五分  
治法 各藥共為末 涂於牙縫 痛立止 或銀牙籤挑破毒處 以藤黃  
末塗之 立見其效

▲治牙口疳

藥料 用川黃連四分 田三七一分 甘草一分 冰片三釐 孩兒茶一

分 生大黃一分 硃砂二釐 青黛七釐 真蒲黃(炒)七釐 硼砂

(炒)七釐

**治法** 將各藥共為末 先以白榴葉 垂絲柳絮 扁柏同煎水含

藥末調塗 極效

●第十編 瘡毒科

▲治纏指瘡

**藥料** 用白芷 防風 黃柏 赤芍 大黃 銀花 没藥 乳香 蛤

角刺 生川烏 白礬 生南星 各三錢 花粉六錢 水蟹子十

五個

**治法** 將各藥用生葱四兩 清水煎 乘熱薰於患處 然後再加燒酒一

碗 冲勻 溫浸 立刻可消

▲治蛇頭纏指瘡

**治法** 用鷄蛋 挑穿一孔 入梔榔灰少許 套指入內 俟鷄卵熟時

再換一二次 即愈



清华大学图书馆藏

医药大学图书馆版所有

**治法** 用斑蝥七隻 檻水 茶仔末 同煎水洗浸效

(三)

**治法** 用水芋頭加鹽糟搗碎 炒熟敷之 或用白芨末一錢 蟬酥一錢  
鷄卵白和敷 或用山茨菇研末 醋和敷之 或用蜈蚣一條 (去  
其手足) 雄黃二錢 加杏仁輕粉蟾酥少許 研為末 用猪胆一枚  
連汁入藥末 和勻 套指二三時 即效 如無猪胆 可用鷄膽一枚

白代之

▲治指頭瘡

**治法** 用象胆為君 五倍子為使 煮醋熱為洗於患處 即可消

▲治螺疔

**治法** 用大葉榔鷄(角地野菜)之根 與馬齒莧(俗名尖葉瓜子草)之莖

加入清明酒釀搗腐敷之 立見奇效

**附註** 凡遇患處 起紅點者 則用紅莖馬齒莧 起白點者 則白莖馬

齒莧 最為至當

▲治疗瘡

西京圖書館藏

中華書局影印

**病因** 疗瘡發之最速 有朝發夕死 隨發隨死 有三五日而不死 至

一月半月而終死者

其毒最烈

或發寒熱

或發麻木

或嘔吐

或煩燥 或頭暈眼花 或舌硬口乾

或手足青黑

或心腹脹悶大

或精神沉鬱

或言語顛倒 此皆生疔之症

**病象** 其形或大或小

或長或圓

其色或黃或白

或紅或紫

或有紅

絲 側辨別不清

可用生黃豆令人嚼之

如無豆腥之味

即是疔

瘡 疗瘡多生暗處

或痛或不痛

或癢或不癢

初發之時

人

不覺 若不早治 最易誤事

有發寒熱數日而後生者

亦有當時生

者 初起如粟米之大

或大小不一

如發寒熱

及麻癢嘔吐等症

即宜遍身留心

細細尋認

凡鬚髮耳眼口鼻

眉下兩腋

手足

縫 羞門陰戶等處

更宜格外細看

每日須看數次

有則照方醫

治 如前坎心後背心有紅點者

即照(後羊毛疔方)治之

倘尋覓

不見 取瓶中氣垢少許

納在口中 必有一處甚痛

即知疔瘡之

所在 必須從速刺出惡血

以見好血為度

**避忌** 諸瘡及刀鎌疔瘡 切忌用刀針 餘疔不忌

如毒重者 急服護

心散（見癰毒諸方）或菜子油一碗（或用真麻油亦可）以免毒氣

攻心 若服菊花飲亦可

**治法** 可用蜘蛛拔毒法 先將疔頭用磁片刺破 尋活蜘蛛一個 越大  
越佳 放疔瘡上 蜘蛛一見 自能奔往吸拔其毒 少時蜘蛛不動 或  
即取放冷水中 蜘蛛自活 如疔未愈 可用蜘蛛再行吸拔 或  
另行蜘蛛用之 以毒盡為度 無論疔在何處 跛毒重痛極 不省  
人事 命在垂危 立可回生 此為急救疔瘡第一良法 凢手指坐  
蛇頭瘡 及毒蛇毒蟲咬傷 皆可照此法拔毒

治疗瘡菊花飲

**治法** 用白菊花葉（連根飲）搗取自然汁一茶盃 滾酒兌服 用酒煮服  
亦可（不如生汁為妙毒重者宜多服）渣敷患處 留頭不敷 蓋被  
睡卧 令其出汗 其毒自消

**附註** 疔瘡無論生在何處 雖欲氣絕 亦可起死回生 至穩至靈至便  
諸方皆不及此 不可遲疑自悞 如無葉 可用根代 如無節  
可用藥店中之乾白菊花四兩（少則不效）甘草四錢 酒煮溫服