

第五卷

玉石部下品

總共九十三種今疏其要者二十三種

伏龍肝

石灰  
百草霜附

砒霜

鑄墨

硃砂

鉛丹

鉛

粉錫

東壁土

赤銅屑

銅青

井底泥

代赭

戎鹽

地漿

自然銅

梁上塵

礞石

麥飯石

花乳石

蓬砂

鉛霜

古文錢

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止

血消癰腫毒氣

此竈中對釜月下黃土以年久如赤色石中黃者佳研細水飛

用

疏○伏龍肝得火土之氣而成本經味辛氣

微溫無毒甄權言鹹其質本土味應有甘以

竈有神故古方多以之治顛狂癲癘及卒中  
邪惡等證本經主婦人崩中吐血止欬逆止  
血者蓋以失血過多中氣必損甘能補中微  
溫能調和血脉故主之也消癰腫毒氣者辛  
散臧軟之功也日華子主催生下胞及小兒  
夜啼者取其土中有神而性本冲和復能鎮  
重下墜也

主治叅互

千金方卒中惡氣伏龍肝末一雞子大水服  
取吐 救急方產後血氣攻心痛惡露不下  
竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效  
傷寒類要妊娠熱病伏龍肝末雞子許大水  
調服之仍以水和塗臍上方寸乾則再上  
外臺秘要一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼  
之乾再易或雞子黃和亦可

陰虛吐血者不宜用以其中有火氣故也  
腫毒盛難消者不得獨用

石灰味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癰疾死肌  
墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽

疏○石灰燒青石而成故其味辛氣溫本經  
不言其毒觀所主皆不入湯其爲毒可知矣  
火氣未散性能灼物故主去黑子息肉及墮  
眉也其主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癰疾死肌髓

骨疽者皆風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間  
辛溫能散風熱毒氣且能蝕去惡肉而生新  
肌故爲諸瘡腫毒要藥也辛而燥故又能殺  
痔蟲古方多用合百草團末治金瘡殊勝者  
以其性能堅物使不腐壞且血見石灰則止  
而百草又能活血涼血故也

○古墓中石灰名地龍骨火毒已出燥烈大減  
故主頭瘡婁瘡膿水淋漓及飲諸瘡口尤效

○艫船油灰名水龍骨得油性之潤復得水氣之陰故主金瘡跌撲傷損破皮出血及諸瘡癰血風腫瘡也

主治叅互

入三仙膏點一切癰疽腫毒輕者可消重者勢亦減 普濟方疣痣癰贅石灰一兩用桑灰淋汁熬成膏刺破點之 又方去癰疽瘰肉石灰半斤麥稈灰半斤淋汁煎成霜密封

每以針劃破塗之自腐落有毒不入湯丸故  
無簡誤

○百草霜乃煙氣結成其味辛氣溫無毒辛主  
散故能消化積滯及下食也凡血見灰則止  
此藥性能止血復能散瘀滯故主上下諸血  
及崩中帶下胎前產後諸病

主治叅互

筆峰雜興方胎動下血或胎已死百草霜二

錢櫻灰一錢伏龍肝五錢爲末每服二錢白  
湯入酒及童便調下 杜壬方治橫生倒逆  
胎前產後虛損月候不調崩中帶下百草霜  
白芷等分爲末每服二錢童子小便醋各少  
許調勻熱湯化服不過二服瘥

簡誤

雖能止血無益腸胃救標則可治本則非故  
不宜多服

砒霜味苦酸有毒主諸瘡風痰在胸膈可作吐

藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成

畏棗豆冷水入藥醋

煮殺毒用

疏○砒霜稟火之毒氣復兼煅煉本經雖云

味苦酸而其氣則大熱性有大毒也酸苦涌

泄故能吐諸瘡風痰在胸膈間大熱大毒之

物故不可久服能傷人也更善落胎及枯痔

殺蟲

簡談

按砒黃既已有毒見火則毒愈甚而世人多用砒霜以治瘧不知內經云夏傷於暑秋必痃瘕法當清暑益氣健脾是爲正治豈宜用此大熱大毒之藥如果元氣壯實有痰者服之必大吐雖暫獲安而所損真氣實多矣初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死以之毒鼠鼠死猫犬食之亦死人服

至一錢許則立斃若得酒及燒酒服則腸胃  
腐爛頃刻殺人雖菜豆冷水亦難解矣其於  
鈎吻射罔之毒殆又甚焉奈何今人用之治  
瘡是以必死之藥治必不死之病豈不誤哉  
除枯痔殺蟲用於外傳之藥此外慎毋服之  
切戒切戒

鎗墨主蟲毒中惡血暈吐血亦塗金瘡生肌止

疏○鎔墨釜月中墨也本經無氣味然觀其  
所主大約與伏龍肝相似而其用則少劣也  
凡血見灰見黑則止蠱毒惡氣得辛溫則散  
故本經主蠱毒中惡吐血血暈以酒或水細  
研溫服亦塗金瘡生肌止血也慎勿入傅面  
瘡藥中其黑入肉如黥不能去也血暈宜用

米醋研服

硃

作礪

砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破

結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好

肌柔金銀可爲鐸藥形如牙硝光淨者良

凡用水飛

去塵穢入釐器  
中重湯煮乾  
忌羊血畏醋梅及一切酸

疏○礪砂乃鹵液所結秉陰毒之氣含陽毒

之精其味極鹹極苦極辛氣溫有毒甄權酸

鹹有大毒能消五金八石腐壞人腸胃生食

之化人心爲血其毒之猛烈如此可畏矣其

主積聚結血宿冷者以鹹能入血軟堅辛能

散結溫能除冷故也積聚散則痛自止氣自  
下因寒以致頑痰壅結則欬嗽作故暫用以  
散之柔金化石之性故能爛胎及去惡肉也  
金石見之卽化其能生好肌乎此前人之誤  
耳

主治參互

普濟方損目生瘀赤肉努出不退杏仁百粒  
蒸熟去皮尖研濾取淨汁入礪砂末一分水

錢

煑化日點一二次自落 白飛霞方鼻中息  
肉礪砂點之卽落此方須入明礬牛黃鉛粉  
象牙末真珠末乃佳 集效方面上疣曰礪  
砂少許礪砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落  
急以甘草汁浸洗

簡誤

按礪砂大熱有毒之物近出於唐世而方書  
不著古人單服一味伏火作丸子亦有兼礪