

溫病賦

卷之六

仲
陰
本
林



溫病賦

傅國霖



溫病賦

風溫溫熱溫疫溫毒冬溫

粵稽溫病。迥異傷寒。口鼻受邪。僅先入三焦之臟。與
膀胱無恙。不驟傷六足之官。上中下分。傳之有漸。氣
血營分。分之誠難。第能胸有成竹。自然效若轉丸。風
溫者。初春陽氣始開。溫風為患。溫熱者。初夏陽氣大
泄。熱病同看。溫疫者。屬氣流行。兼穢濁而家家如是。



中國醫藥大學圖書館版權所有

直

溫毒者。諸溫夾毒。穢濁甚而種種生端。更有冬溫之
症。偏於氣候之干。寒溫失令。腠理不完。其為病也。中
道真行。始由於肺。辛涼為治。首護其陰。脉來動數。分
可憑。或寸大而尺膚熱。症見寒熱。今頭痛。用加渴而
汗如淋。初起惡寒。桂枝湯辛溫應用。既而但熱。銀翹
散。平劑須尋。身微熱而微咳。輕。桑菊而可任。脉浮洪

兮。胎黃面赤。身燔灼兮。大渴汗淋。此乃氣分熱深。真

陰被劫。務當藥投重劑。白虎嘯臨。倘脉芤而兼微喘。

宜固氣而合人參。及其邪熱入血。又貴審詳。氣血兩

燔。玉女煎用元參生地。血從上溢。銀翹散合犀角地

黃。甚至血溢。面黑而目疾。更須育陰清絡。以和陽止

渴生津。梨漿輕而五汁重。除煩快膈。梔豉緩而瓜



蒂強甚致邪離乎血。漸入於營。舌色則絳。口渴反平。
此則清營最重。屏逐黃連。休俟表遂而多汗。以致
倉猝變生。發癰者。化癰湯即進。發疹者。銀翹散堪呈。
最忌甘葛升麻。與三春之柳。尤忌當歸防芷。與羌活
之莖。苟其邪從肺臟。逆傳心營。以致神昏若寐。或加
譫語如醒。清宮湯與牛黃丸妙。紫雪丹與至寶丹成。

邪入胞絡者。舌則蹇而肢則厥。藥氣芳香者。牛黃。閉而紫雪清。至於溫毒大行。普濟消毒為主。須知水仙。敷後。三黃二香至精。其傳入中焦也。語聲重濁。面目緋紅。胎黃起刺。二便不通。日晡時病益盛。氣粗息來往同。此陽明之已實。有攻下之推崇。其有煩躁甚而脈息浮洪。白虎湯取效。沉分數而或形實小。大承氣。

收功。竹葉石羔。治陽明脉浮而促。大黃枳櫟。治陽明

脉沉不洪。汗多譫語。分胎黃。小承足貴。純利浹水。分

無糞。調胃休蒙。口譫言。而汗溺均無。先牛黃而後調

胃。胃脫實而肢体皆厥。用大承而重急攻。呃逆連聲。

瀉中焦。陽明之實。噦聲斷續。納下焦。衝脉之雄。下利

兼弊。添謔語。治法要妙奪天工。滑疾若形。宜開胃府。



沉實不見。亟清心宮。小陷胸合小承氣湯治三焦俱
急。先增液。而後調胃。法治熱結陰空。至於下後。法則
有條。裏雖解而汗多。益胃湯有復陰之奧。脉若浮而
無汗。銀翹散有退熱之驍。脉象浮洪。投白虎則火熄。
若形乾大。加人參則虛調。身無汗而脉數不浮。清燥
湯增水。敵火之效著。邪復聚而舌乾。脉實。護胃湯保。

陰潤下之功超。裏不淨而津枯脉弱。服增液而水益。
舟搖更聞下之不通。五症昭彰。失下延虛。用新加黃。
龍之劑。寸洪痰壅。用宣白承氣之方。導赤承氣治陽。
明小便^赤澀。疼時煩渴甚。牛黃承氣治陽明。心包熱閉。
舌短神茫。無水舟停。先借助於增液。仍然不解。又當
合以硝黃。下後虛煩。不得卧而懊憹顛倒者。梔子豆。

鼓法傳中嘔渴。口作苦。而尚未可下者。黃連黃芩湯。
邪深入血分。苔黃。舌絳。不渴。藥用清營分。發表攻裏。
毋嘗原夫。諸舌苔色絳。分別宜精。中黃邊絳。氣血兩
清。純絳鮮紅。急滌心包之絡。中心乾絳。雙清心胃之
營。舌尖乾絳。分。潔小腸以泄火府。舌絳而光。分。濡胃
陰而救陽明。絳而乾枯。膠黃。勿棄。乾絳無色。復脉休

輕若此情形。前賢雖垂明訓。參觀脉症。後學宜辨與
情。苟絳而有白。有黃。氣分未罷。絳而或滑。或膩。濕熱
猶盈。至若陽明發癰。化癰湯乃清熱之劑。陽明發疹。
銀翹散血散血之方。所忌者。升提壅補。誤犯則衄厥
音。嗆若具陽明症。畧行調胃湯攻之。若過內陷難防。
溫毒若還發痘。癰疹法可同商。更有內蘊陽明之毒。

咎
咎

外發楊梅之瘡。是固敗毒為主。還知利濕當裏。不渴
不滿。而發黃。以柏皮梔子。渴甚。苔黃。而發疸。以茵陳
蒿湯。若裏未劇。而小便不通。胥熱結為殃。惟冬地三
黃之法。此盛於火。而不足於水。非膀胱之咎。忌五苓
八正之傷。汗前燥熱。期逢惡。若寒而喜甘潤。下後安
涼。際遇飲稀糜。而戒克腸。脉靜身涼。大便秘。益胃增

液昏。舌黃。痼諸溫毒。安宮牛黃。承氣數投。肺燥咳。肺
脾滑泄。亡陰不復。渴常甚。而命必殤。舌苔不退者。擦
之以薄荷末。口渴欲飲者。沃之用雪梨漿。其深入下
焦也。身熱口渴。面赤唇焦。舌黑而齒玄。脈沉實者。
承氣決勝。脈虛大者。復脈為先。他如誤表傷津。舌強
神昏時悸。邪解熱退。咽乾舌燥。貪眠。或脈代。或耳聾。

或勞碌內傷使氣足則病却。或少陰或厥陰或汗下
不當俾正復而邪捐。上項虛症有憑復脉湯均宜急
用。倘加汗出無主救逆湯不可遲延。心煩不寐者資
黃連阿膠之劑。下後瀉泄者推牡蠣一甲之前煎。便若
轉乾一甲脉復策善。朝涼夜熱青蒿鱗甲班聯手蠕
動而齒燥舌乾得二甲而陽潛陰育厥已深而心悸

作痛。投三甲而火熄。風便小。定風治既厥且噤。脉細而勁。大定風治癰癰欲脫。味厚而填。壯火尚盛者。忌用定風。復脉虛多邪少者。忌用阿膠黃連。惟陰虛欲瘥之症。忌青蒿鱉甲之權。包熱猶存。先開竅而後救。液戰汗欲作。用復脉兼參保全。漱水便黑。分用犀角地黃。則瘀血可去。蓄血腹滿。分用桃仁承氣。或抵當。

而痊。熱徹裏虛。桃花湯治便痢膿血。完穀不化。桃花
粥治闕閉虛懸。若咽_咽痛而下痢心煩。少陰症。惟猪膚
湯中酌。但咽痛無心煩下痢。甘_甘餅湯與桔梗如仙音。
啞咽瘡為陰火之發越。劫涎利竅。賴苦酒以沉潛。若
當婦女經來之候。致有熱入血室之侵。氣血兩清。須
遣竹葉玉女。虛邪各半。直教護陽和陰。邪少虛多。復