

東
醫
寶
鑑
卷
十

南京中医药大学图书馆藏

编号 11-189-4/16



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚 奉 教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲時不及風乃大

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也(丹心)○霍亂者揮霍變亂

也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致溼熱內其中霍亂

運不能升降是以以上吐下瀉(八門)○霍亂或因飲冷或失飢或大怒或冒寒或乘舟車傷動胃氣

人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救(華佗)○霍亂多漬於熱故夏秋為盛(八門)○霍亂之病由風溼

火炎三氣之合成也風者脾土也濕者脾土也噁者心火也肝主筋故風急甚則轉筋也吐者嘔也

霍亂形證霍亂證心腹疼痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先上焦則吐而不利邪在下焦則利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂乃

曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利(八門)○霍亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏者而作(八門)

○人之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛

者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之(得效)

脈法

霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差(得效)○脈多伏或絕(丹心)○脈代者霍亂代而亂

者亦霍亂又關脈滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脈代勿訝(醫鑒)○滑數為嘔代

者霍亂微滑者生溢數凶斷(脈訣)○脈微而溢或代而散或隱而伏或大而虛或鑿或

促或代皆不可斷以死脈脈故也(正傳)○脈浮大而洪可救微弱而遲難救(正傳)

乾霍亂治法

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得頃刻之間

便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯(方見寒門)倍加橘紅與之或霍香正氣散(方見寒

門一加官桂未茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香丸尤妙(得效)○乾霍亂最難治死在須臾并降不通故也當先吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯(方見痰門)加解散藥川芎蒼朮防風白芷之類兼用薑鹽湯(丹心)○絞腸沙者乃乾霍亂一名也腹痛不可忍或手足厥冷乃腸胃絞結在腹也急用鹽湯吐之(入門)○乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉正氣關格陰陽隔絕服者必死急用吐法針委中(穴名)出血兼服治中湯(方見寒門)或霍香正氣散必效(入門)

薑鹽湯 治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服(直指)

溼霍亂治法 上吐下瀉謂之溼霍亂○凡霍亂吐瀉渴為熱不渴為寒(海藏)○熱多欲飲水宜五苓散寒多不飲水宜理中湯(方並見寒門)○仲景○霍亂乃溼熱兼風木為害治宜散風寒利溼降火四時通用藿香正氣散(方見寒門)寒月虛冷用理中湯(方見寒門)暑月煩渴宜黃連香薷散(方見暑門)俱宜合五苓散(方見寒門)以分清上下更合益元散(方見暑門)降火尤妙(入門)

霍亂吐瀉宜用木萸散二香黃連散如味薑附湯回生散加減正氣散○中暑霍亂宜香薷散桂苓白朮散(方並見暑門丹心)○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末三錢棗三枚薑五片煎極服一服可放或半夏末薑汁點服或白礬末一大錢沸湯點服亦效(得效)

木萸散 治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷水瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入藥同煎至二升冷煖任意服即效○如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋一盞同煎服或鹽梅鹹酸等物皆可煮服(入門)

二香黃連散 治伏暑霍亂腹痛躁悶脈沉手足冷藿香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服(入門)

加味薑附湯 治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢半甘草炙七分右剉作一貼水煎服(得效)○一名四順附子湯(直指)

回生散 治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生藿香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服(入門)

加減正氣散 異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂或吐或瀉蒼朮二錢藿香厚朴陳皮縮砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚燈心一團水煎服(回春)

香薷散 治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷急煎此藥沉冷服之他藥不能救(方見暑門)

益元散 一名六一散治霍亂吐瀉取此藥生薑湯調下妙(方見暑門)(丹心)



霍亂後轉筋陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡宗筋失其所養故輕者兩脚轉筋而已重者

有煖氣者立起急用木炭散方見上加茴香甘草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危大腹者亦效八門○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急灸臍中又取麝一把煎湯泡洗

次投附子理中湯方見寒門即生效附子一個活人○霍亂後轉筋理中湯方見寒門加石膏兩錢兩煎服如酒茶酒海藏○一法理中湯去白朮加生附子一個活人○轉筋屬血熱四物湯方見血門

花蒼朮兩星煎服丹心○吐瀉腹痛轉筋脈弦者木克土也平胃散方見內傷加木瓜五錢煎服入門○吐瀉後轉筋不止宜用木瓜湯直指

木瓜湯

治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒一錢甘草炙四分右剉作一貼入薑三片紫蘇十葉鹽一撮烏梅一個同煎服直指

一法

治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也丹心

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散方見寒門椒豆散麥門冬湯加減需苓湯止渴湯諸方

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓人參桂枝各二錢半右為末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可綱目

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半合人參甘草各五分右剉作一貼入薑三片烏梅一個水煎服入門○一名九君子湯入門

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒菜豆各四十九粒右研為末新汲水調下直指

加減需苓湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓一錢猪苓澤瀉香薷乾葛各七分黃連白朮甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服醫鑒

止渴湯

治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜萸根澤瀉葛根甘草各五錢右為末蜜水調二錢服丹心

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯方見寒門參胡三白湯諸方

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脈數或頭身痛柴胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門冬梔子仁甘草各八分人參五分五味子十粒右剉作一貼入棗二梅一燈心一團煎服回春

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參竹葉半夏附子炮甘草各一錢右剉作一貼入薑五片梗米百粒水煎服丹心

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩渴吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐訖以理中湯養香正氣散緩調治得效○又法急



南京中醫藥大學圖書館

以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐令透未透再服吐後續用熨法（入門）

霍亂射法 霍亂吐瀉心腹痛不可忍炒鹽二碗紙包紗護頓其胸前并腹肚上以熨斗火熨之氣透則延續以炒鹽熨其背則十分無事（得效）○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效（入門）

霍亂針法 乾霍亂刺委中（穴名）出血或十指頭諸經并穴出血皆是良法（正傳）○絞腸痧證手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水刮于病者脘腹上拍打有紫黑點血以針刺去惡處即愈（經驗）○乾霍亂者乃寒濕氣甚脾被絀而不能動氣被鬱而不能行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也（丹心）○又治絞腸痧刺血法詳見救急門（入門）

霍亂灸法 霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍中大艾炷灸之不計壯數立效（得效）○霍亂已死而腹中有暖氣依上法灸之亦甦（醫鑒）○又法灸氣海二七壯妙（得效）○霍亂吐瀉不止者（綱目）○霍亂已死但有暖氣者灸承筋七壯立甦（綱目）

禁忌法 霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可與稀粥以漸而入邪氣必使傷物盡然後稀粥漸漸養之（入門）○霍亂時大忌飲食助邪氣必使傷物盡然後稀粥漸漸養之（入門）○霍亂時大忌飲食入腹則死只吃水水不妨可飲熱湯切不可飲熱酒燒酒（山居）

不治證 霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脈洪大可治如脈微而囊縮舌卷而不治（綱目）○霍亂喘脹煩躁者不治（得效）乾霍亂吐瀉不得胸腹脹硬面唇青黑手足冷過肘膝六脈伏絕氣喘急舌短囊縮者死（回春）○脈微遲氣少不語為難治（得效）○大渴大躁大汗遺尿者死回生散救之（方見上）○（入門）

水疾吐瀉 乘船大吐瀉渴飲水者即死飲童尿最好自己尿亦好（丹心）○枯白礬末一錢水疾吐瀉百沸湯點服亦好（入門）○船暈嘔吐大半夏湯（方見痰門）煎服效（入門）

單方 凡二十一種

鹽 治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童尿一升溫和攪服吐下即愈（本草）

甘爛水 治霍亂入藥煎用其妙詳見（水部）

生薑 治霍亂欲死生薑五兩切取牛尿一升同煎取汁服即差（本草）

鍋底墨 治霍亂取二錢百沸湯一盞投其中急攪服吐瀉立止（本草）

生熟湯 一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物和鹽服之尤妙即百沸湯合新汲水也（本草）

天南星 治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸暖神識

便省神妙
本草

皂角乾霍亂鹽湯一碗入皂角末少許調服探吐即效（本草）

烏梅 治霍亂煩渴水瀆和蜜飲之妙（本草）

林檎葉 治霍亂轉筋筋脈大如桃李攣攣不可忍取葉濃煎湯飲之（種杏）

糯米 治霍亂煩渴水研取汁任意飲之（本草）

止○治霍亂不可闕也（本草）

牛糞治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以水
煮濾取清汁頓服一升即止(本草)

醋治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取衣絮漬醋煮令溫裏患處冷則易即愈（千金）

嘔吐

嘔吐之因
內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也○河間曰嘔吐者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱

也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主熾者少
陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以半夏為主究其三者之原皆因脾氣虛弱或因寒氣客

胃或因飲食所傷而致宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之（東垣）○溼嘔者有物有聲食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比吐為重也（入門）○劉可問謂嘔者火氣上升

此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心膈之分新食不得下而反出者有胃中有火與痰血嘔者(丹心)○嘔家雖有陽明證真不可下逆之故也(中景)

脈法寸口脈數其人即吐○寸口脈細而數則為熱○細則為寒○數則為嘔吐○脈經○問曰病人脈數為熱○當消穀引食而反吐者何也○師曰○過發其汗○令陽氣微○病氣虛○脈乃數○故為客熱○不能消穀○胃中不和○脈數不減者○欲得止○當復下之○

故吐也(仲景)○陽脈緊陰脈數其人食已即吐○寸緊尺瀋其人胸滿不能食而吐(脈經)○脈滑為嘔吐(脈訣)○嘔吐無他寸脈滑數微數血虛羣字胃薄沉則有痰最忌瀋弱(回春)○夫易水

而溢浮則為虛。溢則傷脾，脾傷則不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，完穀不化，名曰胃反（脈經）。○脈弦者，虛也，胃氣無餘，朝食暮吐，暮食朝吐（脈經）。○反胃，壅滯寸緊，尺盛，面青，口澀。

蘆花一名蓬農治霍亂氣息危急者取一把濃煎取汁頓服即差（本草）

木瓜 治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之枝
功同枳椇與木瓜同功（本草）

林檎青色者治霍亂吐瀉甚妙煮取汁飲或爵食之（本草）

粟米泔治霍亂煩渴飲數升立差○又研米清和水和瀝取汁服之主轉筋入腹本草

藜因取飲一二盞即愈（得效）

小蓀 治霍亂吐瀉者
汁飲之（本草）

煙鹿皮或烟獐皮熏烟最多黃色者水浸揉取汁頓服治乾霍亂即吐神效（俗方）

牛涎小兒霍亂牛涎一合灌下立效（得效）

東醫寶鑑雜論

卷五

三 上海校經山房石印

嘔反胃脈浮緩者生沉澁者死脈澁而小血不足脈大而弱氣不足(醫鑒)

嘔吐法治

嘔吐有冷熱二證冷者面青手足厥冷食久乃吐宜加味二陳湯丁香安胃湯加減理中湯者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和中桔梗湯黃連竹茹湯清熱二陳湯或葛根竹茹湯

橘皮竹茹湯○大病後胃熱虛而嘔者竹葉石膏湯(方見寒門)加薑汁服即止(入門)○清水或冷涎自下涌上者脾熱所致也二陳湯加白朮白芍藥升麻神機麥芽乾生薑炒苓各一錢

或水煎服或蒸餅為丸服(入門)○肝火出胃逆上嘔吐宜抑青丸(方見火門)○半夏橘皮湯藿香安胃散藿香平胃散比和推揚穀氣四味藿香湯加減四君子湯主之(綱目)○久病胃虛嘔吐

神水九治嘔吐清水如神方見痰門○停水者宜五苓散方見寒門○(入門)○嘔家聖藥是生薑汁至之說

先嘔後渴者宜猪苓散水入即吐者宜五苓散方見寒門○(入門)○嘔家聖藥是生薑汁至之說

矣然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔半夏逐之生薑於寒證最佳若遇熱嘔不可無烏梅也(醫鑒)

嘔吐宜服難白粥○嘔家有癰膿不須治嘔膿盡自愈矣(仲景)

加味二陳湯

治胃冷嘔吐二陳湯(方見痰門)一貼加縮砂一錢丁香五分也(丹心)

丁香安胃湯

治嘔吐寒胃寒所致黃芪二錢吳茱萸草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升麻當歸身陳皮甘草炙各五分黃柏二分右剉作一貼水煎服(正傳)

加減理中湯

治胃寒嘔吐清水冷涎脈沉遲人參白朮赤茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半夏縮砂研桂皮各一錢右剉作一貼入薑三片烏梅一個水煎服(回春)

保中湯

因痰火致嘔吐不下飲食白朮土炒二錢黃芩黃連並土炒養香梔子薑汁炒各一錢半夏陳皮赤茯苓各八分縮砂三分甘草二分右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清水取煎之去滓稍冷頻服(醫鑒)

和中桔梗湯

治上焦熱食已暴吐脈浮而洪半夏夏麴二錢桔梗白朮各一錢半陳皮厚朴枳實赤茯苓各一錢右剉作一貼薑三片水煎取清調木香檳榔末各一錢空心服三服後吐漸止降木香

黃連竹茹湯

治胃熱嘔吐煩渴脈數黃連薑汁炒梔子炒黑青竹茹各一錢人參七分白朮赤茯苓白芍藥陳皮麥門冬甘草各五分右剉作一貼入棗二枚一水煎服(回春)

清熱二陳湯

治痰火嘔吐出涎沫半夏陳皮赤茯苓甘草人參白朮竹茹砂仁梔子麥門冬各一錢右剉作一貼入薑三棗二枚一水煎服(回春)

南京中醫藥大學圖書館藏

葛根竹茹湯

治胃熱嘔吐葛根三錢半夏切薑汁漿水同煮焙乾二錢甘草一錢右剉作一貼薑三片棗二枚竹茹一彈子大同煎服(丹心)○治酒嘔尤妙(入門)○欲知胃中有熱手足必皆熱

者是胃熱也
(入門一)

加味橘皮竹

如湯治胃熱多渴嘔吐不食橘皮竹茹赤茯苓枇杷葉麥門冬半夏各一錢久參甘草大
各五分右剉作一貼薑三片水煎服○無枇杷葉則以蜜炙桑白皮代之六門
治胃虛嘔吐藥不停藿香人參橘皮半
夏各二錢右剉作一貼薑三煎服六門

四味藿香湯

湯治久病胃弱全不納食聞食氣即嘔四
加人參黃耆香附子各一錢右剉作一

加減四君子

治脾胃虛弱嘔吐飲食不待腐熟橘紅五錢人參丁香藿香各二錢半右為末每取二錢薑三片同煎溫服（寶鑑）

藿香安胃散

治同上蒼朮二錢藿香厚朴陳皮各一錢半縮砂神麴各一錢甘草炙七分右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服（東垣）

藿香平胃散

虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣即嘔聞藥亦嘔人參白朮白甘草各五分陳倉米一合右剉作一貼先以順流水三升泡

比和飲治胃縮砂

二同煎至七分去滓稍冷服日二三遂納
以陳倉米煎湯時時吸之全愈（醫鑒）

及薑三棗二同煎至七分去滓稍冷服日二三遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時啜之全愈（醫鑒）

茯苓半夏湯

嘔後渴嘔吐而思水解者急與之猪苓赤茯苓白朮各等分右為末每一人每嘔水二三碗諸藥不效但吃井華水一口即止用此藥即愈

猪苓散
治先
調服

最效薤白三莖雞子三個去黃粟三合同煮作稀粥別用人參一兩細剉水煎取三合去滓右以雞薤粟粥入暖人參湯相和攪勻頓服即止得效

薤白粥治嘔
一升

者欲吐不得吐見飲食則心便惡之二陳湯（方見痰門）如白豆蔻香附子
○惡心者欲吐不吐也胃口有熱有痰二陳湯加薑炒芩連（丹心）○乾嘔

乾嘔惡心

厥冷者宜生薑橘皮湯活人。○惡心者無聲無物但心中兀兀然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔實非心經之病皆在胃口上宜用生薑入曰惡心吐清水胃口有疾有熱有虛皆用生薑。

乾嘔或手
雖曰惡

湯(仲景)○乾嘔吐涎沫宜半夏乾薑散(仲景)
有熱惡心乾嘔不止者宜梔子竹茹湯(醫鑒)

生薑半夏
○胃中素

治乾嘔或手足厥冷橘皮四兩生薑八兩右剉以水七盞煮至三盞逐旋微溫呷服活人○一名陳皮湯治乾嘔最妙下咽即愈仲景

生薑橘皮湯

金瓶梅
第五回

生薑半夏湯

治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤然無奈者半夏五錢水一盞半煎至半盞入薑汁半盞和勻緩緩服之(仲景)○大凡嘔吐藥忌一時頓服宜緩緩服(入門)

半夏乾薑散

治胃乾嘔吐涎沫半夏乾薑各等分粗末每取三錢水煎緩緩服(仲景)

梔子竹茹湯

治胃熱惡心乾嘔不止梔子炒三錢陳皮二錢青竹茹一錢半右剉一貼水煎和薑汁服(醫鑒)

食痹吐食

食痹謂食已心下痛陰陰然不可名也不可忍也吐出血乃止此為胃氣逆而不行也(綱目)○嘔吐而脈弦者肝勝脾也

由風痰蠱絆於脾胃之間故惡心欲吐飲食不下當先實其脾土

茯苓半夏湯

治風痰蠱絆於脾胃之間惡心欲吐飲食不下當先實其脾土

白朮茯苓湯

治同上白朮茯苓各半夏各三錢神麴炒一錢麥芽麴五分右剉作一貼薑五片水煎服(東垣)

金花丸

治同上半夏製一兩橫柳二錢雄黃水飛一錢半右為末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三五丸以吐止為度風痰蠱絆于脾故飲食不下用此以治風痰(易老)○一名安脾丸(入門)

水煮金花丸

治風痰蠱絆脾胃飲食不下白麴四兩半夏大南星並湯洗寒水石燒各一兩天麻五錢雄黃一錢半右為末滴水丸梧子大每取百丸先煮漿水煎下藥煮令浮為度鹿出生薑湯

各下食前(易老)○風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不入食宜不換金正氣散(方見寒門)或安脾丸不宜輕用參朮惟久病脇痛者本克土也宜六君子湯(方見痰門)加青皮白芍藥柴胡升麻川芎

砂仁神麴煎服(入門)

麥天湯

治風邪羈絆脾胃有痰惡心欲吐麥門冬一錢半天麻一錢三分白朮白茯苓半夏神麴陳皮各一錢右剉作一貼薑五片水煎服(入門)

吐病有三

氣為上膈屬上焦食已暴吐者今世謂之嘔吐也○食飲入而還出為下膈食晬時乃反出之屬中下二焦○朝食暮吐暮食朝吐今世謂之膈氣反胃也(綱目)○吐有三因乃氣積寒也皆從

三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主分而不納○上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲

飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中○中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相侵為積而痛其脈浮而弦其證或先吐而後痛或先痛而後吐治法當以小毒藥去其積水香檳榔和其氣

府秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而自安(宜紫沉丸消積)○下焦吐者皆從於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮食朝食朝吐小便清利大

也(易老)

噎膈反胃病

內經曰三陽結謂之隔註曰三陽者大上腸胃熱結也蓋小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能使膀胱熱結則液津泄三陽熱結脈必洪數有力前後閉塞下既不通必反而上行

以噎食不下縱下復出乃陽火上行而下不降也(八門)○內經曰少陽所至為嘔滿溫食不下

明矣(八門)○又曰食不下者胃脘隔也(八門)○血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水能可

行食物難入間或可入亦不多也名之曰噎其槁在下與胃相近食雖可入難盡入胃良久而復出

名之曰噎亦曰反胃大便祕少若羊屎然名雖不同病出一體○其槁在胃門食下則胃脘當心而痛

須臾吐出食出痛乃止此上焦之噎也或食物可下難盡入胃良久復出其槁在幽門此中焦之噎

也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在關門此下焦之噎也(丹心)飲食不下而大便不通名曰噎

噎者有拒格之意即噎食反胃也(八門)○噎有五五隔者憂患寒熱氣也在心脾之閉上下不通

通或結於咽喉時覺有所妨碍吐之不出燕之不下由氣鬱痰結而然五噎者憂食勞氣思也飲食卒

然阻滯而不下反胃也噎也噎噎之證不屬虛不屬實不屬冷不屬熱乃神氣中一點病耳(醫林)

治之其言深中病清(丹心)噎噎之證不屬虛不屬實不屬冷不屬熱乃神氣中一點病耳(醫林)

噎病皆生於血枯血枯則燥矣得病情合經旨者丹溪一人而已(綱目)

噎病反胃治法噎病生於血乾夫血者陰氣也陰主靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二氣有養陰血

以解毒竹瀝以清痰乾薑以養血粟米以實胃滋以潤燥薑以去穢正是此意○噎噎反胃大率屬血

虛氣虛有痰有熱血虛四物湯氣虛四君子湯痰用二陳湯熱用解毒湯(即黃連解毒湯)氣血俱虛

平鯽丸

治噎氣不食大鯽魚一個去腸留鱗以大蒜切片填魚腹內溼紙包黃泥固濟慢火煨熟去鱗骨入平胃散末杵九梧子大每三五十丸空心米飲吞下(八門)

神仙奪命丹

治氣鬱嘔吐或噎食不下百草霜研五錢雄黃鵬砂各二錢乳香一錢半萊豆黑豆各四十粒右為末烏梅三十個水浸去核取肉和藥末搗勻彈子大朱砂二錢為衣每嚥一九以

茶泡熱餅壓下良久不吐乃藥之效若吐再嚥化一九服忌油膩鹽醋怒氣(八門)○一名二豆回春丹(回春)

丁香透膈湯

治五噎十噎痞塞不通白朮一錢三分甘草九分人參白茯苓縮砂香附子各七分沈香藿香陳皮厚朴各五分丁香木香麥芽青皮肉豆蔻白豆蔻各三分草果神麝半夏各二分右

剉作一貼薑三棗二水煎服(八門)〇十
噎者冷風氣伏熱悲憂水食喜也(綱目)

五噎寬中散

治五噎食不下厚朴香附子各一錢半甘草五分五皮陳皮丁香縮砂各四分木香三分白豆蔻二分右為籠末入薑三片鹽少許水煎服(綱目)

瓜薑實丸

治噎膈胸膈痞痛微背喘急妨悶瓜薑實枳殼半夏製桔梗各一兩右為末薑汁未糊和丸梧子大每五七十九薑湯吞下(正傳)

神奇散

治噎膈反胃血虛有火三陽枯竭當歸川芎白芍藥生地黃並酒炒陳皮縮砂半夏白茯苓白朮土炒香附子枳實烏梅肉藿香赤茯苓檳榔木通猪苓黃芩炒黃柏人乳炒知母人乳炒赤芍藥

天門冬麥門冬甘草各五分
右剉作一貼水煎服(醫鑑)

當歸養血湯

治老人痰結血枯成噎當歸白芍藥炒熟地黃白茯苓各一錢黃連以吳茱萸同炒黃連八分貝母炒瓜薑仁枳實陳皮厚朴香附子川芎蘇子各七分沉香五分水磨取沫吞到

作一貼薑一棗二水煎入
沉香汁竹瀝調服(回春)

生津補血湯

治年少人噎膈乃胃脫血燥不潤故便閉塞而食不下當歸白芍藥熟地黃生地黃白茯苓各一錢枳實陳皮黃連炒蘇子貝母各七分縮砂沈香水磨取汁各五分右剉作一貼薑一

棗二水煎入沉香
汁調服(回春)

聖灰散

治噎食病及回食病(回食者食下即吐也)取初出蜜石灰投入鍋中滾水中化開去渣止用清汁煮乾炒黃色為度黃色難得用色即可用罐收貯封口勿令泄氣過一二年則無用矣凡人年

四十餘壯健者用四分年老氣弱只用二分或三分好燒酒調服一二鍾能飲
者三四鍾或吐出虫或下虫其氣弱即愈如不吐不下遇發再服自痊(回春)

八仙膏

治噎食生藕汁生薑汁生梨汁生蘿蔔汁甘蔗汁(無則砂糖代之)白果汁(即銀杏)竹瀝蜂蜜各一盞右和勻盛飯甑蒸熟任意食之(回春)

疏汞丹

治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入銚內慢火化開柳枝拌炒有端起以醋酒之候結成砂子再研為末以糝大拌丸粟豆大生薑橘皮湯下三五十丸(八門)

狗屎平胃丸

治反胃諸藥不效黃雄犬一口餓數日用生粟米飼之取其糞中米淘淨用生白煎湯煮作粥臨熟入沉香二錢平胃散末和勻得所作丸梧子大每五七十九陳米飲下(八門)

杵糠丸

治五隔竹頭糠牛轉草各半斤糯米一斤為末取黃母牛口中涎和砂糖三兩為丸芡實大入鍋內慢火煮熟食日二次(八門)〇一名奪命丸(正傳)

九仙奪丹命

治反胃噎食其效如神枳殼二兩白礬枯一兩半夏厚朴並薑製各五錢木香五錢星蘆製各錢大慢火焙乾每一餅嚼碎以薑湯調平胃散送下忌生冷酒麪(活心)

順氣和中湯

治嘔吐反胃嘈雜吞酸噎隔吐痰水心腹刺痛陳皮鹽水炒香附子醋炒梔子薑汁炒各一錢白朮土炒八分白茯苓七分半夏神麪黃連薑汁浸曬乾猪胆汁拌炒各六分枳實五分縮砂三分甘草炙二分右對作一貼入薑三長流水入黃土泥攪澄清水煎入竹瀝重便薑汁溫服(醫鑒)

安中調氣丸

治反胃及痰氣白朮土炒香附子長流水浸三日炒黃各三兩陳皮二兩半夏製油炒白茯苓當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢木香一錢右為末以竹瀝薑汁打神麪為糊和丸菜豆大湯下一百丸(醫鑒)

回生養胃丹

治脾土虛寒聚成痰涎以致大便燥澀小便赤而多嘔吐酸水漸成反胃結腸之證蒼朮換搜作小餅烘乾南星細切薑汁浸一宿伏龍肝同炒去土半夏湯洗醋浸七日蒸熟橘紅伏龍肝同炒去土粟末薑汁浸蒸培各四兩人參白朮白茯苓厚朴蓬朮三校二味並醋炒薑澄茄縮砂白豆蔻各并炒麥并炒甘草各一兩丁香木香沉香各五錢右為末稀麪糊丸梧子大湯吞下六七十丸(醫鑑)

定生丹

治反胃定生苑雄黃朱砂乳香半夏木香肉豆蔻百草霜(為衣)各三錢沉香一錢阿魏明砂各五分萊豆四十粒烏梅四十個湯泡去核右為末以烏梅肉和搗作丸彈子大百草霜為衣陰乾每丸噙化嚥下以薑湯漱口復以陳麥餅大燒熟細嚼壓下噙藥即燃官香一炷如香盡藥未化者難治藥先化香未盡者可愈(醫鑑)

安胃湯

治反胃白朮白茯苓山藥炒當歸陳皮半夏藿香各一錢黃連薑汁炒蓮肉各八分人參縮砂各五分甘草三分右對作一貼入薑三棗二烏梅一水煎服(回春)

太倉丸

治反胃噎隔白豆蔻縮砂各二兩陳倉米一升黃土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑湯下百丸(回春)

奪命丹

治反胃噎隔白豆蔻縮砂各二兩陳倉米一升黃土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑湯下百丸(回春)

冷厚味蔥蒜酒麪氣惱五十以後一二服即效(回春)



附子散 治反胃大附子一個坐於磚上回面著火漸逼淬入生薑汁又炙又淬之可盡汁

嘔吐噎膈反胃宜通大便 謹病人欲吐者切不可下逆之故也(仲景)○陽明之氣下流則順今逆而上

而利導之(直指)○陰虛邪氣逆上窒塞嘔噎不足之病也此地道不通當用生地黃當歸赤芍

兼用甘草微加大黃芒硝以通其閉大便利則嘔吐噎膈自止矣(東垣)嘔吐證忌用利藥其言甚花

嘔吐而大小便不祕澀者利藥所當忌也若大小腸膀胱熱結不通上為嘔吐噎膈食若不進利藥

發泄則嘔吐何由而止乎古人用三一承氣湯正是此意(丹心)○通利大便以開下焦之壅塞宜用

紫沈丸厚朴丸附子丸人參利膈丸三一承氣湯四子調中湯香白丸大黃湯潤腸膏等藥

家多大便秘結虛冷者用蘇合丸溫而利之(方見大便)若大便秘結用蜜導法(方見大便)

汁和醋灌入下

部妙(直指)

柴沈丸 治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼此主之陳皮五錢半夏麴代赭石縮砂烏梅肉各三

錢丁香檳榔各二錢沈香木香杏仁白朮各一錢白豆蔻巴豆霜各五分右為末醋糊和丸黍米

煎湯下紫沈丸百九一日二服後大便通不吐則止(易老)

厚朴丸 治同上與萬病紫苑丸同方見積聚每服三九或五九薑湯下(東垣)

附子丸 治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通附子炮五錢巴豆霜一錢硫磺二錢右研極細焙黃

人參利膈丸 治噎膈大便燥結喘滿壅塞治隔氣之聖藥也人參當歸藿香枳殼大黃厚朴甘

草各一兩木香檳榔各七錢半右為末水丸梧子大白湯下五七十九(綱目)

三一承氣湯 治噎膈反胃(方見寒門)○河間

四子調中湯 治反胃痰盛二便澀半夏二錢桃仁一錢半夏附子枳實瓜蒌仁蘇子炒白芥子炒各一錢

黃連薑汁炒七分青皮陳皮沈香白茯苓木通芒硝各五分右剉作一貼水煎入芒硝攪勻

香白丸 治痰涎壅盛嘔吐不止大便澀滯青州白丸子(方見風門)與

(醫鑒)

空(心)服

青木香丸(方見氣門)右等分作丸薑湯下三十九(得效)

大黃湯 治冷涎反胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治不早死在朝夕大黃一兩生薑自然

汁半盞炙大黃令燥淬入薑汁中如此淬汁盡切焙為末每二錢陳米一撮蔥白二莖水一盞煎

至七分先食蔥白次服藥不十日去根(本事)○凡嘔噎大便秘結用大黃乃急則治標之法也仍用四物湯加童便非汁竹瀝多服為妙(正傳)

潤腸膏 治嘔噎反胃甚提新採威靈仙四兩搗取汁生薑四兩取汁真麻油二兩白砂蜜四兩治兩掠去沫右同入銀石器內慢火煎如餛飩時以匙挑食之一料自快效(正傳)

難治不治證 嘔吐脈弱小便自利身微熱而厥者虛極難治(脈經)○凡吐如清菜汁者死此是胃氣絕也(難經)○凡吐如清菜汁者死此是胃氣絕也(難經)○凡吐如清菜汁者死此是胃氣絕也(難經)

(大腸無血故也)○不淡飲食不斷房室者不治○氣血俱虛者則口中多出沫但見沫多出者必死(丹心)○反胃吐白沫者可治吐黃沫者不可治(種杏)

單方 凡三十種有螺泥丸

黃丹 治反胃黃丹一兩白礬二兩同入罐內火煨放冷為末蒸餅和丸梧子大溫酒下五丸至七丸(綱目)

黑鉛 治反胃黑鉛炒成灰檳榔等分為末空心米飲調下(丹心)

(二錢妙)

(本草)

煎頓服日再(本草)

一升即差(本草)

嘔家用半夏以去其水水去則嘔自止(金匱)

竹茹 主嘔噎取青竹茹一升水煎頓服○嘔噎用竹茹者逆胃解煩也(入門)

灰並主噎(本草)

服(本草)

橘皮 治反胃嘔吐橘皮用日照西方壁土末同炒香取皮為末每一錢淡薑湯煎服(直指)

滑石 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

赤石脂 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

人參 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

生薑 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

半夏 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

蘆根 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

鯽魚 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

蚌蛤粉 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

木瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服

水瓜 治反胃精飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時服之(丹心)○暴吐逆滑石末溫水服



咳嗽

咳嗽病因

內經曰人感於寒微則為咳甚者為嗽。秋傷於溼冬生咳嗽。又曰秋傷於溼上逆而咳。咳為痰厥（內經）。○形寒飲冷則傷肺肺傷則咳嗽（難經）。○秋傷於溼冬必咳嗽者蓋秋傷於溼積於脾也大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾溼而為痰也。是秋傷於溼無留溼則雖傷肺氣亦不為痰若有痰而寒少熱多故咳嗽咳嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之也。經曰五臟六府皆能使人咳嗽因非獨肺也各以其時主之而受病焉。非其時則傳以與之也。所病不等寒燥溼風火皆能令人咳嗽惟溼病痰飲入胃留之而不行上入於肺則為咳嗽。令溼在心經謂之熱痰溼在肝經謂之風痰溼在肺經謂之氣痰溼在腎經謂之寒痰。所治不同各隨語用藥（河間）。○咳嗽無痰在肝經謂之風痰溼在肺經謂之氣痰溼在腎經謂之寒痰。所治不同各隨痰而有聲因傷肺氣動於脾溼故咳而兼嗽也（河間）。○咳者聲咳之咳俗謂之嗽者是也。肺主氣寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中淫淫如癢習習如梗是冷嗽甚者續續不已連連不息坐卧不安言語不竟動引百骸聲聞四隣矣（明理）。

脈法

咳嗽所因浮風緊寒數熱細溼房勞瀉難右關濡者飲食傷脾左關弦短痰極肝哀浮短肺傷法當咳五藏之嗽各視本部浮緊虛寒沈數實熱洪滑多痰弦澀少血形盛脈細不足以息沈小伏匿皆是死脈。惟浮大而嗽者生外證內脈參考秤停（脈訣）。○關上脈微為咳。○脈弦或緊為寒。○脈浮為風。○脈細為溼。○脈數為熱。○脈沈為留飲。○沈數為實熱。○洪滑為多痰。○脈浮軟者生沈小伏匿者死（正傳）。○喘急脈沈肺脹停水氣逆填胸脈必伏取沈而實滑身溫易愈身冷脈浮尺瀉難補（回春）。○喘脈滑而浮者生澀而數者死大抵宜浮遲不宜急數（正傳）。○喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死（內經）。○喘脈滑而手足溫者生脈瀉而手足寒者死數者亦死為其形損故也（脈經）。○咳逆脈浮而緩者易治。○弦急而按之不鼓者難治。○脈結或促或微皆可治。○脈代者危。○右關脈弦者水乘土位難治（正傳）。○咳逆上氣脈散者死（散即數脈也）。○咳逆脈數為大刑金必死（入門）。○咳唾膿血脈數虛為肺痿數實為肺癰（仲景）。○肺痿唾血脈緊強者死滑者生（脈經）。○寸數虛溢肺痿之形（脈訣）。

咳嗽雖屬肺亦有臟腑之異

內經曰咳嗽上氣厥在胸中過在手陽明（大腸）太陰肺。○帝曰肺之令人咳何也岐伯對曰五藏六府皆令人咳非獨肺也。帝曰願聞其狀岐伯曰皮手者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺系上至於肺則肺寒肺寒內外合邪因而客之則為肺咳五藏各以其時受病非其時則各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘急有音甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中啞啞如梗狀甚則咽腫喉痹肝咳之狀咳則兩脇下痛

上海校經山房石印

甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾咳之狀咳則右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳延帝曰六府之咳奈何安所受病岐伯曰五藏之久咳乃移於六府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長蟲出肝咳不已則肺受之肺咳之狀咳而喘喘甚則肺脹肺受之小腸受之小腸咳之狀咳而失氣腎咳不已則腰膝痠痛受之膀胱咳之狀咳而遺尿久咳不已則三焦受之三焦咳之狀咳而腹滿不飲食飲此皆聚於胃關於肺使人多濁唾而面浮腫氣逆也(內經)

臟腑治咳藥

肺咳宜麻黃湯(方見寒門)心咳宜桔梗湯(方見下)肝咳宜小柴胡湯(方見寒門)脾咳宜升麻湯(方見寒門)腎咳宜麻黃附子細辛湯(方見寒門)胃咳宜烏梅丸(方見寒門)膽咳宜

宜黃芩湯加半夏生薑半夏黃芩芍藥甘草各二錢薑黃煎大腸咳宜赤石脂禹餘糧湯(方見寒門)小腸咳宜芍藥甘草湯(方見腹門)膀胱咳宜茯苓甘草湯○茯苓桂枝各二錢甘草二錢大黃煎

嗽作有四時早晏之異

凡咳嗽者是春升之氣夏是大炎上最重秋是溼熱傷肺冬是風寒外束(丹)重宜解表行痰用藥發散之後以半夏等藥逐去其痰庶不再來(入門)○早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流入肺中濁白散加知母或二母散(五更嗽同)○上半日嗽多屬胃中有火用貝母石

青降胃火一云上半日嗽多者(午前也)胃中有實火單石膏丸(方見大門)加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈散(方見大門)○午後嗽多屬陰虛四物湯加知母沙黃栢先降其火一云午後嗽(下牛日也)多屬陰虛四物合二陳湯加知母黃栢麥門冬如寒熱盜汗遺精宜滋陰降火湯(方見大門)○黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子斂而降之(一云黃昏嗽多者(夜嗽也)

潤肺丸以斂之(即潤肺散作丸也)通用二陳湯去半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮○夜嗽用降陰分火(丹心)○風寒鬱熱夜嗽者三柳湯加知母黃芩生薑(正傳)

桔梗湯

除痰止咳嗽又治心咳桔梗半夏製陳皮去白各一兩枳實三錢右為粗末每三錢薑五水煎服(局方)

二母散

治諸般咳嗽兼治痰喘知母各一兩巴豆十粒作霜石為末每服一字與薑三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定亦治久嗽不愈(入門)

咳嗽諸證

有風嗽寒嗽熱嗽濕嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽痰嗽乾嗽血嗽酒嗽久嗽大嗽夜嗽天行嗽通治咳嗽藥○咳因氣動為聲嗽乃血化為痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺二藏俱動則嗽咳俱作

也(入門)

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉癢語未竟而咳(入門)○傷風咳嗽者脈浮增寒壯熱自汗惡風口乾煩躁鼻流清涕欲語未竟而咳(醫鑒)○傷風咳嗽宜神朮散欬冬花散人參荊芥散(方見聲音)金沸草