

S2651-7

889

千金方衍義



孫真人千金方衍義卷八

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校

治諸風方

凡八類

論雜風狀第一

論二十五首

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痲三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依腧穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也

偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂

病在分腠之間溫臥取汗益其不足損其有餘乃可

復也

甲乙經云溫臥取汗則巨取之

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微知則可治

甚則不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然

巢源作噫噫然有聲舌強

不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後

寫於陽發其汗身轉輒者生汗不出身直者七日死

巢源作眼下及鼻人中左右白者

可治一黑一赤吐沫者不可治

風痺濕痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有

證候形如風狀得脈別也脈微澁其證身體不仁

凡風多從背五臟腧入諸臟受病肺病最急肺主
息又胃諸臟故也肺中風者其人偃臥而胸滿短
胃悶汗出者肺風之症也視目下鼻上兩邊下行至
口色白者尚可治急灸肺腧百壯服續命湯小兒減
之若色黃者此爲肺已傷化爲血矣不可復治其人
當妄言掇空指地或自拈衣尋縫如此數日死若爲
急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣噎噎不
能復言若不求師卽治宿昔而死卽覺便灸肺腧及
膈腧肝腧數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不
收者旣灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄言與肺

病相似然著緩可經久而死

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝腧百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此爲肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃臥不得傾側悶亂鼻絕汗出者心風之狀也若唇正赤尚可治急灸心腧百壯服續命湯若唇或青或白或黃或黑者此爲心已壞爲水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死

一云旬日死

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者

尚可治急灸脾膈百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色加餅粢大者尚可治急灸腎膈百壯服續命湯若齒黃赤鬢髮直面土色者不可復治

大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸膈百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮膚傳入於孫脈孫脈滿則入傳於絡脈絡脈滿則輸於大經中成病歸於六腑則爲熱不時臥止爲啼哭其脈堅大爲實實者外堅充滿不可按之按之則痛

也經絡諸脈傍支去者皆爲孫脈也

凡風之傷人或爲寒中或爲熱中或爲厲風或爲偏
枯或爲賊風故以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙
丁傷於風者爲心風以四季戊己傷於風者爲脾風
以秋庚辛傷於風者爲肺風以冬壬癸傷於風者爲
腎風風中五臟六腑之腧亦爲臟腑之風各入其門
戶所中則爲偏風風氣循風腑而上則爲腦風風入
頭則爲目風眼寒飲酒中風則爲酒風入房汗出中
風則爲內風新沐中風則爲首風久風入房中風則
爲腸風外在腠理則爲泄風故曰風者百病之長也



至其變化乃爲他病無常方焉。是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜爲熱中目黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇於虛腠理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也。

新食竟取風爲胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通

食飲不下脹滿形瘦腹大矢衣則臄滿食寒卽
新熱食竟入水自漬及浴者令人大腹爲水病
因醉取風爲漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜
衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈情不欲
勞

新沐浴竟取風爲首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風爲內風其狀惡風汗流沾衣

勞風之爲病法在肺下使人強上而目脫唾出苦涕

惡風而振寒候之三日及五日中不精明者是也七

八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出爲善若不



出則傷肺

風邪客於肌膚虛癢成風胗瘙瘡風邪入深寒熱相搏則內枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客四肢中卽攣筋中亦然邪淫於臟夢臟大形小淫於腑夢藏小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘡喉痺舌緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒瘖緩縱瘖瘡致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因熱食汗浴通腠理得開其自風出則覺肉中如

南京中医药大学图书馆

鍼刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善

夫目瞶動口唇動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將入風散磨神明白膏丹參膏依經鍼灸之

諸痺由風寒濕三氣并客於分肉之間迫切而爲沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故爲痺也其風最多者不仁則腫爲行痺走無



北京中医药大学图书馆版权所有

常處其寒多者則爲痛痺其濕多者則爲著痺冷汗
濡但隨血脈上下不能左右去者則爲周痺也痺在
肌中更發更止左以應左右以應右者爲偏痺也
夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽
氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊
也久痺入深令營衛滯經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履水時如入湯腹中股脛淫
漑煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷
肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死

一云三日

太陽中風重感於寒濕則變瘓也瘓者口噤不開背
強而直如發瘓之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣
息如絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金
瘡血脈虛竭小兒瘖風大人涼濕得瘓風者皆死溫
病熱盛入腎小兒瘖熱盛皆瘓瘓瘖瘖瘖皆相似故
久厥成瘓宜審察之其重者患耳中策策痛皆風入
腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘓直如死皆宜
服小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作癰瘡者乃無
害也惟風宜防耳鍼耳前動脈及風府神良

諸風第二方二十九首
灸法三十六首

小續命湯

治卒中

風欲死身體緩急口目不正

舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之

驗令人不虛方

麻黃

防己

崔氏外臺不用

人參

黃芩

桂心

白芍藥

甘艸

川芎

杏仁

各一兩

防風

一兩半

附子

一枚

生薑

五兩

右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去

沫內諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合三四

劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人腳弱服此



方至六七劑得瘥有風疹家天陰節變輒合服之

可以防瘡一本云恍惚者加扶神遠志如骨節煩

疼本有熱者去附子倍芍藥小品千金翼同深師古今錄驗有白木不

用杏仁救急無川芎杏仁止十味延年無防風

小續命湯 治中風冒昧不知痛處拘急不得轉

側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜

產後失血并老小

麻黃 桂心

生薑 五兩 人參

川芎 各二兩

白朮 前方用杏仁 附子

防已

芍藥

黃芩

各一兩

防風

半一兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

古今錄驗無桂心名續
命湯胡洽千金翼同

又方治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所

不及方

麻黃

三兩

人參

桂心

白朮

各二兩

芍藥

甘艸

防已

黃芩

川芎

當歸

各一兩

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日



三覆取汗

義

續命方專爲中風六經形證而立以其死生反掌

較之傷寒尤爲叵測蓋傷寒之邪卒然從表而入

非若中風皆由本虛虛風直犯無禁且多痰涎肉

壅表裏糾纏之難於分解也所以小續命湯雖本

古今錄驗而麻黃桂枝兩方皆在其中以其本虛

必加人參駕馭麻桂發越在表之邪又需附子直

入少陰搜遂在裏之邪不使外內交攻正氣立斷

續命之名信乎不虛其餘川芎黃芩防風防已不

過爲麻黃之使以祛標熱耳 前方治卒中風欲

