

傷寒

從集

雜證謨

卷八至
九

景兵全書卷之八

傷寒典

須集

會稽

張介賓

會卿著

會稽

魯

超

謙菴訂

傷寒

下

溫病暑病

三十三

病暑病之作。本由冬時寒毒內藏。故至春發為溫病。至夏發為暑病。此以寒毒所化。故總謂之傷寒。仲景曰發熱不惡寒而渴者溫病也。暑病則尤甚矣。蓋暑病者即熱病也。是雖與寒證

不同。然亦因時而名。非謂其病必皆熱也。此外如夏月中暑者。亦謂之暑病。則又非寒毒蓄留之證。在仲景卽名之爲中暍。義詳暑證門。所當參閱。

一溫病暑病之治。宜從涼散。固其然也。然必表裏俱有熱證。方可治用清涼。若值四時寒邪客勝。感冒不正之氣。表邪未解。雖外熱如火。而內無熱證。可據者。不得以溫暑之名。執以爲熱。而槩用涼藥。

一冬有非時之煖。或君相客熱之令。而病熱者。名曰冬溫。此與冬月正傷寒大異。法宜涼解。此舍時從證也。若夏有寒者。其

宜溫亦然。

素問刺志論曰。氣盛身寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。傷寒論曰。脈盛身寒。得之傷寒。脈虛身熱。得之傷暑。此二論之言。傷寒傷暑者。非即溫病暑病之謂。蓋單指夏月感觸時氣者。所當辨其爲寒爲暑。而寒則宜溫。暑則宜清也。身寒者言受寒。憎寒。身熱者言受熱。發熱。非曰身冷者方是傷寒。身熱者乃是傷暑也。但此二論。則一曰氣盛氣虛。一曰脈盛脈虛。詞若異。而理則一也。故凡察氣者。當在形色。察脈者。當在本元。合而觀之。則見理精矣。

發斑三十四

發斑證輕則如疹子。重則如錦紋。其致此之由。雖分數種。然總由寒毒不解而然。如當汗不汗。則表邪不解。當下不下。則裏邪不解。當清不清。則火盛不解。當補不補。則無力不解。或下之太早。則和陷不解。或以陽證誤用溫補。則陽亢不解。或以陰證誤用寒涼。則陰凝不解。凡邪毒不解。則直入陰分。鬱而成熱。乃致液涸血枯。斑見肌表。此實毒邪固結。營衛俱劇之證也。但斑有微甚。勢有重輕。輕者細如蚊迹。或先紅而後黃。重者成粒成片。或先紅而後赤。輕者只在四肢。重者乃見胸腹。輕者色淡而隱。

重者色紫而顯。若見黑斑。或大便自利。或短氣。或二便不通。則十死九矣。凡病傷寒。而汗下溫清。俱不能解。及足冷耳聾。煩悶欬嘔者。便是發斑之候。

一。成無己曰。大熱則傷血。熱不散裏實表虛。熱邪乘虛出於皮膚。而爲斑也。慎不可發汗。若汗之。重令開泄。更增斑爛也。自後諸家所述。皆同此說。予則以爲不然。蓋凡傷寒之邪。本自外而入。深入不解。則又自內而出。此其表裏相乘。勢所必至。原非表虛證也。但使內外通達。則邪必由表而解矣。卽如犀角地黃湯。乃治斑之要藥。人知此湯。但能涼血清毒。而不知

此湯善於解表散邪。若用之得宜。則必通身大汗。熱邪頓解。何爲不可汗耶。由此言之。則凡脉數無汗。表證具在者。必須仍從解散。

一凡治發斑。須察表裏如溫疫不解。熱入血室。舌焦煩熱發斑者。犀角地黄湯。○內外俱熱。陽明狂躁。大渴發斑者。白虎湯。或加人參。○陽毒赤斑。狂言見血者。陽毒升麻湯。○疫癘發斑。大熱而燥者。三黃石膏湯。○火鬱於經。寒邪不解。脉仍滑數而發斑者。一柴胡飲。○陽明外邪。陽毒不解者。升麻湯。○脾腎本虛。外邪不解而發斑者。五柴胡飲。○陽明表邪不解。

溫熱發斑者柴胡白虎煎○溫熱毒盛咽痛發斑者玄參升
麻湯○陰虛水虧血熱發斑者玉女煎○陰虛血燥大熱大
渴發斑者歸葛飲○內虛外實陰盛格陽發斑者大溫中飲
○太陽陽明惡熱大便秘結邪毒在府發斑者調胃承氣湯
一凡本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解予常用大
溫中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪達多有見
赤斑風餅隨汗而出隨出隨沒頃刻卽愈活者多人矣凡寒
毒爲斑卽此可見使內托無力則此毒終無出期日深日甚
難乎免矣此理甚微不可不察

發黃 三十五

凡發黃黃疸等證。多由濕熱。如小水不利。或黃或赤。或小腹脹滿不痛。或大便實而渴甚。脉來沉實有力。皆濕熱之證。輕則茵陳五苓散。重則茵陳湯。分利小便。清血瀉火。則黃自退矣。然黃有陰證。及諸治法。俱詳黃疸門。宜參用之。

仲景曰。太陽病。脉浮而動數。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。則爲結胸。若不結胸。但頭汗出。小便不利。身必發黃也。○曰。陽明病。無汗。小便不利。心中懊憹者。身必發黃。○陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭

汗出身無汗。際頸而還。小便不利。渴引水漿者。此爲瘧熱在裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。○曰傷寒。脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。大便鞭者。爲陽明病也。○曰傷寒發汗已。身目爲黃。所以然者。以寒濕在裏不解故也。以爲不可下也。於寒濕中求之。○傷寒身黃發熱者。梔子蘘皮湯主之。

孫真人曰黃疸脉浮者。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯。

發狂 三十六

傷寒發狂。本陽明實熱之病。然復有如狂證者。雖似狂而實非。

狂。此中虛實相反。最宜詳辨。不可忽也。凡實熱之狂。本屬陽明。蓋陽明爲多氣多血之經。陽邪傳入胃府。熱結不解。因而發狂。內經陽明脉解篇曰。胃者土也。故聞木音而驚者。土惡木也。其惡火者。熱甚則惡火也。其惡人者。以陽明厥則喘而惋。惋則惡人也。其病甚則棄衣而走。登高而歌。或數日不食。或踰垣上屋者。以四肢爲諸陽之本。陽盛則四肢實。實則能登高也。其棄衣而走者。以熱盛於身也。其妄言罵詈。不避親疎而歌者。以陽盛爲邪也。又曰。陰不勝其陽。則脉流薄疾。并乃狂。又曰。邪入於陽。則狂。是皆以陽明熱邪上乘心肺。故令神志昏亂若此。此陽狂。

也。然傷寒病至發狂，是爲邪熱已極，使非峻逐火邪，則不能已。故但察其大便鞭結，或腹滿而堅，有可攻之證，則宜以大小承氣，或涼膈散六一順氣湯之類下之可也。如無脹滿實堅等證，而惟胃火致然者，則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪，其病自愈。

一、如狂證本非實熱發狂，其證亦有輕重。如仲景曰：太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，其外不解者，尚未可攻，當先解外，外已解，但少腹急結者，乃可攻之，宜桃仁承氣湯。○又曰：太陽病六七日，表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人如狂者，以熱

在下焦少腹當鞭滿小便自利者下其血乃愈抵當湯主之
按此二條以太陽熱邪不解隨經入府但未至發狂故曰如
狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

一近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失
志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失精
而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其
本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證
如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之
氣內無胸腹之結滑實之脉雖或不時躁擾而禁之則止口

多妄誕而聲息不壯。或眼見虛空。或驚惶不定。察其上則口
無焦渴。察其下則便無鞭結。是皆精氣受傷。神魂不守之證。
此與陽極爲狂者。反如水炭。而時醫不能察。但見錯亂。便謂
陽狂。妄行攻瀉。必致殺人。凡治此者。須辨陰陽。其有虛而挾
邪者。邪在陽分。則宜補中益氣湯之類。邪在陰分。則宜補陰
益氣煎之類。虛而無邪者。在陽分則宜四君八珍十全大補
湯。大補元煎之類。在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之
類。陰虛挾火者。宜加減一陰煎二陰煎之類。陽虛挾寒者。宜
理中湯回陽飲入味湯右歸飲之類。此方治之。宜大畧如此。

而變證之異。則有言不能傳者。能知意在言表。則知所未言矣。

一凡身有微熱。或而赤戴陽。或煩躁不寧。欲坐臥於泥水中。然脉則微弱無力。此陰證似陽也。名爲陰躁。蓋以陽虛於下。則氣不歸原。故浮散於上。而發躁如狂。速當溫補其下。命門爰則火有所歸。而病當自愈。若醫不識此。而誤用寒涼者。必死。發狂下利。讖語者不治。○狂言反目。直視者。爲腎絕死。○汗出後。輒復熱。狂言不食者死。

仲景論曰太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺其人
小便不利大便反快但當利其小便○曰濕家之爲病一身盡
痛發熱身色如熏黃○濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向
火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸
中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也○濕家下之額上汗出
微喘小便不利者死利下不止者亦死

論曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫
云此可發汗汗之病不愈者何也曰發其汗汗大出者但風
氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲

汗出者風濕俱去也○濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭
痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕
故鼻塞內藥鼻中則愈○病者一身盡疼發熱日晡所劇者
此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

論曰傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴
脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之○若其人大便鞭小便自
利者桂枝湯去桂加白朮主之○風濕相搏骨節煩疼掣痛
不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣
或身微腫者甘草附子湯主之