

儒門事親卷之十二

戴人張子和著

新安吳勉學校

吐劑

三聖散

防風

三兩去蘆

瓜蒂

三兩搏淨碾破以蒂卷定重紙剉細去紙用麤羅子羅過

另放末將滓炒微黃以入末一處同炒黃用

藜蘆

去苗及心加截用之或一兩或

半兩或

分

右各為麤末每服約半兩以蘆汁三茶盞先用二盞煎三五沸去蘆汁次入一盞煎至三沸却將原

二盞同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不

必盡劑以吐為度

### 芡蒂散

芡蒂

七十  
五箇

赤小豆

七十  
五箇

人參

半兩  
去蘆

甘草

半兩或一  
錢五分

右為細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減

用之空心薑汁調下服之

### 稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去支弦  
秤一兩炙用之

碌礬

藜蘆

半兩

右為細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調

下灌之

蔚金散

蔚金

滑石

川芎 各半兩

右爲細末每服一二錢量虛實加減以麤汁調下  
空心服之

茶調散

亦一名二仙散

苳蒂不以多少好茶中停

右爲細末每服二錢麤汁調下空心用之

聖散

苳蒂不以多少

右爲細末每服一錢或二錢薤汁調下服之脇痛  
加全蝎頭痛加蔚金

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬

半兩

銅青

一分

粉霜

一錢

輕粉

一分

右研爲細末每服一字薄荷湯調下用之如中風  
用漿水調服

常山散

常山

二兩

甘草

二兩半

右爲細末水煎空心服之

青黛散

猪牙皂角 二箇

玄胡索 一箇

青黛

右爲細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷

麻黃

去根不  
去節

連翹

芒硝

已上各  
半兩

石膏

黃芩

桔梗

已上各  
二兩

滑石

三錢

甘草

二兩

荆芥

白朮

山梔子

已上各  
一兩

右爲麤末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豆豉  
葱白同煎

浮萍散 治癩風

浮萍

一兩

荆芥

川芎

甘草

麻黃

去根

已上各一兩或加當歸芍藥

右爲麤末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服

汗出則愈

升麻湯

升麻

七

葛根

芍藥

甘草

炒

已上各一兩

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

麻黃湯

麻黃

一兩去根

官桂

七錢

甘草

三錢炙

杏仁

二十二箇去皮尖麤炒黃色用

右爲麤末每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服

汗出自解

桂枝湯

桂枝

一兩

茯苓

半兩

芍藥

一兩

甘草

七錢

右爲麤末每服三錢水一盞生薑棗一同煎溫服

下劑

導水丸

大黃

二兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩另取頭末

○甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病

則加

○白芥子一兩去遍身走注疼痛

加

○朴硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加

○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯

氣通血脉

○樟柳根一兩去腰腿沉重

右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加

百丸臨卧溫水下

### 禹攻散

黑牽牛頭末

四兩

茴香

炒一兩

或加木香

一兩

右爲細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

### 通經散

陳皮

去白

當歸

各一兩

甘遂

以麴包不令透水煮百餘取出用冷水浸過去麴焙乾

右爲細末每服三錢溫湯調下臨卧服

### 神祐丸

甘遂

依前製用

大戟

焙浸煮醋乾用

芫花

醋浸煮各半兩

黑牽牛

一兩

大黃

乙兩

右爲細末滴水丸小豆大每服五七十九丸臨卧温

水下

琥珀丸

右爲前神祐丸加琥珀一兩是也

益胃散

甘遂

依前製過用

右爲細末每服三錢以豬腰子細批破以鹽椒等物淹透爛切摻藥在內以荷葉裹燒熟温淡酒

調服

大承氣湯

大黃

半兩

厚朴

乙兩

枳實

乙枚 麩炒

芒硝

半兩

右爲麤末每服三五錢水一盞煎至七分去滓服  
以意加減

小承氣湯

大黃

厚朴

已上各乙兩

枳實

乙枚

右爲麤末同前煎服

調胃承氣湯

大黃

甘草

炙

朴硝

已上各半兩

傷門事類 卷之十二  
右爲粗末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓溫服食後

桃仁承氣湯

桃仁

乙十二箇  
去皮尖

官桂

甘草

芒硝

已上各半兩

右剉如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓溫服

玉井散

苡薏根

二兩

甘遂

乙兩製用

右爲細末以射香湯調下三錢臨卧服

水煮桃紅丸

黑牽牛頭末

半兩

苾芾末

二錢

雄黃

乙錢水飛過用之

乾胭脂

少許

右以黃水調麵爲丸以水煮令浮熟取出冷水拔過射香湯水下

無憂散

黃蓍

木通

桑白皮

陳皮

已上各乙兩

胡椒

白朮

木香

各半兩

牽牛頭末

四兩

右爲細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後

泄水丸

又方藏用丸一料加苾芾半兩商陸半兩爲末水丸依前服之

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁

續隨子 已上各半兩 樟柳根 乙兩

右爲細末水煮棗肉爲丸如小豆大每服五七十  
丸水下

牛黃通膈丸

黑牽牛 大黃 木通 已上各半兩各另取末

右爲細末水丸如黍粒大量兒大小三五十丸或  
百丸水下

四生丸 一名潤腸丸

黑牽牛 大黃 朴硝 皂角 去皮弦蜜炙

已上各等分

右爲細末水丸如梧桐子大每服七八十丸食後  
溫水下

內托散

大黃

牡礪

已上各半兩

甘草

三錢

芡薹

二箇

右爲末水一大盞煎三五沸去滓露冷服

藏用丸

大黃

黃芩

已上各二兩

滑石

黑牽牛

各四兩

右爲末水丸桐子大每服五七十丸食後溫水下

神芎丸

藏用丸一料內加黃連薄荷川芎各半兩水丸

桐子大水下

進食丸

牽牛 乙兩

巴豆 三箇去油心膜

右爲末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下

牛黃白朮丸 治腰脚濕

黑牽牛末 大黃 已上各二兩

白朮 乙兩

右爲末滴水丸桐子大每服三十丸食前生薑湯

下要利加至百丸

玉燭散

以四物湯承氣湯朴硝各等分水煎去滓食前服之

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

丁香化癖散 治小兒脾

白丁香 蜜陀僧 舶上硫黃

已上各二錢

礪砂 半錢 輕粉 少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳調女病男乳調後用通膈泄

抵當湯