

雜病篇

痲瘡

瘟疫

邪祟

癰疽
上

東醫西寶鑑

十五

東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

痲瘧

瘧病之源

內經曰夏傷於暑秋為痲瘧○夏暑汗不出

盡形弱而氣燄穴俞以閉發為風瘧○又曰魄汗未

寒熱又曰因於露風乃生寒熱○風氣盛於皮為

膚之內內不得通外不得泄○風氣盛於皮為

則熱而悶名曰寒熱○夏傷於暑秋必泄○然寒閉

傷之淺者近而暴傷之重者遠而深○瘧瘧者久瘧

也是知夏傷於暑濕熱閉藏而○瘧瘧者久瘧

氣內行至秋而發為瘧也○瘧瘧者久瘧

于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發○瘧瘧者久瘧

因風寒感冒而得之者在於陽則發熱○瘧瘧者久瘧

發寒并則病作離則病止○瘧瘧者久瘧

早在血則發晏淺則日作深則間○瘧瘧者久瘧

在背或在腰脊雖上下遠近之不同○瘧瘧者久瘧

在背或在腰脊雖上下遠近之不同○瘧瘧者久瘧

一也。陳○大法風暑當發汗。夏月多在風涼處。歌

遂閉其汗而不泄。故也。○病氣如凌虐人之狀。

又在內傷。久則為勞。瘵然則豈美疾哉。○

瘧疾形證

瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓

欲飲。冷。○夫陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相

移也。陽并於陰。則陰實而陽虛。陽明虛則寒。慄鼓

額。巨陽虛則腰痛。背頭項痛。三陽俱虛。則陰氣勝。陰

氣勝。則骨寒而痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛則陰

外熱。陰虛則內熱。內外皆熱。則喘而渴。故欲冷飲

也。○夫瘧之始發也。陽氣并於陰。當是之時。陽

虛而陰盛。外無氣。故先寒慄也。陰氣逆極。則復出

之。陽陽與陰復并於外。則陰虛而陽實。故先熱而

渴。夫瘧氣者。并於陽。則陽勝。并於陰。則陰勝。陰勝

則寒。陽勝則熱。○衛虛則先寒。榮虛則先熱。表

邪多則寒。裏邪多則熱。○陽熱多表裏相

○人多則寒。榮衛晝行於陽。夜行於陰。熱

衛行。到病所。不通。乃作寒戰。振頭額。中

腰脊俱痛。此邪氣入於內也。寒戰俱已。內外皆熱。

頭痛也
○破
暑
瘧
熱
濕
瘧
多
寒
寒
瘧
先
寒
後
熱
風

皆癰
先先
寒熱
後後
熱寒
門入

脉法

弦瘡逢者自可弦溫之弦多緊者可逢發汗浮大者可吐之弦之

數者風代發散也則以死飲經疏○消瘥脉止自之弦微○弦○遲瘥脉多寒自弦數微

多寒則弦而帶遲亦○有久而脉極虛微而無力似

乎不弦然○而必於虛數之中見弦但搏手耳
察不可也○弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力

為久瘡者病鑿鑿自○愈瘡脉

先後天理
發因遇夏氣
傷於水寒
藏於腠理
出

皮膚之陽氣也。中秋傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱，風

傷也於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰寒瘧

寒執

皮膚之陽氣也。中秋傷於寒而後傷於風，故先寒而後熱，風

傷也於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰寒瘧○先熱而後寒者由先

東醫寶鑑卷之九

西不

水

則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也
○甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起
則休作無定時矣

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃

皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行

於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是

以日作經○衛氣與邪相并則病作與邪相離則

病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已

離其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原也

○其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間

日乃作也○時有間二日或至數日發或渴或
不渴其故何也曰其間日者邪氣與衛氣客於六
府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者
陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴
日一發者受病一年間日一發者受病半年連日
發者受病一月二日發陰經受病也最重
也又曰三日一發陰經受病也最重

邪淺與榮衛並行一日一發○陰為藏邪深橫連
募原不能與正氣並行故問二蓄積乃發或三或四

必為瘧母門

瘧發有晝夜早晏之異使然岐伯曰邪氣客於風府其客何氣

一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府下
則滕理開滕理開則邪氣入邪氣入則節二五此
作日損益晏也其出入於脊內注於伏膂其
下至臍骨二十六日入於脊內注於伏膂其
氣上行九日出于缺盆之中其氣日高故作日益
早也○陰為夜○陽為晝○發邪深榮衛晝行背與脊故也
○陰為夜○陽為晝○發邪深榮衛晝行背與脊故也
子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於未申
或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須用藥
趨早或移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升散
門○從卯至午發者邪在外也從午至酉發者邪
在內也從酉至子發者邪在血分也

夏傷於暑，秋必病瘧。初不知何經受病，隨其受邪而取之。有中暑，三陽者，有三陰者，大抵經中邪

氣其證各殊在太陽陽經者謂之寒瘧治多汗之在
陽明其證各殊在太陰陽經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之

風瘡治多和之此三陽受病皆謂暴瘡發在夏至
後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者

此則不分三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前乃傷之重者遠而深也痰瘧者老瘧也故謂之

溫久瘡
瘡亦曰
風傷寒
瘡此爲
傷寒壞
病其證
先熱後
寒名曰

傷○
○瘡屬三陽
瘡宜桂枝羌活湯屬三陰
瘡宜下湯○和陽明

胡桂枝湯柴胡加桂湯
 三陰溫瘧宜白虎桂枝

湯麻黃
○太
陽
陽
合
病
桂
枝
為
藥
湯
桂
枝
石
膏
湯

黃芩湯以和之桂枝湯以和之

桂枝羌活湯治太陽風甘尊各一錢半右剉作一桂枝羌活

煎服

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前方去桂枝加麻黃也劑法服法同上

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑三棗二水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三棗二水煎服

白虎桂枝湯

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢梗米一合右剉作一貼水煎服

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白朮辛

檳榔甘草各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴胡四物湯治三陰經溫瘧或夜發者柴胡生乾地

歸赤芍藥各一錢石到作

桂枝芍藥湯治大瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂

泄經曰汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入

陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各

桂枝石膏湯治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石

煎到作一貼水

桂枝黃芩湯服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽

錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各

瘧晝發夜發宜分治氣虛晝發宜加半夏黃芩○門補虛

麻黃黃芩湯

受貼
邪水
則煎
肝臨
氣肝
燥服
經○
所挑
謂仁
肝味
苦苦
急甘
急辛
食肝
甘者
以血
緩之
之海
挑血

有仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血中故夜發乃陰經

柴胡芍歸湯

治夜發陰瘡引出血分而散後服人參
截瘡飲立之柴胡乾葛川芎各一錢

紅花甘草各三分
 剉作一貼入薑三棗二梅一

服水煎

諸瘡證

治瘡有風瘡寒瘡熱瘡濕瘡
勞瘡鬼瘡疫瘡瘴瘡痲瘡老瘡
端食瘡

風瘡

自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯
無汗則宜桂枝湯有汗則宜正氣湯

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯方 附湯草果飲柴胡薑湯一石 此霍亂交解

熱瘧

因暑勝熱多得之
一名瘧瘧亦曰暑瘧
宜人參白虎湯
漿苓湯
寒門方見
胡知母湯
爭功散
龍虎湯

濕瘧

因冒襲雨濕汗出
淖浴得之
寒熱相半
小便不利
宜五苓散
方明加蒼朮
川芎羌活
附子

痰瘧

因外感內傷鬱聚
成痰頭痛肉跳吐食
嘔沫甚則
昏迷卒倒
宜柴陳湯
加草果或四獸飲
冷附湯
久

不止以露薑飲截之
門○有人忽得瘧疾
嘔吐異
常以二陳湯
麩醜加入參縮砂
倍用白豆蔻
這一

二貼自然寒熱不作
蓋白豆蔻能消
磨流行三焦
榮衛一轉
寒熱自平也
指

食瘧

一名胃瘧
因飲食失節
飢飽有傷
所致
寒已復熱
熱已復寒
寒熱交并
苦飢而不
能食
食則吐
痰經

曰寒熱善飢而
不能食
食已支滿
腹脹
病以日作
名曰胃瘧
瘧是也
宜平陳湯
加枳實
白朮
山楂
子神

麴青皮或清脾飲
小清脾湯
又二陳
湯加青皮
皮檳榔
縮砂
白豆蔻
亦佳
諸

勞瘧

即久瘧也
寒熱微寒
中有熱
熱中有寒
最難調
治由表裏俱虛
真元未復
疾雖暫止
小勞復來
經

年不差宜芎歸驚甲散常山飲五勞元一補一發丹辰

砂元養胃丹瀰久瘡屬元氣虛寒蓋氣虛則寒

血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則

寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷寒

戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯酌觀諸

證悉愈若投清脾截瘧多致不起

鬼瘧因感尸疰客忤寒熱口作夢寐不祥多生恐怖宜辟邪丹神朱丹或燒人湯土作丸塞男左女右鼻

瘧方見

疫瘧一方長勾相似或染時行變成寒熱須察運氣用藥宜不換金正氣散寒門如意丹五瘧丹瘧疸丸

瘴瘧挾山溪嵐瘴蒸處之氣令人迷悶發狂或啞作寒熱乍有乍無南万多病此宜變解飲子地龍飲

羌活蒼朮湯瘴瘧九疴方觀音元瘧

痲瘧

者老瘧也以其隔三日一發纏綿不去也綱○三

少陰經瘧也作於寅申巳亥日者取陰經瘧也作

於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗

解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與

參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得

汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到

汗出至足方是佳兆○老瘧係風暑之邪入在

陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻劑恐

非所宜明○若感病極深雖得大汗所感之邪必

自藏傳出至府其發無時必亂而失期若發於午

之後寅之前者血受病也為難愈頃漸趨早亦是

佳兆故治此病春夏為易秋冬為難非有他也以

汗之難易為優劣也明○凡瘧經年不差謂之老

瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛

乃瘧母也雖內虛非常山檳榔決不能除但須製

熟則不損胃老瘧九是也血虛者宜鱉甲丸有水

癖者暫用消癖元以補脾化痰湯藥補之且量虛

實用老瘧飲明○老瘧宜七棗湯鱉甲飲子

參歸鱉甲散秘方清脾九經效瘧丹黃甲丸

散邪湯

治風癰初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘇葉羌活各一錢甘草五分右剉作一

貼入薑三葱白三莖煎

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘草各五

分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

交解飲

治寒癰即雙解飲子也防見

果附湯

治脾寒癰疾面青振寒草果附子炮各二錢半右剉作一貼入薑七棗二水煎服

草果飲

治寒癰草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉甘草各一錢右剉作一貼水煎服

柴胡桂薑湯

治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各

一錢乾薑甘草各八分右剉作一貼水煎服

柴胡知母湯

治熱癰及瘰癧柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘草

草灸七分右剉作一貼入薑三梅二水煎
清晨服午前一服久瘡加入參當歸

爭功散

治熱瘡多效知母貝母柴胡常山
地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作一

貼入桃柳枝各五寸煎服未效
加過路葛藤五寸同煎服

龍虎湯

治熱瘡火盛舌卷唇焦鼻如烟熏六脉洪緊
石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母

黃栢各一錢梔子八分半夏七分粳米百
粒右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柴陳湯

治痰瘡柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤
茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼薑三棗

二水煎服

四獸飲

治七情聚痰五藏氣虛瘡久不已入參白朮
白茯苓陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗

各一錢右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包
罌水浸濕慢火煨香熟取出水煎服未發前連進

數貼即效

冷附湯

五瘧疾無過是痰實而脾胃弱停于胃膈所以

子一箇炮去皮臍右切片二分貼每一貼入

露薑飲

治痰瘧發生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約

初澄者一止飲之或有痰吐任之即安

平陳湯

治食瘧蒼朮半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓

煎服二水

清脾飲

治食瘧柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚

三棗二水煎服此方乃小柴胡平胃二陳合而

為一也一方加常山二錢煎之露服五更截瘧令

小清脾湯

治胃瘧厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑