

繪圖東醫寶鑑

仁和黃俊



上海校經山房石印

卷十三

省中醫藥學會書發

編號 11-189 7/6



訂正東醫鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君 許俊 奉 教授

小兒

小兒病難治

古語曰：聖醫十丈夫，莫醫一婦人。聖醫十婦人，莫醫一小兒。蓋小兒難問，證難察，難治之尤難。如絲脉，息如毫，易虛易實，易冷易熱，兼之口不能言，手不能指，疾痛之莫知，非臆

形察色聽，聲切脉，究其病源，詳其陰陽表裏虛實，而能療之者，蓋亦寡矣。（得效）

臟腑生成

夫一月之孕，有白露之稱。二月之脉，有桃花之譬。及其三月，則先生右腎，而為男。陰包陽也。先生左腎，則為女。陽包陰也。其次腎生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，以生其勝。已者腎屬水，生其勝已者小腸屬火。

為陰，其次心生小腸。小腸生大腸。大腸生胆。胆生胃。胃生膀胱。膀胱生三焦。以生其勝已者小腸。火六府由是為陽。其次三焦生八脉。八脉生十二經。十二經生十二絡。十二絡生一百八十絡。絡生三百六十五骨節。骨節生三百六十五大穴。大穴生八萬四千毛竅。則耳目口鼻百骸之身皆備矣。（醫鑑）

初生解毒法：嬰兒在胎口中，有惡物，免纔生，不候聲出，坐婆急用軟帛裹手，指蘸黃連甘草濃煎汁拭去口

初生解毒法

中惡物，若燕入腹中，必生諸疾。○更以煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中，令嚥下，則一生免瘡痘之患。（得效）○朱蜜嚥下，然後乃飼乳，酌量與之，勿令大飽，恐成吐衄。（良方）○既哺乳，了取黃連甘草煎汁，以綿纏子蘸入兒口，令咽之，三日以來，退惡物，出大便，謂之臍屎。（良方）

初生洗浴法：三朝洗兒，用虎頭骨、桃枝、猪胆、金銀器煎湯洗之，則兒少驚。○尋常澡洗，用猪胆汁入湯中，洗之，即不生瘡疥。（良方）○世俗以為小兒體熱，或遇澡浴，即與久坐湯水之中，風冷外傷，水溼

初生洗浴法

內滲，變成風搐，可不戒之。（直指小兒）

初生斷臍法：予在腹中，胞胎十月止於臍中，與母通氣。雖出胞胎，其臍中所通之氣，猶未盡絕。斷臍之後，招

初生斷臍法

風致病者，有之。其法：初生小兒，綿裹臍帶，離肚五六寸，先用軟綿綳住，腳於線外，將臍咬斷。片

時去線，待血流盡，以手輕輕揉散。父炙臍頭三壯，或五壯，結作紮，給軟帛要裹切，不可常時揭看。待臍根落去，自然無事。（丹心）○初生即將軟綿貼臍根，綳住，待第三日離肚二指許，將臍剪斷，用生薑自

然汁或香油和麪裏臍，四圍於臍頭，以父炙三壯，謂之熏臍，後不招風。（丹心）○先斷臍，兒臍帶可只留二寸許，以線繫定，然後洗浴。不然，則溼氣入腹，必作臍風之疾。（良方）

擇乳母法

凡擇乳母，須精神爽慧，性情和悅，肌肉充肥，無諸疾病，知寒溫之宜，能調節乳食。給汁濃白，則可

之疾(良方)○如陰陽交接之際切不可餓兒於此正謂之交徐必生癖(良方)○徐母不可頻飲酒
恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾(良方)○乳母宜謹節飲食飲食下咽乳汁便通情慾動中乳脈便應病
氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瀉則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛
病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治母安子安可消患於未形也(東垣)○夫飲食之擇應痛
小兒乳母受之厚薄情性之緩急骨相之堅
脆德行之善惡兒能速背尤為關係(東垣)

小兒乳哺法

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月方圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之道不可不
謹(東垣)○凡初乳先須控去宿乳後與之○母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足也○兒啼

未定乳母勿遽以乳飲之恐停滯胸膈而成嘔吐也○乳後不與食哺後不與乳乳食相持則難化
化結於腹中作痛大抵成癖成積成疳皆自此始(得效)○小兒血氣俱盛或食物易消故食無時熱
胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕只與乾柿熟菜白粥非惟無病可以養
德此外生栗味鹹乾柿性涼可為養陰之助然栗大補柿大澀亦宜少與(東垣)

小兒保護法

凡嬰兒肌膚未實若厚衣遇暖則傷皮膚損血脈發瘡瘍汗出腠理不閉風邪易入若天氣和
暖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風寒不致疾病令人懷抱小兒不著地氣致令筋骨緩弱
疾病易生非愛護之道(得效)○夜間不得令兒枕臂須作一二豆袋令兒枕兼左右附之可近乳母

之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰臥恐成驚疾須時時回動之(良方)○天寒時兒用父母常著
舊衣作衣服不可用新綿絹只用舊者若太溫暖則筋骨軟弱易致疾病(良方)○宜用七八十歲老
人舊視舊襖改作小兒衣衾真氣相涵令兒有壽富貴之家切不宜新製絨絨綾羅之類與小兒穿不
惟生病抑且折福(回春)○初生三五月宜繃縛令臥勿
豎頭抱出六個月方可與乳同吃(入門)

養子十法○一要背暖○二要肚暖○三要足暖○四要頭涼○五要心胸涼○六要勿見怪物

調護歌

養子須調護看承莫縱弛○乳多終損胃食壅則傷脾○被
厚非為益衣單正所宜○無風頻見寒暑順天時(入門)

變蒸候

小兒變蒸俗謂之牙生骨長比如蠶之有眠龍之蛻骨虎之轉爪皆同此類變生而長也(醫林)○
情之所由生也蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前向者長生藏府意智故
也何謂三十二日長骨脈添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至

變蒸候

三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心一百二十八日四變二蒸生小
陽一百六十日五變生肝一百九十二日六變三蒸生胆二百二十四日七變生肺二百五十六日八
變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無
形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無
形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無
形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無
形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

變四蒸生大腸二百八十八日九變生脾三百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽三焦無
形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也大倉公云

氣入四肢長碎骨於十變是矣(錢乙)○變蒸既畢兒乃成人也變者變生五藏也蒸者蒸養六腑也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或泄或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上唇中心發白泡狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表之宜用惺惺散(方見下)熱實則微利之宜用紫霜(方見下)或不治亦自愈切不可妄投藥餌及針灸(錢乙)

小兒繼病魘病

母有娠乳兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或發或去取百勞鳥毛帶之一名則即此病也身軀瘰癧名爲魘病(魘音忌小兒鬼病也)用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五次食香熱嚼哺兒亦效伏翼即蝙蝠也(聖惠)○婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳則作鬼病也此病魘亦小兒也其證微微下利寒熱往來毛髮緊整不者是也宜服龍胆湯(三因)

龍膽湯

大黃煨二錢龍胆草柴胡黃芩桔梗鉤藤皮赤芍藥赤茯苓甘草各一錢蟬蛭二個右剉作一貼水一升煮取五合去滓一月內兒服一合十歲以下服二三合得下利即止(千金)

相兒命長短法


凡兒三歲以上十歲以下視其性氣高下即可知其天壽○兒少時識悟通敏過人者多天預知人意回旋敏速者亦天○兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽○初生叫聲連延相屬者壽○聲絕而復揚急者不壽○啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人○臍中無血者好○臍小者偏身軟弱如無骨者汗血者多厄並不壽○鮮白長大卻縫通達黑者並壽○目視不正數動者大非佳兆○早坐早行早語早齒皆惡性不佳人○髮稀小者性強不聽人○額上有旋毛妨父母或早貴○初生枕骨不成能言而死○尻骨不成能跪而死○掌骨不成能匍匐而死○踵骨不成能行而死○臍骨不成能立而死○身不收者死○股間無生肉者死○人中深長者壽○陰不起者死○陰囊下白者死赤者亦死(待效)

虎口三關脈法

初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子(回春)○小兒初生至半歲看額脈一歲至五歲六歲曰嬰孩察三關脈三關在小兒男左手女右手次指內有紅紋似線者爲驗第一節名曰風關無脈則無病有脈則病輕○第二節名曰氣關脈見則病重尚可治○第三節名曰命關脈見則病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死(入門)○第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚

黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風候○第二節紫紋乃驚疳青色紋乃疳傳肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑色紋難安○第三節青黑紋三關通度斜歸指甲則不治(得效)○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫盛作青青或作黑青黑之色至純黑則不可治(入門)○歌曰紫風紅傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃則困脾端(本事)

三關圖




三關在虎口次指之側
第一風關第二氣關第
三命關也決病輕重死生

診小兒脈法

小兒三歲至五歲以一指按掌後人迎氣口之脈常以一息六七至為常（入門）○七歲以上一息五六至為常（入門）○小兒之脈以一指按三部脈而以一息七八至為平十一至十四歲曰童脈○小兒脈亂不須治（不須治藥也）○弦急氣不和○沉緩傷食○促急虛驚○浮為風○沉細為冷（錢乙）○浮緩傷風洪緊傷寒數則為熱遲則為寒（入門）

觀形察色圖



額上屬心火居
南○左頰屬肝
木居東○鼻準
屬脾土居中○
右頰屬肺金居
西○頰下屬腎
水居北

額上屬心火居
南○左頰屬肝
木居東○鼻準
屬脾土居中○
右頰屬肺金居
西○頰下屬腎
水居北

左頰為肝右頰為肺天庭為心地閣為腎準頭為脾凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛○天庭為火色紅主大熱青乃肝風○印堂青者人驚紅白者水大驚紅者痰熱○印堂連準頭紅者三焦積熱○印堂至山根紅者心小腸熱山根至鼻柱紅者心胃熱○鼻居面中為脾紅黃色者無病○脾應唇紅天渴吐利○左太陽青色驚輕紅色傷寒黑青色乳積○右太陽青色驚重紅色風搖眼目黑者死○地閣為腎色青食時驚或煩躁夜啼黃多吐逆紅者腎中氣病兩頤赤者肺熱○山根青黑頻見火兒必死黑色痢疾赤黑色吐瀉黃色霍亂紅色夜啼紫色傷飲食○中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑為驚風惡候亦忌損陷(入門)

面上形證歌

赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停○青脉生於左太陽須驚一度見推詳赤黑傷寒微厥熱黑青知是乳多傷○右邊青脉不須多有則頻驚怎奈何紅赤為風抽眼目黑青三日見閻羅(正傳)

五體以頭為尊一面惟神可恃

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目眈無鋒芒如魚鰕眼或兩眼閉而黑睛朦朧者死或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿

輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或赤者稟弱多病目證內赤者心熱淡紅者心虛熱青者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱也(入門)

聲有輕重啼有乾溼

聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者神驚也聲寒者痰也聲濁沈靜者疳積也如生來不大啼哭聲啾啾者天○火之大發忽然驚叫乃大動氣虛必死夜半發者多有口瘡宜看之(入門)○睡中驚啼聲浮者易治聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治(得效)○直聲往來而無淚者是痛也連聲不絕而多淚者是驚也慈前聲煩躁者難愈躁促聲音者感寒(入門)

小兒初生救急有治法十八條詳見婦人門

噤口撮口臍風證

噤口風者眼閉啼聲漸少舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通此胎中熱毒流於心脾一名鵝口瘡○鵝口瘡小兒初生有白屑滿口如鵝之口鼻外亦有不能吮乳由心脾熱也以亂髮纏指頭蘊薄荷汁拭淨如不脫用保命散朱蓉散(入門)○又法用一捻金散又亂髮纏指頭蘊并花水搽拭之又蘊栗棧煮汁(栗皮也)拭之(湯氏)○辰砂膏最妙(方見下)○又地雞樹木塗之妙(即鼠婦蟲也)

撮口

凡面目黃赤氣喘喘聲不出乃胎熱流毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用白殭蠶二枚略炒為末蜜調付唇口即差或用蝎梢散(入門)○撮口者初生一臘內之篤疾(一臘三七日也)令

上海交經山房石印

兒氣促口撮如囊而不乳也(直指小兒)○治法牛黃一錢竹瀝一合調和時抹口中即差宣風散亦可用(丹心)○撮口證若口出白沫四肢冰冷最為惡候一臘見之尤急(得效)○初生七日內患撮口藥(入門)○小兒口撮不開南星末一錢腦子少許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上口立開(日)

臍風

凡小兒斷臍後為風溼所乘或尿溼綳結遂成臍風面赤喘急啼聲不出其證臍腫突腹脹滿日夜多啼不能飲乳甚則發搐撮口撮口宜用調氣益黃散甚者用金烏散或宣風散(入門)○亦有在胸堂伸引努氣亦令臍腫發風宜千金龍膽湯(入門)○臍風撮口不得飲乳宜蠟梢散(入門)○證手足蹇者亦不治(入門)

臍腫臍瘡治法

臍腫以荊芥煎湯洗淨後取葱葉火上炙過候冷指甲刮薄貼腫處次日便消方服通墨散五通膏香環膏(錢乙)○臍中血水汁出或赤腫痛當歸白石脂末乾蝦蟆燒灰油髮灰皆可付之(入門)○斷臍作瘡白礬枯龍骨煨當歸末皆可搽上或油調付之妙(綱目)

保命散

治鵝口瘡不能吮乳枯白礬朱砂各一錢馬牙硝五錢右為末每取一字用白鵝糞搗水調塗舌上及口內日三次即效(入門)

朱礬散

治同上朱砂白礬枯右等分為細末付口舌上日三(局方)

一捻金散

治同上雄黃三錢鵝砂一錢甘草半錢龍腦少許右為末乾糝或蜜調塗之(丹心)

蠟梢散

治撮口風及一切胎風臍風蠟梢四十九枚每個用生薄荷葉卷定以線扣之砂鍋內滾炒以薄荷乾酥為度再入白礬四十九個薑汁炒乾入腦麝各少許右為細末調勻以紫雄雞肝二片煎湯調下一

字(入門)

宣風散

治臍風撮口多啼不乳口出白沫全蝎二十一箇全者酒炙為末入麝香末一字和勻每取半字以金銀器煎湯調下(丹心)

調氣益黃散

治撮口撮口臍風三錢金頭赤足蜈蚣一條酒浸炙蠟梢四個白礬七個炒瞿麥五分左右為末每一字以鵝翎管吹入鼻中噴嚏啼哭則可治仍用薄荷煎湯調一字服之(錢乙)

金烏散

治臍風金頭赤足蜈蚣半條酒浸炙川烏尖三個生麝香少許右為末每取半字以金銀器煎湯調下(入門)○一名麝香散(得效)○一名定命散(丹心)



通心飲 治旋螺風赤腫而痛清心火通小便退潮熱連翹木通瞿麥梔子仁黃芩甘草各四分
右剉作一服入燈心麥門冬同煎服(得效)○臍中腫突出似旋螺故名之(得效)

栢墨散 治臍風臍腫多啼不能乳哺黃栢末釜下墨亂
髮灰各等分為末乾糝之或油調付之(錢乙)

五通膏 治臍風腫上四圍一指厚抱住下尻泄而愈(醫鑒)
搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消(醫鑒)

香螺膏 治臍風腫硬如盤田螺三個入麝香少許右
搗爛搭臍上須臾再易腫痛立消(醫鑒)

客忤中惡 客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未識見之人觸之或經神廟佛寺與鬼神相得也
謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀鮮雜面變五色腹痛反側惡癢狀似驚癇服石上寶
蘇合香丸(方見氣門)薑湯調化頻與服之次服雄麝散兼用黃土散(得效)○中惡者其狀卒然
腹刺痛悶亂欲死人中青黑即服蘇合香丸未醒以皂角末吹鼻兼用辟邪膏又以唾和麝香一錢
研和醋一合服之即差(錢乙)○客忤取致三合水溼搗為丸雞子大摩兒臍上及足心各五六次

摩臍心及上下良久 中自有毛於路上即擲之(得效)○中
馬汗氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏兒面以差為度(入門)

雄麝散 治客忤雄黃一錢乳香五分麝香一字右為末每一字
刺雄雞冠血調灌之仍以母衣覆兒身即愈(入門)

黃土散 治小兒卒客忤竈心黃土蚯蚓糞各等分
右研細水調塗兒頭上及五心良(得效)

辟邪膏 治小兒中惡降真香白膠香沈香虎頭骨人參鬼箭羽草龍胆各五錢右為末入雄黃五錢
麝香一錢煉蜜和勻作膏取少許以乳香湯化下兒口中又令兒帶及燒卧內尤妙(錢氏)

夜啼 小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰口瘡重舌四曰客忤○寒則腹痛而啼面青白口有冷氣手足
冷腹亦冷曲腰而啼又曰下半夜啼者蓋夜則陰盛寒則作痛所以夜半後啼也宜用六神散益黃散
(方見下)○熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖或有汗仰身而啼又曰上半夜啼者有汗而啼
面赤身熱者必痰熱也到曉方息導赤散(方見五藏)加黃芩煎服通心飲(方見上)亦可○口瘡重
舌則吮乳不得口到乳上即啼身頸皆微熱急取燈照口若無瘡則舌必重也照口瘡重舌類治之其
啼自止○客忤者犯客忤夜啼或觸生人氣忤犯而啼有日啼驚夜必黃昏前後尤甚者乃客忤中惡

也錢氏安神丸主之(方見下)○依客忤法治之○月內夜啼驚搖者乃胎中受驚所致宜用猪乳膏
鎮驚散有痰者抱龍丸(方見下)○小兒夜啼作心經有熱有虛治之宜用燈心散黃連飲蟬花散(網目)

○夜啼不止蟬蛻二七枚去足為末入朱砂末一字蜜調送下(網目)○又法潛取雞窠草一
握置小兒臥席下即止(丹心)○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)

○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)

○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)

○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)

○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)

○初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚皆從此散且無奇疾(入門)



六神散 治腹冷痛夜啼白茯苓白扁豆炒各二錢人參白朮山藥炒各一錢甘草炙七分右為粗末每取一錢入薑三棗二水煎服（得效）

猪乳膏 治胎驚夜啼琥珀防風各一錢朱砂五分為末猪乳汁調一字抹兒口中（入門）

鎮驚散 治同上朱砂牛黃麝香各少許右合細研猪乳汁調稀抹入口令嚥下（回春）

燈心散 治小兒心躁夜啼燈花三四顆研細以燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三〇一名花火膏（正傳）

黃連飲 治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢半甘草炙五分青竹葉十片生薑一片右剉水煎取汁灌口中（丹心）

蟬花散 治小兒夜啼狀若鬼祟蟬殼下半截為末初生兒抄一字薄荷湯入酒少許調下即止或以上半截為末依湯調用啼復如初古人格物之妙如此（永類）

五藏所主虛實證 虛則補其母實則瀉其子必先實母後瀉子也〇凡五藏各至本位即氣或不

心主驚 實則叫哭發熱飲水而搖〇心氣熱則合面臥實則仰臥也蓋實則氣上下遊若合面而臥則氣不得通故喜仰臥使氣得上下通也〇心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水〇心主熱實則煩

肝主風 實則目直視大叫呵欠項急煩悶〇實則兩臂俱伸不轉直視凡目青必發驚咬牙甚者亦發驚

脾主困 實則困睡身熱飲水〇脾病困睡泄瀉不思飲食〇實則多睡體重昏倦困睡不露睛身熱渴欲

肺主喘 實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者〇肺主燥自病則喘嗽實則喘而氣或或渴宜瀉白散（方見五藏）〇虛則哽氣長出氣短〇肺病悶亂哽氣長出氣短虛則唇白色喘而少氣先服滋

白朮散 治肺虛損故也〇脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故曰怯此以唇診

肺藏怯也（錢乙）

黃散 治肺虛損故也〇脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故曰怯此以唇診

肺藏怯也（錢乙）

肺藏怯也（錢乙）

肺藏怯也（錢乙）



腎主虛

無實○腎病目無精光畏明體骨重○腎虛證者兒本虛怯由胎氣不感則神氣不足目中白睛

而致腎虛者非此類也○又腎不足下竅蓋骨重惟欲墜下而身縮也腎者陰也腎氣虛則畏明

補腎六味地黃丸主之(方見五藏)○腎主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無實

變黑陷則是腎實水尅退心火也(錢乙)○腎虛者下竅足熱下竅者骨重惟欲墜下而縮

身也足熱者不喜覆衣也○心氣熱則上竅宜導赤散腎氣虛則下竅宜地黃丸(入門)

五臟相乘

凡五藏自病者為正邪○妻乘夫為微邪○母乘子為虛邪○子乘母為實邪○天克妻為

而謂之餘藏微此(入門)○所謂乘者猶乘車之乘五藏相乘莫測如肝病必先治肺補腎然後

從所勝者為微邪(即妻乘夫也)○從前來者為實邪(即子乘母也)○從後來者為虛邪(即母乘子也)

藏傳變皆痰為患蓋痰乃風苗火靜則伏於脾火動則壅於肺痰火交作則為急驚或成敗瘵瘵火

滯則為癰釣或為咳嗽痰火來去則為瀉青皆由脾淫而成所以驚風忌純用風藥當以養血藥為

古方保元湯加白芍藥為慢驚美劑也(入門)

驚風證

小兒之病急慢驚風與大痘疹等症最為酷疾以其急凶反掌生死須臾故也(正傳)○小兒驚風

三發則為癰乃惡證也(入門)○小兒疾之最危者無越驚風之證驚有急驚慢驚慢脾風三者之

驚(醫鑒)

驚風先見之證

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸而生風也(得效)○驚邪入心則面紅

臉赤惕惕夜啼○驚邪入肝則面目俱青眼睛窺視○驚邪入腎則面黑惡叫噉餘咬牙○

驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏○驚邪入脾則面色淡黃嘔吐不食(直小)○凡乳兒欲發驚風者

先神志不定恍惚懼人○目上視左顧右盼伸手握拳悶鬱努氣情態不如尋常皆驚風先證也(直

小)○咬牙甚者發驚○肝藏實熱手尋衣領亂捻物目直視必發驚○肝有風目連劄不搖有熱則目

驚有四證八候

四證者驚風痰熱也小兒熱盛生痰痰或生驚驚或發搐搐或則牙關緊急而入候生焉

者一搐二擗三掣四顛五反六引七竅八視也搐者兩手伸縮擗者十指開合掣者勢如相撲顛者頭

偏不正反者身仰向後引者臂若開弓竅者目直似怒視者睛露不活(直小)○又云一搐者臂肘搖

縮○二擗者十指開合撮之不已即成握拳男子看大拇指指其指握在外為順在裏為逆女子反看之
○三掣者肩膊搖掣或連身跳起○四顛者或手或脚或頭或身四體顛動○五反者身首反張○六
引者以手有如挽弓狀男左手直右手曲為順右直左曲為逆女子反看之○七竄者眼上竄顧或男
子上竄為順下竄為逆女子反看之○八視者男子斜目視左為順視右為逆視女子反看之○九

驚風大抵熱論虛實證別逆順治有後先
蓋實熱為急驚虛熱為慢驚慢驚本無熱所以執者虛使然爾
急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別
故曰熱論虛實者此也○男搖左視左女搖右視右○男眼上竄女眼下竄○男握拇指出外女握拇
指入裏○男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反女之則逆亦有先握拇指出外而後掣引者但
搖順則無聲搖逆則有聲其指攸形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰掣引逆順者
此也○熱盛生痰痰或生驚驚或生風風或發搖治搖先於截風治風先於治驚治驚先於治痰治痰
先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也(直指)凡搖
因氣鬱氣順則痰化而搖自止先以蘇合香丸(方見氣門)以薄荷湯入薑汁化下或星香散(方見

下門)

驚搖之證有五

驚搖一也而有晨夕之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒
時吐沫者為癇頭目仰視者為天吊角弓反張者為痙治各不同也○因潮熱變為搖在早
晨寅卯辰時者肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸○因潮熱發搖在巳午未時者心旺也
當補肝治心補肝地黃丸治心導赤散涼驚丸(方見下)○因潮熱發搖在申酉戌時者此肺用事之
時也是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散蓋脾病肝強法當補脾恐木賊害故先瀉心肝
以對其強而後補脾○因潮熱發搖在亥子丑時者此腎用事之時也當補脾治心補脾益黃散治心
導赤散涼驚丸(錢乙)

搖掣癱瘓輕重

百日內發搖真者不過兩三次必死假者頻發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋氣
血未實不能勝任乃發搖也欲知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之(方見下)○
(錢乙)○其有搖掣反張斜視而牙關不緊口無痰涎者多是外感或內傷火驚而成謂之假搖非內
生驚癇也宜參蘇飲(方見寒門)人參羌活散(方見下)○入門○搖掣者手足牽引一伸一縮即癱
瘓之甚者也(河間)○問孝忠曰似搖而不甚搖此名癱瘓○凡搖男左女右為順易治男右女左為
逆難治○急驚初則搖掣俱作久而搖住只掣有急有緩但只肩動癱瘓癱瘓者候之輕也搖則盛也
掣又重也

(直小)

驚搖有聲無聲

驚癇發搖男發搖目左視無聲右視有聲女發搖目右視無聲左視有聲相勝故也更有發
時證○又曰男反右視女反左視亦皆有聲(錢氏)○男為水故左視木位無聲右視金位

相擊則有聲女為金故右視金位無聲左視木位有聲相擊故也(易老)○一童子三歲發搐自卯至巳日右視大叫哭錢氏曰此逆也男為陽木發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝係也右肺金也逆則二藏相戰金木相擊而有聲也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝(錢乙)

驚風發搐不可把捉

小兒急驚方搐時不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐時但扶持之投手足握持太急必半身不遂也當其搐時置一竹簾鋪之涼地使兒臥其上任其搐搦勿行通經絡勢極自止不至傷人(子和)○一小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持捉其手足任其搐搦此由北

母保護太過所致乃令淨掃地以水灑之令極溼臥兒于地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以井水洗之即差(子和)

胎驚癇風

此乃孕婦嗜慾忿怒驚撲或傷風邪兒初生下即嘔吐搐掣口眼喎斜驚啼聲短腮縮頭開或紅赤者生青黑者死辰砂膏最妙猪乳膏錢

辰砂膏

治胎驚癇風及嘔口風辰砂三錢玄明粉二錢鵬砂馬牙硝各一錢半全蝎真珠末各一錢麝香一字右為末油紙封裏自然成膏每取一豆許薄荷湯調下或乳汁調塗乳頭上令兒吮之(入門)

太乙散

治胎驚天漿子天南星白附子天麻防風白茯苓各二錢全蝎朱砂各一錢麝香一字右為末每取五分乳汁化下(入門)

急驚風

急驚者因聞大聲或大驚而發搐過則如故此無陰也當下之宜利驚丸○急驚者內有熱即生風或因驚而發涎潮搐搦身熱與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故用藥利下痰熱心神安

寧即愈(錢乙)○急驚乃卒然得之心受驚肝主風致筋脈搐搦肝又主筋宜通心飲(方見上)瀉青丸涼驚丸大青膏(得效)○急驚者因聞不常之聲或遇禽獸之吼以致牙關緊急壯熱涎潮鼠視反

張搐搦顛動口中熱氣煩赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二藏交爭血亂氣併痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蓄盛

而無所泄故暴烈也(直小)○治法通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後急須和胃鎮心○截風定搐先與開關散噁驚散次與驅風膏鎮心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼化風丹靈

神膏痰厥宜抱龍丸截風丸鎮安丸神宜金箔鎮心丸宜心膏○所謂溫驚丸利驚丸亦驚丸者蓋虛則溫之實則利之熱則涼之是謂活法(直小)○驚風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則

又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚丸小驚丸(得效)○急驚先當定搐搐搦由風也風去

熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去

則無風風散則

不搐(直小)

利驚丸 治急驚身熱面赤口中氣熱大小便黃赤宜下用此黑丑頭末五錢天竺黃青黛輕粉各一錢右為末蜜丸豌豆大一歲兒用一丸薄荷湯化下(錢乙)

溫驚丸 治急驚虛證牛胆南星四兩天竺黃一兩朱砂一錢半胭脂半錢龍腦五分右末牛胆汁和丸芡實大砂糖水下○一名粉紅丸(錢乙)

涼驚丸 治急驚風黃連一兩草龍胆防風青黛各三錢龍腦五分牛黃麝香各一字右為末麴糊和丸粟米大每取一二十九金銀泡湯下(錢乙)

瀉青丸 治肝熱急驚搖擲(方見五藏)○一名涼肝丸綠肝主風宜先涼肝而風自退(得效)

大青膏 治急驚風宜用此發散白附子一錢半天麻青黛各一錢烏蛇肉蝎梢各半錢朱砂天竺黃麝香各一字右細末生蜜和成膏月內兒粳米大半歲兒半皂子大一歲兒一皂子大

湯化下(得效)

開關散 治驚風口噤不開蜈蚣一條炙白殭蠶南星炮各一錢麝香一字猪牙皂角三錢略燒存性右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥三兩點於口中涎出自開(得效)

噤驚散 治急驚慢驚昏迷不省半夏生一錢皂角半錢右為末取豆許吹入鼻中即醒(得效)

驅風膏 治肝風發驚搖及胎風辰砂蝎梢當歸草龍胆川芎梔子大黃羌活防風甘草各一錢右為末入麝香少許砂糖和丸芡實大每一丸薄荷竹葉蜜湯化下(丹心)

鎮心丸 治急驚風安心止驚散邪涼膈山藥白茯苓各一兩寒水石甘草炙各七錢半甜硝白者朱砂各五錢人參一錢半龍腦麝香各五分右為末蜜和每二兩作五十九金箔為衣薄荷湯下丸(錢乙)

鎮肝丸 治急驚風熱天竺黃生乾地黃當歸竹葉草龍胆川芎大黃煨羌活防風各二錢半右為末蜜丸芡實大每一丸砂糖水化下(綱目)

錢氏安神丸 治急驚風及心執驚啼麥門冬馬牙硝白茯苓山藥寒水石甘草各五錢朱砂三錢龍腦二字右為末蜜和兩作三十九每服一丸砂糖水化下(得效)

鎮驚丸 治急驚風鎮驚寧神退熱化痰牛胆南星五錢朱砂三錢半琥珀天竺黃雄黃各三錢牛黃二錢真珠一錢麝香半錢金箔十片右為末麴糊和丸梧子大金丹為衣薄荷薑蜜湯下五六丸(正傳)

保幼化風丹 治驚風四證八候去風疾驚熱南星半夏川烏白附子各一兩鬱金五錢右為末裝入臘月黃牛胆內陰乾百日取出研為末每一兩入雄黃朱砂鵬砂焰硝各一錢片腦麝香各少許

共為末蜜丸豌豆大燈心薄荷湯研化下一二丸(醫鑑)

靈神膏 赤茯神朱砂各一兩麥門冬五錢麝香二錢半右為末蜜和作小餅子每一餅臨睡以薄荷湯化下神效○一老醫乃三世小兒科家傳只有四五藥愈病無數如小兒驚搖多是熱證不宜使用



驚風藥只以道赤散(方見五藏)加防風竹葉同煎用
二三貼導去心經邪熱其搐便止次服靈神膏(集驗)

抱龍丸

治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心脾用藥也牛胆製南星一兩無胆星則只取生者剉碎用
治之天竺黃五錢雄黃朱砂各二錢半麝香一錢右為末煮甘草膏和丸皂莢子大

大一溫水化下百日內兒一丸作三次服五歲兒一二丸服臘雪水煮甘草和藥尤佳

截風丸

治驚風痰搐天麻白殭蠶南星炮各二錢蜈蚣一條白附子防風朱砂全
蝎各一錢麝香一字右為末蜜丸梧子大每丸一丸薄荷湯化下(入門)

金箔鎮心丸

治驚風鎮心安神全蝎七個以薄荷葉包裹慢火炙乾天麻防風羌活牛黃各一錢
朱砂麝香甘草各一錢右為末蜜丸皂子大每丸一丸薄荷湯化下(入門)

寧心膏

治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭睡中驚魘朱砂二錢人參白朮白茯苓枝神各一錢
羌活甘草各一錢龍腦麝香各一字右為末蜜丸艾實大以薄荷湯化下一丸(丹)

防風溫膽湯

治驚風消痰疎風順氣半夏枳殼赤茯苓各五分陳皮防風各二分半人參二分甘草
一分半右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚丸小驚丸服之(得效)

大驚丸

治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去皮蚌粉炒甘草炙各五錢人參赤茯苓白朮朱砂各
門冬木香代赭石醋煮各二錢半白殭蠶桔梗尾各一錢二分半全蝎三個金銀箔各三片右為

末蜜丸梧子大金銀箔為衣薄荷湯化
下一二丸一名大安神丸(得效)

小驚丸

治驚風鬱金皂角水浸煮黃連馬牙硝木香檀香草龍胆各二錢半全蝎三個右為
末麪糊和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金銀箔為衣薄荷湯化下一二丸(得效)

急驚風不治證

促噴藥不下通關不噤心中出血兩足攣跳肚腹搐動摸體尋衣神昏氣
促噴藥不下通關不噤心中出血兩足攣跳肚腹搐動摸體尋衣神昏氣

慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘳瘳面色青白渾身
四肢冷默默不聲其脈沈遲用白朮散益黃散加防風冬瓜仁煎服(得效)

筋急宜用黃耆湯溫白丸(正傳)○陰症慢驚自急驚陽症傳來緩經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之
為重女子以吐得之為重○慢驚者眼半開半合似睡不睡十指或開或合似搐不搐口眼手足有

牽掣脈或浮或沈身或涼或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病宜吐瀉得者宜
加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八仙散○慢驚純陰證宜烏蝎散陽證尚在宜蟬蝎散○方

傳慢候而尚有陽證(八候尚在)不必回陽但與截風調胃用蟬蝎散醒脾散若手足冰冷方可回陽
用硫黃附子加腦麝銀粉已硝準一切禁斷(入門)○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄

瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚(直小)○瀉滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土

也○凡兒瀉出青色者由脾土受肝木剋勝而見本色由其藏之虛寒黃者益黃散主之○小兒慢驚或吐利不止變成虛風搖擲者非風也胃氣欲絕故也用來復丹(方見寒門)五粒研碎米飲送下即效(得效)○慢驚宜用溫驚丸神效散觀音散全蝎觀音散三味天漿子散補脾湯保生丹延生丹參朮半夏湯防風丸銀白散(諸方)○誕或宜奪命散(方見下)雙金丸南星飲(諸方)

白朮散 治吐瀉日久不止津液枯竭煩渴引飲欲成慢驚風葛根二錢人參白朮白茯苓木香藿香甘草各一錢右粗末每二錢水煎任意服○泄瀉加山藥白扁豆肉豆蔻已成慢驚加天麻細辛全蝎白附子○驚風泄瀉煩渴皆津液內耗也不問陰陽多煎滿意取足飲之彌多彌好○一名錢氏白朮散(錢乙)一名青寧散(得效)

益黃散 治慢驚風黃者二錢人參陳皮各一錢白芍藥七分甘草炙甘草各五分白茯苓四分黃連一分右粗末水煎時服○一名黃者益黃散凡驚兒瀉青色大禁涼驚丸蓋風木旺必剋脾土當先實其土後瀉其木也當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼使脾土中金旺火衰則風木自虛矣(東垣)

黃芪湯 治慢驚風大便泄青色黃者二錢人參一錢甘草炙五分右作一貼水煎服加白芍藥一錢七炒○此證風木旺必剋脾土宜先實其土後瀉其木是為神治之法○一名保元湯(東垣)

溫白丸 治慢驚風白僵蠶炒白附子生南星炮各一兩天麻生五錢全蝎一錢右為末麩糊和丸菜豆大生薑米飲下五七丸至二三十丸(錢乙)

加味木附湯 治吐瀉後變成慢驚或因藏寒洞泄得者附子炮白朮各一兩肉豆蔻二個木香甘草炙各五錢右粗末每二錢薑三棗二水煎服(入門)

醒脾散 治脾困昏沈吐瀉不止漸成慢驚人參白朮白茯苓白附子白僵蠶天麻木香甘草各五分全蝎二分半右粗末每二錢薑二棗一水煎漸漸服不可頓服(綱目)

釀乳方 治慢驚風人參木香藿香沈香陳皮神麩麥芽各一錢丁香五分右對作一貼入薑五片紫蘇五葉桑三枚同煎乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥雲時次令兒吮數口不可過飽如嘔定急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散

此良法也如此調理無不愈者(湯氏)

八仙散 治慢驚虛風天麻白附子白蛇肉防風南星半夏麩冬瓜仁全蝎各二分半加川烏一分右對作一貼入薑二棗一薄荷二葉同煎服(湯氏)

烏蝎散 治慢驚純陰吐瀉不止四君子湯(方見氣門)加川烏

蟬蝎散 治慢驚風證尚在宜用此藥全蝎七個蟬退二十一個南星一個甘草二分半右粗末每一錢入薑三片棗二枚水煎服(入門)

神效散 治慢驚風○歌曰一粒丁香一個蝎一字辰砂一點血○右三味俱為末男用男左手手中指血女用女右手手中指血蘸藥末擦兒唇上即愈(綱目)



觀音散

治脾胃多瀉不思乳食精神昏困四肢冷欲成慢驚人參一錢蓮肉神麴各二分白茯苓一分半白朮黃耆木香白扁豆甘草各一分右剉入薑二棗一藿香三葉同煎服(入門)

全蝎觀音散

治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風即前方加羌活防風天麻全蝎也(入門)

三味天漿子散

治慢驚風天漿子白蠟蠶全蝎各一分右為末每一字薄荷湯調下(直小)

補脾湯

治慢驚風白朮一錢三分白芍藥酒炒一錢白茯苓半夏各七分陳皮黃耆蜜水炒大棗各五錢川芎肉豆蔻煨乾葛神麴炒各五分黃連炒甘草炙各三分右剉作一貼水煎稍稀服(醫鑑)

保生丹

治慢驚風朱砂天麻白附子炮白蠟蠶炒全蝎微炒各二錢乾薑炮牛黃麝香各一錢右末蜜丸麻子大薄荷湯下三丸(直小)

延生丹

治同上南星炮二錢半朱砂半黃羌活各一錢二分半麝香六分蝎梢七枚白蠟蠶三枚右為末棗肉和丸萊豆大薄荷湯化兩丸服之(直小)

參朮半夏湯

治慢驚風于母俱服人參白朮各二錢半夏天麻各七分白茯苓陳皮各五分細辛薄荷甘草各二分全蝎炒一枚右剉作一貼薑三水煎服(正傳)

防風丸

治慢驚風天麻防風人參各五錢全蝎白蠟蠶甘草各二錢半朱砂雄黃各一錢七分半右為末蜜丸芡實大人參湯或冬瓜仁湯化下(得效)

銀白散

治慢驚風祛風助胃蓮肉白扁豆白茯苓各二錢白附子炮人參天麻全蝎炒木香薑香甘草炒各一錢陳米炒三錢右粗末每二錢入薑二片冬瓜仁七粒同煎服(得效)

南星飲

治慢驚脾困涎盛不思乳食大南星一個炒赤冬瓜仁白扁豆薑汁炒各三錢右為末每二錢以薑二片防風少許同煎服(得效)

雙金丸

治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風金液丹(方見寒門)與青州白丸子方見風門等分同碎生薑米飲調灌之惟多服乃效雖至危者往往死中

得生十救八九沈存中云金液丹治吐利垂絕服之得活須多服方驗(綱目)○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也(入門)

驚風治驗

一見小兒吐瀉諸醫以藥下之至虛變成慢驚其候昏睡露睛手足瘳瘳而身冷錢氏與瓜蒌湯

冷一二日果身冷錢曰不能食而胃虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而難衰也用益黃散(方見五藏)使君子丸(方見本書)四服後果能飲食後又不語諸醫作失音治之

錢曰此音涼藥利小便致脾胃俱虛今脾已實腎尚虛用六味地黃丸一月而痊聲音如故(錢乙)

慢驚風不治證

慢驚四股厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘胃痛鵝聲兩脇動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎頭軟大小便不禁手足一邊牽引者皆不治(醫鑒)○似搐而不甚搐似睡而不

精神慢四肢與口中氣皆冷腫中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也（寶鑑）○
慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸粗大脈來浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復真氣峻
藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺咎之此不
識覆燈將絕之候雖不下藥亦無生理矣（直小）

急慢驚風通治

宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命丹
丹千金散星香散朱粉散奪命散探生散

備急丸

治急慢驚風五月五日取白頸蚯蚓不拘多少去泥焙乾為末加朱砂等分糊丸菜豆大分三服
衣每一丸白湯下○一法取蚯蚓以竹刀中斷之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚者另研爛

和朱砂末作丸菜豆大分二器
貯之記而用之神妙（丹心）

牛黃抱龍丸

治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神牛胆南星一兩天竺黃五錢雄黃辰砂各一錢半麝香
真珠琥珀各一錢牛黃五分金箔十片右細末水煎甘草膏和丸艾實大金箔為衣每三服

兒服一丸五歲二丸十歲服三五丸薄荷湯化下
（醫鑑）○此方與上鎮驚丸同而錢數異（醫鑑）

保命丹

治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰全蠟十四個防風南星蟬退白僵蠶天麻琥珀各二錢
白附子辰砂各一錢麝香五分有熱加牛黃片腦各五分為末粳米飯搗丸皂子大金箔為衣

乳汁或薄荷湯化
下一丸（入門）

千金散

治急慢驚風痰喘雖至死但灌藥下咽即活黃連天麻朱砂各四分全蠟白僵蠶各三分
牛胆南星甘草各二分牛黃龍腦各六釐右為末每用五七釐薄荷燈心湯調下（回春）

星香散

治急慢驚風搖擲驚視涎潮南星炮二錢半木香橘紅各一錢全
蠟二個右剉作一貼薑四片水煎頻灌大便去涎即愈（得效）

朱粉散

治急慢驚風○歌曰一粒朱砂一片雪（輕粉也）七個僵蠶三個蠟不問驚風與慢風服時須用
生人血（乳汁也）○右先將蠶蠟微炒燥取出待冷同砂粉研為細末却以母乳汁調抹於兒口

內立效
十三方

奪命散

大能控風痰不問急慢驚風痰塞咽喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但用此藥
入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也青礞石一兩同煅硝一兩入鍋內火煨待硝盡候礞

石如金色取用右細末急驚風身熱用薄荷汁入蜜調微溫服其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠
粘乃藥之功也次服去風退熱散驚等藥慢驚極危者用此藥以青州白丸子再研為末薑汁調煎如
糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服蛇蝎蜈蚣川烏等藥○此藥治急慢驚利痰之聖藥以器或水吐痰
水上以藥少許糝之痰隨藥而下須用木香湯調下（湯氏）○礞石雖利痰非胃家所好故以木香佐