

卷七

癰症一

顛狂二

瘡症三

痿病四

厥病五

痺病六

虛損勞瘵七

驚悸八

三消九

自汗十

盜汗十一

白濁夢遺十二

小便不通十三

淋病十四

訂補明醫指掌卷之七

弋和雲洲皇甫中編輯

張洲念山邵從臯訂補

李繩山邵達校閱

癰症一

歌牛馬豬羊雞五癰治須尋火與尋痰更將痰火分
多少識得樞機總不難

論夫癰有五馬癰則張口搖頭馬鳴牛癰則目正直
視腹脹猪癰則喜吐沫羊癰則揚目吐舌雞癰則
搖頭反折善驚蓋以其形之類而名之也古者既

有五癇之名治無分別槩用香竈鎮墜之藥殊爲未當丹溪云癇病蓋因痰涎壅盛迷瞞孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胸背強直叫吼吐沫食頃乃甦大率屬痰與火法當尋火尋痰分多分少治之亦有因驚而得者驚則神不守舍含空而痰聚也宜以行痰爲主佐以定悸寧心安神可也彼香竈燥劑寧不助火耗氣乎

○癇

痰者動則有聲脉滑涎沫出必得吐後用安神太夫率以行痰爲主二陳湯加南星瓜蔞黃連

方見痰症

安神丸 治癰癧 黃連

一兩五錢酒製

硃砂冰麝

生地黃

一兩當歸

一兩酒洗

甘草

五錢五錢

蜜丸

○火

火者有熱面赤脈散大抵肥人痰多瘦人火多宜

吐後用平肝青黛黃連川芎柴胡或寧神丹

寧神丹

治火盛癆症

天麻五錢

人參五錢

去皮陳皮五錢

白朮

五錢炒

當歸身

五錢

白茯苓五錢

殼蠶五錢

獨活五錢

遠志五錢

去心犀角五錢

麥門冬

一兩

棗仁五錢

辰砂五錢另研

半夏一兩

南星一兩

石膏一兩

甘草五錢

三錢

白附子三錢

川芎三錢牛黃三錢珍珠三錢生地黃五錢

黃連五錢金箔三十片酒丸空心白湯下五十九

○驚

因驚而得者則神不守舍空痰聚必先行痰亦
用吐痰吐後安神丸方見前或三癇丸

三癇丸

治一切驚癇

荆芥穗

枳白朮

一兩半生半枯

硃砂爲衣

○○○顛狂症二

歌譜言歌走忽踰墻妄目稱尊號曰狂顛者身僵心
不樂須知二症有陰陽

論夫狂者陽症其狀少臥而不飢妄言歌笑踰垣上

屋棄衣奔走自高賢也自貴倨也自辨智也顛者
陰症其狀僵仆直視意不樂是也丹溪云大率多
因痰結于心胸間治當鎮心神間結痰有中邪而
得者以治邪法治之蓋陽虛陰實則顛陰虛陽實
則狂扁鵲云重陰者顛重陽者狂故顛狂二症陰
陽之不同也

脉顛癇之症陽浮陰沉數熱滑痰狂發于心驚風肝
癇弦急可尋浮病腑淺沉病臟深○顛脈搏大滑
者庄沉小緊急者不治狂脈實大者生沉小者死
顛脈虛可治實則死

○顛症

顛者神不守舍顛狂如有所見經年不愈心經有
損是爲真病若悲哭呻吟爲邪所憑者非狂也用
贊故器一味燒於好酒調服二錢顛風麻仁湯顛
疾失心者宜助心氣用靈苑方

顛風麻仁湯

麻仁四升水六升猛火煮七合服

靈苑方

助心氣

硃砂一兩

研

棗仁半兩

炒研

乳香半兩

研

右作一服溫酒下以醉爲度勿令吐服後便令睡
待其自醒則神魂安矣萬一驚觸不可復治

○狂症

狂邪者發作無時披頭大叫踰坦上屋不避水火
棄衣奔走欲殺人苦參丸卒狂妄言者針大拇指
甲上去一韭葉許大抵狂病宜大吐下則可愈大

黃一物湯

苦參丸

治狂邪苦參多少蜜丸薄荷湯下五十丸

大黃一物湯 大黃四兩酒浸一宿水三升煎之分三服必

數日後方可與食但得寧靜方為吉兆不可見其
瘦弱減食便以溫藥補之及以飲食飽之病必再
作戒之戒之後與之食方為得體故曰損其穀氣
則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也

○孩前二症必有所因或因大怒動其肝風或因大驚動其心火或素有痰竢爲火升升而不降壅塞心竊神明不得出入主宰失其號令心反爲痰所役一時發越若踰垣上屋持刃殺人裸體罵詈不避親疎飛奔疾走如水如陸者此肝氣大旺木來乘心名之曰狂又謂之太顛法當抑肝鎮心降龍丹主之若撫掌大笑語言不倫左顧右盼如見鬼神片時正性復明深爲赧悔少頃而狀態如故者此爲上隔頑痰泛濫洋溢塞其道路心爲之碍壅少降則正性復明痰復升則又發名之曰顛去當

利肺安心安神涼疾丸主之

降龍丹

抑肝
鎮心

黑鉛

一兩鎔開投水銀一兩不住手

炒炒至成粉爲度名目銀砂

五錢人

目銀砂

五錢人

目銀砂

硃砂

五錢

蛇含石

五錢人

內煅過

金箔

五百

金箔

五百

銀箔片五百研細丸如芡實大每服三九枚神湯磨化下

安神滾痰丸

礞石

一兩

風化硝

一兩

硃砂

一兩

沉香五錢珍珠五錢共末煎大麻膏丸如芡實

大每服三丸薑汁竹遜調下

80 痘症一

歌痘本非風溼上求有無汗症見剛柔角弓口噤如

風狀燥劑教君勿妄投

論仲景云太陽病發熱脈沉而遲曰癰傷寒發汗過多因致痘大發溼家汗亦成痘瘡家發汗亦成痘產後去血過多亦成痘其痘身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張者是也有汗曰柔痘無汗曰剛痘剛痘屬陽柔痘屬陰丹溪云痘屬太陰溼土故經云諸痘強直皆屬于濕蓋溼土過極反兼風化制之然兼化者虛象而實非風也切不可槩作風治而用燥藥大率屬氣虛亦有火兼瘀著宜辨之若身涼手足冷脉

沉細者爲陰瘡若口眼牽扯手足戰搖伸縮者爲
風瘡若發熱喘嗽生痰爲痰火宜隨症治之若日
瞪口開昏冒不知人者不治並用如聖飲加減治
之

如聖飲 治剛柔二瘡與瘰癰同治法

羌活

上

防風

中

川芎

中

白芷

中

柴胡

中

芍藥

中

人參

中

當歸

中

甘草

中

半夏

下

黃芩

中

烏藥

中

右用水二盞薑三片煎一盞入薑汁竹瀝溫服○
有汗曰柔症加白朮杜枝○無汗曰剛症加蒼朮

麻黃或加葛根亦可○痰多加貝母瓜蒌枳實紫
蘇子○火盛加山梔仁麥門冬花粉去川芎柴胡
烏藥半夏羌活防風白芷○如口噤咬牙大便實
者加大黃利之○產後去血過多成症者加黃芪
熟地黃

88 厥症四

歌厥形有六要消詳痰氣尸竈陰其陽故使四肢成
厥逆陰陽虛實各分張

論夫陰厥者始因泄利身寒厥冷足踰臥唇口青自
利溲白不渴脉遲陽厥者身熱四肢厥逆大小便

門澀脉數熱極反厥也。瘓厥者寒瘞迷悶心胸隱道不行四肢厥冷僵仆卒倒不知人事厥者氣暴逆也。故卒然厥逆不知人僵仆身冷。蛇厥者冒寒就蟲攻胃手足厥冷吐蛇尸厥者冒犯不正之氣忽然手足厥冷。腹膚起粟頭面青黑或妄言或口禁昏曠不知人或因弔喪問病人廁登塚而得丹溪云有因氣而厥者身冷脈伏有血虛而厥者因血大損故也。脉必芤澀有因痰滯而厥者口中流涎昏不知人脉沉滑有氣虛而厥者有所勞傷氣弱不能運行故也。凡此之類在乎細辨之。

○陰陽厥

陰厥理中湯重者四逆湯。見中寒一方俱外炎門元穴五十壯。陽厥四逆散大便閉熱極反厥。大承氣湯下之。

方見傷食

四逆散

治陽厥輕者

甘艸
炙

枳殼
炒

一錢

柴胡
一錢

一錢

○氣血厥

芍藥
炒

一錢

剉一貼

水二鍾煎八分不拘時服。

○氣厥

氣厥。四七湯調氣散。六味順氣散

方見氣虛

蘇合香丸

白薇湯。

方見氣虛

婦人血厥。倉公散。

白薇湯。

倉公散。

治血厥

瓜蒂一錢

藜蘆一錢

礬石

飛一錢

倉公散

治血厥

瓜蒂一錢

藜蘆一錢

礬石

飛一錢

雄黃 一錢 末之每用少許吹鼻中取嚏

白薇湯

治血厥

白薇 三錢

當歸 三錢

人參 一錢

甘艸 分七劑

一貼水二盞煎一盞溫服。

○蛇厥

蛇厥理中湯加檳榔川椒煎吞烏梅丸

方一見
中寒一見

心痛不正用烏梅川椒黃蘖煎服蓋蛇聞酸苦則安

○戶厥

戶厥蘇合香丸

方見類中風症

調氣散

方見氣症

或追冤湯

追冤湯

治卒厥不知人

麻黃

大節

杏仁

二十粒

生甘艸

一錢

煎服

○痰厥

瘓厥昏門不醒稀涎散

方見

中風導痰湯

方見

瘓症

80 痰症五

歌諸痿多因肺熱生。故云痿獨取陽明。分明自是膏梁疾。勿認爲風浪立名。

論夫痿有五。筋骨肉痿蹠是也。古方多以治風之藥通治痿。何其謬也。至丹溪始辨之。以風痿二症另立篇目。源流不同。治法迥別。此開千古之弊也。丹溪云。內經謂諸痿起于肺熱。又謂治痿獨取陽明。蓋肺金體燥居上而主氣。畏火者也。脾土土溼居中央主四肢畏木者也。火性炎上。若嗜欲無節。