

脱肛

有寒有熱久瀉脾氣下陷者。補以升之。○瀉痢
後虛脱脈兼無力倦怠者。八珍十全選用。○赤
腫作痛。屬大腸風熱。生地赤芍槐花槐角升麻。
腸胃燥澀。大便秘結。努瀆太過。因而脱肛。宜涼
補以潤之。外用收肛散塗之良。

熊膽五分 孩兒茶
冰片 乳調塗肛上。

丹溪治久瀉脱肛。參苓白朮散。加升柴五味子。

○用力過多者。十全大補湯。加升提。○大腸虛

脫肛

而挾熱礪砂湯槐花散薄荷散○大腸虛而挾
寒。蝟皮散。香荊散。日久不上。收腸養血和氣
湯。濕脫龍骨散。濕腸散。

無火症瀉久脾虛舉肛丸加減

舉肛丸

半夏 天南星 枯白礬各五錢 雞冠花炒

白附子各五兩 枳殼 訶子肉煨 黑附子各

蝟皮二枚 瓜蒌二枚燒 胡桃仁十五個
炙 存性 燒存性

共為末醋糊丸空心溫酒下三十丸

系荆散

系附 荆芥 一方加砂仁

每用三錢食前白湯下

又方

五倍子末三錢 白礬二塊

水煎洗

○葱湯洗軟芭蕉葉托上

又方

木賊草燒灰搽肛門輕輕按上或加龍骨

又方

脱肛

蔓陀羅花連殼一對橡斗十六個搗碎水

煎三五沸入朴硝熬洗其脱自上

內用槐花槐角子等分炒黃色以羊血蘸藥炙
熟食之以酒送下

蛻皮散

蛻皮

乙具燒
存性

磁石

煅醋淬
七次

桂心三錢

鼈頭

乙枚炙黃

右為末每食前米飲下三錢

收腸養血和氣丸治脱肛日久腸虛大腸不時

脱

白朮

當歸

白芍

各二兩

川芎

槐角

炒

山藥

各八錢

蓮肉

乙兩

人參

七錢

龍骨

煨

五倍子

赤石脂

各五錢

右末米糊丸桐子大每飲下七十丸

龍骨散

治大腸虛肛門脫出

龍骨

訶子

各五錢半

沒石子

二枚

栗殼

赤石脂

各五錢

為末

每服

乙錢

米湯下

潤腸散

治久痢

大腸脫

脱肛

訶子 赤石脂 龍骨各等分

右為末茶調搽腸頭上絹帛揉入

參朮芎歸湯 治瀉痢後及產育氣虛脱肛脈

濡而弦者即補中益氣湯去紫胡加白芍川

芎白茯苓生薑煎服

○參朮實脾湯 治久瀉滑肛

白朮 人參各錢貳 肉果麴色煨 白茯苓

白芍 陳皮各錢貳 甘草炙七分

水二鍾薑三片棗二枚煎服

經云出為虛入為實肛門之脫非虛而何

老人產育小兒久痢瀉後元氣下陷肛門脫出

悉屬虛大劑參朮芪草加製升麻柴胡

用力過多而脫者十全大補湯外以葱湯洗軟

芭蕉葉托上

如脈弦數大腸有熱而脫者必赤腫涼血祛風

為主涼血清腸散

氣血虛而挾熱者八珍湯加生地赤芍槐角槐
花黃芩萎雞冠花疎風防風羌活荆芥外用五

脫肛

倍子朴硝煎湯飲之。木賊燒存性入麝少許。搽之。腫痛用蝸牛加冰片點之。熊膽冰片亦妙。鼈頭燒灰塗。

穀道癢痛

痒痛多因濕熱生蟲。欲成痔瘻。宜以雄黃和艾燒烟熏之。並納蜣螂丸。此丸專治肛門痒痛。或出膿血。有虫。傍有孔竅。用蜣螂七箇。五月五日收去翅足。炙為末。新牛屎半兩。肥羊肉二兩。炒令香。右共膏丸如蓮子大。炙令熟。以新綿薄裹。

納下部。半日少喫飯。俟大便中有蟲。三五度瘥。

穀道蟲赤腫或痒或痛。用杏仁外臺治下部

蟲。杵桃葉一斛。蒸之。令極熱。內小口器中。坐定。

熏之。蟲立死。

肛門腫痛。用水蠶子肉四五枚。研泥。沸湯泡洗。

另用少許塗患處。

診蟲陰脫其脈虛小者生。緊急者死。

痔瘡蟲蟲作痒。槐白皮濃煎汁浸之。冷再換良。

久欲大便當有蟲出。

脫肛

或用水銀麝香各二兩研勻捏如棗形綿裹納
之明日蟲出

汗

○平人無分晝夜。不因飲食熱湯。自然汗出者。為自汗。屬陽氣虛。腠理不密。心火盛所致。謂心熱則出汗也。肥白人宜補中益氣。倍參芪朮。加白芍酸以收之。汗多則亡陽。

○陰虛陽必湊。故發熱而自汗。當歸六黃湯加地骨皮。○陽虛陰必乘。發厥而自汗。黃芪建中湯。甚者加附子。或芪附湯。瘦人脈弦數。血虛有火。宜補陰降火。○火氣炎

汗

上。胃中之濕。不能作汗。可用涼膈散。○有氣不順。而自汗不止。須理氣。使榮衛調和。小建中湯加木香。○睡中汗出。覺則止。乃盜汗。屬陰虛。○黃湯最妙。亦有酒客多火人。睡中汗多者。亦宜滋陰。除濕解熱。

平人脈弱虛微細者。喜盜汗出也。汗多氣血傷故脈濡弱若

不汗出是逆也故云喜

睡醒時。別處無汗。獨心口一片。時心悸者。名心汗。屬心虛。多思慮所致。宜養心甯神。古方用艾

暑

煎湯調茯苓乙錢服不若補心丹○一方用人
參者歸身也。獷猪心一個帶血割開入參歸。縫
煮熟去藥吃○脾胃不和又挾外濕身重汗出
煩躁羌活勝濕湯主之○兩陰汗屬下焦濕熱
龍膽瀉肝湯加風藥風能勝濕也當用當歸龍
蒼丸及二妙丸殊效外用蜜陀僧研極細加蛤
粉撲炒傷暑傷風傷濕濕溫風溫吐瀉俱有汗
宜憑脈并兼症。

一切內傷虛損自汗不止。總用補中益氣湯少

汗

加麻黃根製附子浮麥為嚮導。其效必影響。但升柴須用蜜炙以制其升散慄悍之性。又欲其引參芪至表。殊不可缺。○脾胃素弱。食不運化。滯于中宮。蒸蒸出汗。氣口多弦滑。只消導健脾。不必止汗。

兩寸浮洪而自汗者。心火炎也。本方倍參芪。加五味子黃連各五。○兩關脈絛而自汗者。挾風邪也。本方加桂枝芍藥。若不陰虛。只用桂枝湯。寸關浮洪無力而自汗者。只宜本方倍參朮。

兩尺洪大無力而自汗者。相火挾火心之勢而
尅肺金也。當歸六黃湯。

當歸六黃湯 治盜汗陰虛藥也

黃柏 黃連 黃芩 生地黃 熟地黃

黃芪 當歸 加麻黃根或浮麥

水煎服

麻黃根 桂枝 浮小麥 俱能調和榮衛

又引諸藥至肌表所以能止汗也

牡蠣 白芍 五味子 乃酸以收之之義

玉屏風散

汗

黃芪配白朮配防風配加浮麥 茯神

牡蠣 麻黃根 按黃芪畏防風得防風

而功愈大蓋相畏而相使也製方之妙乃

此

一人氣血俱虛身羸大汗以十全大補湯倍參
芪加製過附子一片一服知二服已

獨勝散方專治盜汗用五倍子末調津液調填

滿臍中以絹縛定加枯礬最效

火氣上炎蒸胃中之濕不能作汗涼膈散主之
氣虛自汗用參芪少佐桂枝陽虛附子各可凡
痰病亦有汗

滑伯仁治一婦暑月自汗口乾煩躁欲卧泥水
中脈浮而數按之豁然虛散素問曰脈至而從
按之不鼓諸陽皆然乃陰盛格陽得之食生冷
乘涼所致以真武湯冷飲之一進汗止再進躁
去三進全安

東垣曰飲酒中風多汗食即汗出如油久不治