

仲景傷寒補亡論卷第十九

河南郭雍撰次

婦人傷寒證十八條

妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條

小兒瘡疹上四十七條

婦人傷寒十八條

問曰婦人傷寒何如活人書曰男子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血氣凝結則水火相刑



傷寒氣口緊盛則宜下人迎緊盛則宜汗婦人左關脈浮緊不可下當發其汗以救血室營衛得和津液自通浹然汗出而解

問曰熱入血室何如活人書曰仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也小柴胡湯主之若行湯遲則熱入胃令津液枯燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當針期門

問曰譫語卽下症而前症不可下何也活人書曰傷

寒胃實譫語則宜下婦人熱人血室譫語不可下也
問曰犯胃氣者何如活人書曰五行相剋以生相扶
以出平居之日水常養木木相生則榮養血室血
室不畜則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生若犯胃
氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便利者屬抵當湯

問曰婦人先調血男子先調氣何如活人書曰此大
略之言耳要之脈緊無汗爲傷寒脈緩有汗爲傷風
熱病脈洪大中暑脈細弱其症一也假如中暍者用
白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯哉仲景傷寒

所以不分婦人良亦由此學者皆可隨病于男子藥
症中以意選用也

活人書曰婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾
經脈凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

又曰婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食宜黃芩芍
藥湯

又曰婦人傷寒喘息煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不
可下宜柴胡當歸湯

又曰婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼

宜乾薑柴胡湯

又曰婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可近海蛤散
朱氏又言婦人血結胸證法當刺期門仲景無藥此
方疑非仲景意又云婦人傷寒發熱經水適來晝日
明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃
氣及上二焦宜小柴胡湯
又曰婦人傷寒七八日續得寒熱發作有時經水適
斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀宜小柴胡
湯



又曰婦人傷寒發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲身涼和胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之

又曰婦人傷寒六七日胃中有燥糞大便難煩躁譫

語目赤毒氣閉塞不得通宜三黃瀉心湯

原本是瀉心三黃湯

又曰婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱宜乾地黃湯

又曰婦人傷寒未平復因交合裏急腰胯連腹內痛名陰陽易宜燒裊散

又曰婦人病未平復因有所動致熱氣上沖胸手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯

又曰婦人病未平復因有所動小腹急痛腰胯痛四肢不任舉動無力發熱者宜當歸白朮湯

娠婦傷寒三十三條

活人書曰娠婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦人一概論治也

又曰婦人妊娠傷寒藥性須涼切不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋爲娠婦而去

也大抵產前先安胎產後先補血次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此爲大法黃帝問婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

千金方治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼石膏前胡湯七味

又治妊娠傷寒頭疼壯熱心煩嘔吐不可食生蘆根湯四味

又治妊娠傷寒服湯後頭疼壯熱不歇宜用竹葉石

膏湯拭其身

又治妊娠熱病慙白五兩豉一升煮服取汗

又曰大熱煩悶者葛根汁二升分三服如人行五里進一服

活人書妊娠婦傷寒安胎宜阿膠散又宜白朮散

龐氏曰妊娠時氣欲令子不落宜用護胎伏龍肝散
伏龍肝爲末水調敷臍中乾卽易之疾差乃止

又曰妊娠傷寒內熱極甚令不傷胎宜取雞子以絹
袋貯投井底浸令極冷旋破吞六七枚佳

又曰妊娠傷寒大熱甚胎不安者宜用阿膠末一錢半竹瀝調下如無竹瀝用小麥竹葉煎湯調下

又曰妊娠傷寒服汗下諸藥熱已退其間與此藥安胎宜服人參黃芪湯

活人書曰妊娠傷寒憎寒發熱發其汗宜葱白湯以

白生薑同煎連服取汗

又曰妊娠傷寒頭疼壯熱肢節痛疼宜服前胡湯干

金方

又曰妊娠傷寒或時行灑淅作寒振慄而悸或加噦

宜蘇木湯雍曰蘇木大破血更宜參究避之

又曰妊娠傷寒頭疼默默不欲飲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解宜黃龍湯

又曰妊娠傷寒頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急唇口乾燥宜柴胡石膏湯

又曰妊婦傷寒四日至六日已來加心腹脹上氣渴不止飲食不多腰疼體重宜三物枳實湯

又曰妊婦傷寒頭目疼壯熱心煩宜旋覆花湯



又曰妊娠傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安
宜麥冬湯

又曰妊婦發斑變爲黑色宜梔子大青湯

龐氏曰妊娠傷寒腹脹大便不通喘急宜牽牛散

卷十

活人書曰婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒
時時有熱心下堅乾嘔汗出宜陽旦湯

又曰婦人產後傷風發熱面赤喘而頭疼竹葉防風

湯



又曰婦人蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯
頭不疼但煩與三物黃芩湯

龐氏曰妊娠熱病胎死腹中用鹿角屑一兩水

葱白五莖豉半合煎六分去滓溫作二服又方益母

絞汁飲半升卽出

又曰傷寒小產惡露不行腹脹滿悶欲死宜大黃桃
仁湯

又曰小產後惡露被熱蒸斷不行宜地黃飲生地黃
藕汁各一碗生薑汁一盞和勻溫服分作三四次服

微有寒者煎二十沸服亦下死胎

又曰傷寒產後血暈欲絕宜紅花散

又曰凡傷寒小產夏月宜少用醋炭多有煩悶暈死

者雍曰寒月用炭多

又曰傷寒產後惡血沖心悶亂口乾生薑小便飲子

生地黃汁薄汁小便各一盞和勻煎二三沸分三服

又曰傷寒產後惡露爲熱搏不下煩悶脹喘狂言者

抵當湯及桃仁承氣湯主之

又曰傷寒小產煩悶大燥渴石膏湯主之



小兒傷寒十九條

千金方論曰小兒未能涉冒霜雪乃不病傷寒也然
天行非節之氣其亦得之有如行瘟之年小兒出腹
患斑者治其時行節度故如大人之法但用藥分劑
少異藥少冷耳

又曰治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥冬湯
又曰治小小傷寒芍藥四物解肌湯

又曰治小小傷寒發熱欬嗽頭面熱者麻黃湯

活人書減

桂半兩加石膏
名石膏麻桂湯

又曰治小兒傷寒以葛根汁淡竹瀝各六合二味相和二三歲兒分三服百日兒酌服不宜生煮服佳
又曰治小兒時氣枇杷葉三兩搗以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之若復發熱燒雄鼠屎二三枚用水調服之

又曰治小兒傷寒久不除差後復劇瘦瘠骨立五味子湯

又曰治小小傷寒宜莽草湯治之避眼與陰

又曰小兒傷寒發黃者搗土瓜根汁三合服之又曰

搗青麥汁服之又曰韭根汁澄清滴兒鼻中如大豆
許卽出黃水差

又曰小豆二七粒瓜蒂二七枚糯米四十粒以少許
吹鼻中

活人書論小兒傷寒曰治法與大人同但小分劑藥
性差涼耳尋常風壅發熱痰嗽煩渴惺惺散主之咽
喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯主之頭額身體溫熱大
便黃赤腹中有熱四順散連翹散三黃丸主之頭額
身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙丸主之