

# 濟陰綱目

卷五至

卷七

<sup>五</sup>積聚癥瘕

通治諸積

分治八癥

治癥痞方

治食癥方

治血癥方

腹中瘀血

治瘕癖方

治疝瘕方

<sup>六</sup>求子

血虛不孕方

宮冷不孕

痰塞不孕

婢妾不孕

附婦人  
結痰

煮附方

斷子方

<sup>七</sup>浮腫

治方

前陰諸疾論

陰戶腫痛

陰痒生蟲

陰戶生瘡

治陰痔方

陰挺下脫

治陰冷方

交接出血作痛

傷丈夫頭痛方

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生闡風父輯著

錢時 查學淳用拙父訂正

西陵 汪 淇懔漪子箋釋 天都 查 望 周父叅閱

積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

外有腸覃石  
瘕瘕瘕三症  
亦當與此條  
參看

按七門之中  
而瘕有八其  
疝氣或聚或  
散瘕瘕之與  
痛俱見不痛  
則隱亦可與  
瘕並稱則八  
瘕之外又有  
三積矣又男

準繩云大全良方分瘕瘕諸氣。疝瘕八瘕。腹中瘀血瘕。痞食瘕。血瘕。凡七門。瘕者在腹內。近臍左右。各有一條筋脈急痛大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰瘕。瘕者僻在兩肋之間。有時而痛。故名曰瘕。瘕者痛也。瘕者假也。其結聚浮假而痛。推移乃動也。八瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。鼈瘕。積在腹內。或腸胃之間。與臟氣結搏堅牢。雖推之不移。名曰瘕。言其病形可。

子爲七疝女爲瘕則疝與瘕亦可同經

男與女亦有同病是瘕不止于八也瘕

一瘕二曰血曰食而不言及痰飲何也

蓋瘕氣之中未嘗無飲而血瘕食瘕之內未嘗無痰

則痰食血又未有不先因氣而爲瘕之

故消積之中當兼行氣消痰消瘕之藥

爲是

徵驗也氣壅塞爲瘕言其氣痞塞不宜暢也傷食成塊堅而不移

名曰食瘕瘀血成塊堅而不移名曰血瘕若夫腹中瘀血則積而

未堅未至於成塊者也大抵以推之不動爲瘕推之動爲瘕也至

夫疝與疝瘕則與痛俱痛卽現不痛卽隱在臍左右爲疝在兩肋

之間爲瘕在小腹而牽引腰脇爲疝恐學者一時難了未免淆亂

故總叙而條析之

○論婦人八瘕所因

病源曰八瘕者皆胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也

腎爲陰主開閉左爲胞門右爲子戶主定月水生子之道胞門子

戶主子精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持開元禁閉子精臍下三寸名曰閔元主臟魂魄婦人之胞三焦之府常所從止

然婦人經脈俞絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來八合於臟若生血未盡而合陰陽即使婦人血脈攣急小腹重急支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血不除月水不時或月前月後因生積聚如懷胎狀邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫內生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也

黃瘦者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寢未定五臟六腑虛羸精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上八於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘦黃瘦之聚令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得抑若

腰背相引痛。月水不利。令人不產。小腹急下。引陰中如刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。令人無子。當刺關元氣。衡行以毒藥。瘕下卽愈。

青瘕者。婦人新產未滿十日。起行以浣。洗太早。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內臟吸吸。又當風臥。不自隱蔽。若居濕席。令人苦寒。洒洒入腹。煩悶沉淖。惡血不除。結熱不得散。則生青瘕。聚在左右脇下。藏於背脊上。與肩脾腰下攣急。腹下有氣起。喜睡不可多食。四肢不欲動。揺手足腫。面自黃。大小便難。其後月水爲之不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法。瘕當下卽愈。

燥瘕者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月熱行疾步。若

舉重移輕。汗出交流。氣血未平。而卒以恚怒。致腹中猥咽。不洩。經  
脈變急。內結不舒。煩懣少力。氣上達胸膈。背脊少腹壅急。月水與  
氣俱不通利。而反以飲清快心。月水橫流。溢入他臟。不去。有熱則  
生燥。瘕之聚。大如半杯。上下腹中苦痛。連兩脇。下上引心。而煩害  
飲食。欲嘔吐。胸及腹中不得太息。腰背重。喜臥盜汗。足瘦削。久立  
而痛。小便失時。忽然自出。若失精。月水閉塞。大便澁難。病如此者。  
其人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行。以毒藥。瘕當下即愈。

血瘕者。婦人月水新下。未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。  
溢入他臟。若大饑寒。吸吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左  
右走。腸胃之間。留絡不去。內有寒熱。與月水合。會爲血瘕之聚。令  
腰痛。不可俛仰。橫骨下有積氣。牢如石。小腹裏急。苦痛。背脊疼。溺

達腰腹下。攣陰裏。若生風冷。子門僻。月水不時。乍來乍不來。此病令人無子。療之。痕當下卽愈。

脂痕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。以合陰陽。絡脈分胞。門傷。子戶失禁。關節散。五臟六腑。津液流行。陰道蠕動。百脈闢。樞四解。外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁。子精化不足。成子則爲脂。痕之聚。令人支滿裏急。痺引少腹。重腰背如刺狀。四肢不舉。飲食不甘。臥不安席。左右走腹中切痛。時瘥時甚。或時少氣頭眩。身體解。併苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。如此者。令人無子。療之。當刺以長鍼。行以毒藥。痕當下卽愈。

脈痕者。婦人月水當日數來。而反悲哀憂恐。若似遠行。逢暴風疾。雷雨驚恐。衣被沉濕。罷倦少氣。心中恍惚未定。四肢懈倚振疾。

苦寤寐氣絕精神游亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚食入子臟令人月水閉不通少腹瘀滯胸膈腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男精不藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢不舉本此病者終身無子其瘕有手足成形者殺人未成者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈

蛇瘕者婦人月水已下新止適閉未復胞門子戶勞傷陰陽未平榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未調若起行當風及涉泥塗因衝寒大早若坐濕地名陰陽亂腹中虛若遠行道路飲汗井之水食不潔之食吞蛇風之精留絡不去因生蛇瘕之聚上食心肝長大其形如漆在臍上下還疔左右脇不得吐氣兩股脛間苦疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中變急腰目俱痛難以動作喜發

寒熱月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者殺人。未成者可治療。之有法。行以毒藥。瘕當下卽愈。

鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。踈立未安。顏色未平。復見所好。心爲之開。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守水精。與邪氣俱入。至三焦之中。幕玉門先閉。津液妄行。留絡不去。因生鼈瘕之聚。大如小杵。令人小腹內切痛。惡氣左右走上。下腹中苦痛。若存若亡。持之躍。手下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人。未成者可治療。有法度。以長針按瘕之行。以毒藥瘕當下卽愈。

○論婦人癥瘕

大全云婦人癥瘕。由飲食失節。脾胃虧損。邪正相搏。積於腹中。牢固不動。有可徵驗。故名曰癥。氣道壅塞。故名曰瘕。得冷則發。冷入子臟。則不孕。入胞絡。則月水不通。

薛氏之說可  
為病久虛  
者法

薛氏曰。前證若脾胃虛弱。用六君子加芎歸。若肝脾虛弱。用補中益氣及歸脾湯。若肝火鬱滯。佐以蘆薈丸。六味丸外。貼阿魏膏。患著。須慎七情六淫。飲食起居。治者不時審察病機。而藥之。庶幾有效。

○論食癥

大全云。婦人食癥。臟腑虛弱。月候來時。食生冷之物。脾胃既虛。不能消化。與臟氣相搏。結聚成塊。日漸生長。盤牢不移。故謂之食癥。

也。

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃爲主。而佐以消導。若形氣克實。當先疏瀹爲主。而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者。宜用烏藥散。散而行之。散用烏藥。莪朮。醋浸炒。桂心。當歸。桃仁。青皮。木香。各等分。爲末。每二錢。熱酒送下。脾氣虛而血不行者。宜用四君。芎歸。補而行之。若脾氣鬱血不行者。宜用歸脾。湯解而行之。若肝脾血燥而不行者。宜用加味消遙散。清而行之。大抵食積痞塊之證。爲有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正闢邪而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相

結漸生。顆塊盤牢。不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來。經終  
痞塞。惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。害於飲食。  
肌膚羸瘦。

有以左畔爲  
血癥者。凡肝  
之部皆可爲  
血病。

此說甚佳

問癥一也。何以知是血癥。曰。血外之証。目悶。煩燥。迷忘。驚狂。痰嘔。  
汗多。骨熱。肢冷。其畜在下焦者。必臍下結急。外熱內痛。尺脈洪而  
數也。桃仁。靈脂。生地。黃牛膝。大黃。甘草。祛逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損。五臟氣血乖違而致。蓋氣主噓之。血  
主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝者。多患之。腹脇作  
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣爲  
主。治法當主於固元氣。而在以攻伐之劑。必需之歲月。若期速効。  
投以峻劑。反致有誤。

○論腹中瘀血

大全云婦人月經否塞不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。爲風冷所乘。血得冷則成瘀血也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則爲積聚癥瘕矣。

薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用加味歸脾湯。若悲怒傷肝。用加味道遙散。若產後惡露用失笑散。若肝脾虛損。用六君子。柴胡以補元氣爲主。胃氣虛弱。用補中益氣湯。加茯苓半夏爲主。大凡腹中作痛。畏手按者。此內有瘀血。若形體如常。屬病氣。元氣俱實。用桃仁承氣湯直下之。若痛而肢體倦怠。飲食少思。此脾胃受傷。屬病氣有餘。元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君炮薑芎歸純補之。若痛而大

胃故其言如此然亦一偏之見俱攻削之藥不得其緩反致傷氣以致不收故不如善守之爲愈矣

便不實。飲食難化。此脾胃虛寒。用六君炮薑肉果溫香之。若痛而作嘔。少食。此脾胃虛弱。用六君炮薑藿香。若痛而嘔吐。不食泄瀉。用六君薑桂。若兼手足逆冷。自汗。更加附子。此証多有因攻伐而致者。

### ○論痧癰

大全云。痧者在腹內近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰痧也。癰者爲僻。側在兩肋之間。有時而痛。故曰癰也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣搏結不散。得冷則發作疼痛。○夫痧癰癢血氣塊硬。發作則痛甚。則欲死。寃而言之。皆血之所爲。僕嘗治一婦人。血氣刺痛。極不可忍。甚而死。一二日方省。醫巫併治數年不愈。僕

以葱白散烏雞丸遂安又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要一人扶定方少止亦用此二藥而愈尋常小小血氣用此二藥亦有奇効故錄於後

○論疝瘕

大全云婦人疝瘕由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟腑虛弱風冷入腹與血相結所生疝者痛也瘕者假也結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過度非獨因飲食失節多挾瘀血氣所成也其脈弦急者生虛弱小者死尺脈瀄而浮牢爲血實氣虛其發腹痛逆氣上巢氏止言胞門傷而此直爲胞中惡血亦本病源來行此爲胞中有惡血久則結成血瘕也

薛氏曰子和云遺溺閉癰陰痿浮痺精滑白淫皆男子之疝也若

女子亦有痕  
男子亦有痕

血涸月事不行行後小腹有塊或時動移前陰突出後陰痔核皆  
女子之疝也。但女子不謂之疝而謂之瘕。

一婦人小腹痞脹小便時下白帶小水淋瀝此肝經濕熱下注用  
龍膽瀉肝湯而愈。

一婦人小腹脹痛小水不利或胸乳作痛或脇肋作脹或氣逆心  
吻余以爲肝火而血傷脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈。  
一婦人小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食用八珍湯加柴胡山  
梔龍膽草治之而安。

○論腸覃

李氏曰腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏大腸爲肺傳送肺主氣  
氣得熱則行得冷則凝凝則清氣散而濁氣結爲瘕覃延日久不

已瘕肉乃生。始如雞卵。久如懷胎。按之堅。推之移。月事時下。或多或少。氣病而血未病也。宜二陳湯加香附以開之。或香粉丸。

瘕瘕積聚並起于氣。故有氣積氣聚之說。然謂瘕屬血病者。氣聚而後血凝也。其夾食夾痰。又各隨所積而變見矣。夫痰與血食皆賴氣以爲之行。化散氣行。物生氣病。物病此百病所由生。生于氣。

○論婦人瘕瘕並屬血病。準繩云。古方有五積六聚七瘕八瘕之名。五臟之氣積。名曰積。故積有五。六府之氣聚。名曰聚。故聚有六。雜病準繩言之詳矣。若夫七瘕八瘕。則婦人居多。七者火數。屬心。蓋血生於心。八者木數。屬肝。蓋血歸於肝。雖曰強分。理似不混。夫瘕者堅也。堅則難破。瘕者假也。假物成形。古人將婦人病爲瘕疾。以蛟龍等爲生瘕。然亦不必如此執泥。婦人瘕瘕並屬血病。龍蛇魚鼈肉髮蟲瘕等事。皆出偶然。但飲食間誤中之留聚。腹成假血而成。自有活性。亦猶永微。山僧病噎者。腹中有一物。其狀如魚。卽生瘕也。與夫宿血停凝結。