

校正醫宗金鑑

內科

醫宗金鑑內科目錄

第十一冊

卷四十五

崩漏 帶下 癰疽積

痞瘕癰疽 嗣育

卷四十六

胎前諸證

卷四十七

產後諸證

卷四十八

產後諸證

卷四十九

乳證 前陰諸證 雜證

卷五十

四診總括起至虎口三關部

位

初生門上

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名為漏，忽然大下謂之崩。紫黑塊痛多屬熱，日久行多損任衝，脾虛不攝，中氣陷，暴怒傷肝，血妄行，臨證審因，須細辨虛補瘀消，熱用清。註婦人行經之後，淋瀝不止，名曰經漏，經血忽然大下不止，名為經崩。若其色紫黑，成塊，腹脇脹痛者，屬熱瘀，若日久不止，及去血過多而無塊痛者，多係損傷任衝二經所致。更有憂鬱傷脾，脾虛不能攝血者，有中氣下陷，不能固血者，有暴怒傷肝，肝不藏血而血妄行者。臨證之時，須詳審其因而細細辨之，虛者補之，瘀者消之，熱者清之，治之得法，自無不愈。

崩漏證治

荊芩四物湯

崩漏血多物膠，又熱多知柏少。荊芩漏瀉香附，桃紅破崩初脹痛。琥珀攻日久，氣血衝

任損，八珍大補養榮，益思慮傷脾，歸脾治傷肝，逍遙香附青。註崩血漏血去血過多者，宜用膠艾四物湯補之。如屬熱多者，宜用知荊芩四物湯清之。熱少者，宜用荊芩四物湯和之。若崩血濇少，此屬血滯，宜用四物湯加香附、桃仁、紅花破之。若崩血初起，脹痛此屬瘀凝，宜用琥珀散攻之。崩漏日久，氣血已虧，衝任傷損者，宜用八珍湯十全大補湯，人參養榮湯量補其損傷。若因思慮傷脾者，宜用歸脾湯補之。恚怒傷肝者，宜用逍遙散加炒香附、青皮平之。

膠艾四物湯

四物湯 琥珀散

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

歸脾湯

逍遙散

方俱見前調經藥方內

補中益氣湯

益胃升陽湯

氣陷補中益氣，舉保元升柴歸本。陳益胃升陽，加苓麵腹痛加芍。嗽減參。註崩漏日久，脾傷食少，中氣下陷，不能載血者，宜用補中益氣湯。益胃升陽湯升舉之。補中益氣湯即人參黃耆甘草保元湯加

升麻、柴胡、當歸、白朮、陳皮也。益胃升陽即補中益氣湯加黃芩、神麴也。若腹痛者，宜加白芍。藥有熱者，用黃芩。無熱者，用肉桂調之。咳嗽者，肺熱也，減人參。

調經升陽除濕湯

交水水瀉不甚，弱調經升陽除濕湯。蒼朮升柴歸蒼朮，羌獨薑本蔓荊防。註崩漏下血，交水或

日水瀉一二次，形氣不甚弱者，宜用調經升陽除濕湯。其方即黃芩、甘草、升麻、柴胡、當歸、蒼朮、羌活、獨活、薑本、蔓荊子、防風也。以風藥先勝其濕，若形氣虛弱者，則當加人參、陳皮、白朮。補中益氣湯補中勝濕可也。

夫笑散 地榆苦酒煎 殺血心痛失笑散蒲黃五靈脂定疼崩血不已防滑脫地榆苦酒煎止崩 崩血心痛痛

其者名曰殺血心痛乃血滯不散宜用失笑散其方即蒲黃五靈脂也先定其痛痛止然後隨證治之若崩血補之仍

然不止者當防其滑脫宜用地榆一兩醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證治之名地榆苦酒煎

崩漏門彙方 補中益氣湯 黃耆 人參 白朮 甘草 錢各一 當歸 陳皮 升麻 柴胡 各三

右劉末加入薑棗水煎服

益胃升陽湯 黃耆 二錢 人參 一錢有嗽 神曲 一錢五 白朮 三錢 當歸 酒洗 陳皮 甘草 各一 升麻

柴胡 各五 生黃芩 二錢 右為粗末每服三錢或五錢如食添再加之如食減口服三錢或更減之不可多服

水煎去滓熱服

升陽除濕湯 黃耆 蒼朮 羌活 各一錢 防風 藁本 升麻 柴胡 甘草 各一 獨活 五分 蔓荊子 各

右咬咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服空心服畢待少時以早膳壓之

失笑散 五靈脂 蒲黃 各等分 右為末先用醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱服良驗

地榆苦酒煎 地榆 一兩 醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證調治之 苦酒即醋也

帶下門

五色帶下總括 帶下勞傷衝任邪入胞中五色分青肝黃脾白主肺紅血黑腎赤屬心隨人五臟兼濕化治從

補瀉燥寒溫更審瘡膿瘀血化須別胞膀濁與淫 帶下者由于勞傷衝任風邪入于胞中血受其邪隨人藏氣濕熱

濕寒所化故色青者屬肝為風濕色赤屬心為熱濕色黃屬脾為虛濕色白屬肺為清濕色黑屬腎為寒濕也其從補

從瀉從燥從溫從寒從溫則隨證治之更審其帶久淋瀝之物或臭或腥穢乃敗血所化是胞中病也若似瘡膿則非

瘀血所化是內癰膿也若如米泔兼尿寔不利乃膀胱白濁病也若尿寔通利從精寔出或如膠粘乃胞中白淫病也

帶下證治 邪入胞中吳茱萸赤粘連梔青防梔白主益氣黑六味黃淡六君或歸脾 帶下因六淫之邪入於胞

中者宜吳茱萸湯若色赤色黃而濁粘者熱也色黃者加黃連梔子色青者加防風梔子若色白而清稀者虛寒

也色白者用補中益氣湯若色黑者用六味地黃湯色黃而淡者宜六君子湯或加味歸脾湯分證調治可也

吳茱萸湯 補中益氣湯 六味地黃湯 六君子湯 疎脾湯 方俱見前卷方內

加味四物湯 胞中冷痛乃寒濕四物附子桂薑宜其腥兼合知藥用久滑升柴龍牡脂 帶下而胞中熱痛乃熱

濕也今胞中冷痛乃寒濕也宜四物湯加川附子炮薑官桂服之日久滑脫者加升麻柴胡舉之龍骨牡蠣赤石脂瀉

之 四物湯 方見前調經門方內

清白散 帶下濕熱清白散四物薑炭草薢椿赤榆荆苓濕二木滑加龍牡久合君 帶下五色帶下也皆濕熱所

化宜用清白散其方即四物湯加薑炭甘草黃蘗椿皮也色赤加地榆荆芥黃苓濕加蒼朮白朮滑加龍骨牡蠣久則

合四君子湯也 四物湯 四君子湯 俱見前調經門方內

導水丸 萬安丸 帶下有餘皆濕化少腹脹疼汚水綿導水牽滑苓軍熱萬安牽椒茴木寒 五色帶下皆從濕

化若少腹脹痛汚水綿綿屬濕熱者宜用導水丸其方即牽牛滑石黃苓生軍治熱有餘也屬濕寒者宜用萬安丸其

方即牽牛胡椒小茴香木香治寒有餘者也

威喜丸 固精丸 瘀化瘡膿濁淫病虛實寒熱酌其宜威喜蠟苓固精免韭味桑苓龍牡脂 帶下有因瘀血所

化或瘡瘍膿出及白濁白淫者皆帶下類也其虛實寒熱酌其宜藥用威喜丸即黃蠟茯苓也固精丸即菟絲子韭

菜子五味子桑螵蛸茯苓龍骨牡蠣赤石脂也

帶下門彙方

清白散 當歸 黃蘗 鹽水 白芍 炒 檣根皮 酒炒 生地 川芎 貝母 各一錢 炮薑 甘草 各五分 右劉生

薑三片水煎服

導水丸 牽牛 頭末 滑石 水飛 黃苓 川大黃 右末蒸餅為丸量虛實服

萬安丸 牽牛 頭末 胡椒 木香 小茴香 各等分 煨 右末水泛為丸量虛實服

威喜丸 白茯苓 四兩去皮作塊用豬苓二錢半同于礬 黃蠟四兩 右以茯苓為末煉黃蠟為丸如彈子大空

心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清為度忌米醋只喫糠醋忌動氣

固精丸 牡蠣 煨粉 菟絲子 酒蒸 韭子 炒 龍骨 五味子 白茯苓 桑螵蛸 酒炙 赤石脂 各等分

右為米酒糊丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

癥瘕痞諸證門

癥瘕積聚痞瘕血血蠱總括

五積六聚分藏府七癥八瘕氣血凝滯積不動有定處瘕聚推移無定形痞悶不宣

氣壅塞未成堅塊血瘕名蓄久不散成血蠱產後經行風冷乘註五藏氣積名曰積故積有五證六腑氣聚名曰聚故

聚有六證難經有心肝脾肺腎五藏之積而無六聚蓋以積為血病而聚為氣病也故李杲有五積丸方治法巢氏病

源載七癥八瘕但有八瘕名證而無七瘕病形其他方書亦不概見大抵人以瘕為氣病而瘕為血病也夫病皆起于

氣必氣聚而後血凝不必過泥于黃青燥血脂狐蛇驚等名但以牢固不移有定處者為瘕為積推移轉動忽聚忽散

者為瘕為聚可也故曰瘕者微也言有形可徵也瘕者假也言假物成形也若夫痞者痞悶不通氣道壅塞之謂也瘕

血者血瘀腹中未成堅塊也蓄之既久必成血蠱矣凡此諸證皆由新產之後經行之時不知謹避以致風冷外襲邪

正相搏結於腹中而成也

癥瘕證治

大七氣湯

婦人一切癥瘕病上下攻疼七氣湯霍香益智稜莪朮甘桔青陳肉桂香註婦人一切癥

瘕隨氣上下攻築疼痛者宜大七氣湯其方即霍香葉益智仁京三稜蓬莪朮甘草桔梗青皮陳皮肉桂心木香也

食癥證治

烏藥散

經行產後食生冷臟氣相搏結塊形牢固不移日漸長開滯消積溫散行烏藥散烏藥莪朮

木香當歸青桂心註婦人經行產後食食生冷之物阻臟氣互相搏聚結成堅塊牢固不移日漸長大者治宜開滯消

積用烏藥散即烏藥桃仁莪朮木香當歸青皮桂心以溫散之自愈

血癥證治

血竭散

乘藏虛冷風冷干飲食內與血相搏因成血癥堅牢固腸腹脹痛熱而煩少食多忘頭汗出

血竭歸芍蒲桂延註婦人產後經行之時臟氣虛或破風冷相干或飲食生冷以致內與血相搏結遂成血癥牢固不

移腸腹脹痛內熱心煩食少善忘但頭汗出者宜用血竭散即血竭當歸赤芍蒲黃桂心延胡索也

痞證治

助氣丸

三焦痞滿胸膈悶氣不宣通助氣清白朮三稜蓬莪朮枳殼枳榔香與陳註婦人胸膈痞悶謂

之痞由於氣壅不宣所致宜助氣丸即青皮白朮三稜莪朮枳殼枳榔木香陳皮為丸服也

積聚證治

開鬱正元散

積聚通用正元散今朮青陳麵麥延香砂海粉查甘桔痰飲食積血氣搏註五積六聚

乃痰飲食積氣血搏結而成通用開鬱正元散其方即茯苓白朮青皮陳皮神麴麥芽延胡索香附砂仁海粉山查甘草桔梗也用健脾消食化痰飲理氣和血則積聚未有不愈者矣

瘀血血蠱證治 桃奴散 腹中瘀血未成形面黃發熱腹脹疼產後經來風冷客血室之內有瘀停產後惡露笑

散經閉瘀凝王燭攻血蠱桃奴蠶鼠薑延桂砂桃附五靈註婦人產後經行之時傷於風冷則血室之內必有瘀血停

留未成堅塊故名蠱瘕也其人必面色萎黃臍腹脹痛內熱晡熱若產後惡露不行者宜失笑散若經閉不通瘀血

凝聚者宜王燭散瘀血不散蓄之既久必成血蠱宜用桃奴散即桃奴蠶鼠薑延胡索桂心砂仁桃仁香附五靈脂也

蠶鼠薑一名兩頭尖即雄鼠屎桃奴即桃樹上未成不落之乾桃子也 失笑散方見前卷 玉燭散方見前卷

痲痺証治 痲旁左右一筋疼突起如弦痲證名痺在兩肋名曰痲高起如山痲病稱必引少腹腰脇痛三證

皆由風冷成或作或止因寒發痛時方見不痛平註婦人臍之兩旁有筋突起疼痛大者如臂小者如指狀類弓弦者

名曰痲痺在兩肋之間者名曰痲若小腹牽連腰脇疼痛高起者謂之痲名雖有三其實皆因風冷客于胞中而然故

其發作皆因再受風冷發則痛痛則見不痛則平復如初也

痲痺證治 葱白散 婦人痲痺腹肋痛風冷血氣結而成葱白四物參苓枳桂朴薑桑白朮桂枝香麴麥苦楝子

葱薑煎服訶黃散註婦人痲痺腹肋疼痛者皆因風冷與氣血搏結而成宜用葱白散溫散之其方即四物湯加人參

茯苓枳殼肉桂厚朴乾薑不香青皮我朮三稜茴香神麴麥蘗苦楝子葱白食鹽煎服也大便結燥去鹽加大黃如大

便自利如訶子 四物湯方見前卷

痲病證治 當歸散 婦人痲病氣攻冲脇腹刺痛當歸芍藥魚甲吳茱萸桃仁芍桂榔青木大黃蓬註婦人痲病攻衝

刺痛多因風冷寒濕客於胞門血室故其病皆屬厥陰肝經宜當歸散即當歸川芍藥甲吳茱萸桃仁赤芍肉桂榔

青皮木香大黃蓬我朮也

治諸積大法 形虛病盛先扶正形證俱實去病急大積大聚衰其半須知養正積自除註凡治諸癥積宜先審身

形之壯弱病勢之緩急而治之如人虛則氣血衰弱不任攻伐病勢雖盛當先扶正氣而後治其病若形證俱實宜先

攻其病也經云大積大聚衰其半而止蓋恐過於攻伐傷其氣血也羅天益曰養正積自除可謂得經旨者矣

攻其病也經云大積大聚衰其半而止蓋恐過於攻伐傷其氣血也羅天益曰養正積自除可謂得經旨者矣

癥瘕積痞血蟲門方

大七氣湯 三稜 莪朮各煨 青皮去穢 陳皮去白 木香 藿香 益智仁 桔梗 肉桂 甘草各七錢

右改咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

烏藥散 烏藥 莪朮 桂心 當歸炒 桃仁 青皮 木香各等分 右為末每服二錢熱酒調下

血竭散 真血竭如無紫礦代 當歸 赤芍 蒲黃 延胡索 右等分研細頻篩再研取盡為度每服一錢用童便合

好酒半大盞煎一沸溫調下方產下時一服上牀良久再服其惡血自循經下行不致衝上免生百病

助氣丸 京三稜 蓬莪朮二味各用濕紙包灰火中煨透切片各二斤 青皮去白 陳皮去白 白朮各十兩 枳殼去穢 檳榔 木

香各十兩 右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

開鬱正元散 白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 延胡索 麥芽炒 甘草炙

神麴各等分炒 右劉每服一兩生薑三片水煎服

桃奴散 桃奴炒 雄鼠糞炒兩頭尖者是 延胡索 肉桂 五靈脂 香附炒 砂仁 桃仁各等分 右為末每服三

錢酒調下

葱白散 當歸 熟地 赤芍 川芎 人參 茯苓 枳殼 肉桂 厚朴 乾薑 木香 青皮 莪朮 三稜

茴香 神麴 麥芽 苦楝子各等分 右末加葱白三寸食鹽五分煎服三錢大便燥結去鹽加大黃大便自利

加訶子

當歸散 當歸 川芎各二錢 檳榔三錢 吳茱萸 桃仁十五粒 赤芍 肉桂各一錢 枳榔 青皮各八分 木香

莪朮 川大黃各七分 右為末每服一錢水一盞入乾鰾脂一錢同煎六分食後服

嗣育門

胎孕之原 天癸先天生身氣精血後天化成形男子二八天癸至屬陽應日精日盈女子二七天癸至屬陰應月

血月通男女嬌精乃有子乾道男成坤女成註天癸乃父母所賦先天生身之真氣也精血水穀所化後天成形之本

也男子二八先天腎氣盛天癸至血後天所生之精會合而盈然男子屬陽陽應日故精盈而日舉也女子二七天

腎氣實天癸至而後天所生之血會合而盛然女子屬陰陰應月故血盛而月下也所以至期男女媾其先天真氣後天精血陰陽會和乃能有子也當此陰陽會合時陽盛自然成男是乾道成男也陰盛自然成女是坤道自然成女也男女完實 精通必待三十聚天癸二十始適人皆欲陰陽完實後育子堅壯壽偏增註男子十六而精通必待三十而娶女子十四而天癸至必待二十而嫁者皆欲陰陽完實然後交而孕孕而育育而其子必堅壯長壽也今未詳之女人癸始至已近男色則陰氣早瀉未完而傷未實而動所以雖交而不孕孕而不育育而其子必脆弱不壽也種子時候 男子聚精在寡慾交接乘時不可失須待細縕時候至樂育難忘是真機註聚精之道惟在寡慾交接女子必乘其時不可失之遲早蓋婦人一月經行一度之後必有一日細縕之時氣蒸而熱如醉如癡有欲交接不可忍之狀乃天然節候是成胎生化之真機也

分男女論 精血先後分男女或以奇偶少多分或以子宮左右定是皆不曉箇中因欲識此中真消息乾道陽男坤女陰註分男女之說先賢有以血先至裏精則成男精先至裏血則成女精血散分並裏則為駢胎品胎之原者有以月水盡後一三五日成男二四六日成女與夫經水斷後一二日成男四五日成女者有以受氣於左子宮成男受氣於右子宮成女者皆各執一見殊為不曉此中因也蓋獨男獨女之胎可以日數論駢胎品胎或男或女亦可以日數論乎稽之史載一產三子四子有半男半女或男多女少男少女多者則一三五日為男二四六日為女之說不可憑矣抑豈有一日受男而二日復受女之理乎丹田命門也在男子曰精室在女子曰子宮形如合鉢並無兩歧可分曰左右則是有兩子宮矣此說尤屬不經然則何以定之亦惟以會合天人陽盛乾道成男陰盛坤道成女斯足為確論耳

雙胎品胎 古以雙胎精氣盛不成男女或兼形陰陽變常駁氣盛事之所有理難明註古以雙胎乃精氣有餘歧而分之血因分而攝之故也若男女同孕者剛日陽時也女同孕者柔日陰時也男女同孕者剛日陰時或柔日陽時也其他或有不咸男女男不可為父女不可為母與男女之兼形者又皆陰陽變常駁氣所感事之所有理之所無莫可稽考者也

脈見有子 少陰動甚知有子陰搏陽別尺寸憑但搏不滑胎三月搏而滑石五月形註少陰督脈動甚者有子脈也

但當憑其兩尺陰脈搏指有力兩寸陽脈不搏指而別於兩尺斯為有子脈無疑也其但搏不滑者主三月之胎搏而滑者主五月之胎也

胎男女辨

上小下大女腹箕中正圓高男腹釜右疾為女左疾男胎氣鍾於陰陽主上小下大如箕之形蓋以女

胎面同母腹其足膝抵腹故有是形也中正圓高如釜之形蓋以男胎面向母背則背脊抵腹故有是形也右手屬陰脈疾為女左手屬陽脈疾為男是胎氣鍾於陰則右盛主女鍾於陽則左盛主男也

辨別孕病

孕病不分須診乳五月之後乳房升何以知其母子吉身雖有病脈和平婦人經水不至不分是孕是

病者五個月之後以孕婦乳房辨之若乳房升大有乳者是孕若乳房不大無乳者是病也凡孕婦有病其險可知亦何以知其母子俱吉惟診其脈象和平則雖有病知均吉無慮也

分經養胎

分經養胎不足憑無所專養論不經形始末分無不具陰陽之道漸分形集元方曰妊娠一月名胚胎

足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手心主脈養之當此時血不流行形象始化四月始受水精

以成血脈手少陽脈養之五月始受火精以成氣足太陰脈養之六月始受金精以成筋足陽明脈養之七月始受木

精以成骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五

藏六府關節人神皆備又有推巢元方養胎之說謂四時之令必始於春所以一月二月間是足厥陰少陽木也三月

四月間手厥陰少陽火也五月六月間足太陰陽明土也七月八月間手太陰陽明金也九月十月間足少陰太陽水

也惟手少陰太陽二經無所專養者以君主之官無為而已此說更為不經夫男女交接精血聚而成胎此孕形之始

也雖未分身軀藏府而其理無不具也猶太極渾然包羅萬象而陰陽之一氣氤氲漸浸化生而成子母分形自然而

然如草木成熟殼脫蒂落也

受孕分房靜養

受孕分房宜靜養謹戒食味使脾安調其喜怒防驚恐慎厥起居避風寒受孕之後分房靜養慈

動相火致生胎毒謹戒飲食五味使其脾胃調和母之氣血易生子之形成必有內調七情外避風寒起居安順不持

重用力不安逸多睡不登高涉險則母無病子亦安矣

安胎母子二法

安胎之道有二法母病胎病要詳分母病動胎但治母子病致母審胎因安胎之道有二法母病

胎病當詳分而施治也凡因母病以致胎動者但療其母母安則胎自安或因胎病有所觸動以致母病者但宜安胎胎安則母自愈矣

胎前用藥三禁 胎前清熱養血主理脾疏氣是為第一禁汗下利小便便隨證虛實寒熱看 丹溪曰胎前當清熱養血為主恐傷陰血也理脾脾健則氣血易生疏氣氣順則氣血調和理脾疏氣兼以清熱養血則胎自安矣二禁者汗下利小便便也蓋恐過汗亡陽傷氣過下亡陰傷血利小便便傷津液也然又當隨證詳審表裡虛實寒熱以施其治不可過峻也

安胎蜜宜調治 形瘦不宜過熱品體肥補氣恐動痰安胎苓朮為要藥佐以他藥任抽添火盛倍苓痰倍朮血虛四物氣四君杜續膠艾胎不穩氣盛虧腹枳砂陳 形瘦之人多火過用溫熱則傷陰血肥盛之人多痰過於補氣恐壅氣動痰白朮消痰健脾條苓清熱養陰二味為安胎聖藥若有他證則以藥佐之或減白朮加條苓或加白朮減條苓任其抽添如火盛則當倍苓以清火痰盛則當倍朮以消痰血虛則合四物湯以補血氣虛則合四君湯以補氣胎不安穩更佐以杜仲續斷阿膠艾葉以安之若氣盛胎高則加紫蘇大腹皮枳殼砂仁陳皮以舒之 四物湯 四君子湯方俱見前卷藥方內

嗣育門彙方

加味地黃丸 治婦人經水不調必不能受孕即使受之亦不全美宜常服此方 熟地 四兩 山萸肉 山藥 各二兩

牡丹皮 白茯苓 各一兩 澤瀉 香附 各一兩 重 右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九白沸湯送下

滌痰湯 治婦人肥盛者多不受孕以身中有脂膜閉塞子宮也以此湯送後丸藥 當歸 一兩 茯苓 四兩 川芎 五錢

白芍藥 白朮 各一兩 半夏 製 香附米 陳皮 甘草 各一兩 右作十貼每貼薑三片水煎吞後丸子

滌痰丸 白朮 二兩 半夏 麵 川芎 香附米 各一兩 神麴 炒 茯苓 各五錢 橘紅 四錢 甘草 二錢 右為末

末粥丸每服八十丸如熱者加番蓮枳實各一兩

大補丸 治婦人瘦弱多由血少不能受孕宜常服此方 天冬 去心 麥冬 去心 菖蒲 茯苓 人參 益智仁 枸杞子 地骨皮 遠志肉 右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九

地骨皮 遠志肉 右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九

上海廣益書局印行

醫宗金鑑二卷四十五

從容菟絲子丸

此方不寒不熱助陰生子

肉從容一兩

覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

菟絲子各一兩

白芍約一兩

牡蠣鹽水

烏鰂魚骨各八錢

五味子

防風各六錢

條芩五錢

艾葉三錢

右為末煉蜜丸如桐子大

每服三四十丸鹽湯下早晚皆可服

調經丸

理氣養血調經種子

香附

川杜仲八兩

薑

大川芎

白芍約

當歸去尾

懷生地

陳皮

小茴香

延胡索略

肉從容酒

舊青皮炒

白烏藥炒

枯黃芩酒

烏鰂魚骨以上各四兩

右十四味稱足真正

好醋和麵打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心好酒送下

一方無陳皮地黃有人參黃耆各二兩

卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸證門

胎前總括

妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩懸痛嘔轉胞與子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘕臃爆

鬼胎連餘病當參雜證治須知刻刻顧胎原

此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩子懸子瀰子嘔轉胞子淋

激經胎漏胎動不安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘕臃爆鬼胎等症皆當一詳辨熟記其餘胎前傷寒傷食瘕

痢霍亂泄瀉當于雜症門中參考治之但瀉時刻保護胎原不致誤犯為要也

惡阻總括

惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須約主胃弱更分胎逆痰熱寒婦人受孕月餘之後時時嘔

吐者名曰惡阻若無他病擇食者須隨其意而與之輕者過期自然勿藥而愈重者須以約治之當以胃弱為主更審

其或因胎氣阻逆或痰飲阻逆與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治

保生湯

胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏陳草量加參枳引生姜惡阻有因胎氣

阻逆者乃受胎後胞門閉塞臃氣內阻挾胎氣上逆于胃故令惡心嘔吐也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而

亦有惡阻症者宜用保生湯即砂仁白朮香附烏陳陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔也若氣弱者量加人參氣實

者量加枳殼

此方不寒不熱助陰生子肉從容一兩覆盆子蛇床子川芎當歸菟絲子各一兩白芍約一兩牡蠣鹽水烏鰂魚骨各八錢五味子防風各六錢條芩五錢艾葉三錢右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸鹽湯下早晚皆可服

必多痰水且心煩頭目眩暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用加味六君湯於六君湯內加枇杷葉蜜黃香旋覆花細

砂枳殼若胃熱便秘加黃芩大黃以利之胃寒喜熱加肉桂乾薑以溫之 六君湯 方見首卷

加味溫膽湯 熱阻惡食喜常嘔心煩憤悶溫膽湯橘半茯苓與枳竹更加冬連蘆麥薑 惡阻因于胃熱者必嘔

吐心中熱煩憤悶喜飲涼漿也宜用加味溫胆湯其方即陳皮半夏茯苓甘草枳實竹如名溫胆湯更加黃芩連蘆

根麥門冬引生薑也

胞阻總括 妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎腰腹少腹胞寒水尿難 孕婦腹痛名為胞阻須審

其痛或上在心腹之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必因胞血受

寒或停水尿難作痛也

胞阻證治 加味平胃散 延胡四物湯 心胃痛多傷食滯倉朴陳甘果枳糲便秘加軍倍甘草胎動延胡四物

宜 孕婦心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散即陳皮厚朴倉朮甘草也加草果枳殼神糲以消之若更大便秘結

日久則加硝黃以攻之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎若腰腹作痛胎動下血則當用四物湯君以延胡以定痛

而保胎也 四物湯 方見首卷

加味膠艾四物湯 蜜硝湯 腹腰痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱外邪宜加羌獨活內熱便秘蜜硝攻 胞蒂繫於

腰凡腹腰痛者須防胎墮宜用膠艾四物湯加杜仲大豆淋酒葱白以定痛而保胎若因外感風寒之邪則加羌活獨

活以散之若內熱大小便閉者則用蜂蜜蜜硝煎湯以攻之經曰有故無損是也 膠艾四物湯 方見首卷

加味芍歸散 導赤散 五苓散 胞血受寒少腹痛參吳膠艾草歸芍尿瀝熱甚導赤散不通生地甘草靈水盛陽

虛五苓散末澤肉桂茯苓 少腹作痛者乃胞中之血受寒也宜加味芍歸散溫之其方即人參吳茱萸阿膠斷艾

炙甘草當歸川芎也若因尿濕而痛則是膀胱水病熱甚則以導赤散清利之其方即生地木通甘草也若水盛陽虛

不化則以五苓散滲利之其方即茯苓白朮澤瀉猪苓肉桂也

子腫子氣子滿 胎前諸症門 子腫子氣子滿 胎前諸症門 子腫子氣子滿 胎前諸症門 子腫子氣子滿 胎前諸症門

喘在六七個月時者名曰子滿但兩脚腫而膚厚者屬濕名曰皺脚皮薄者屬水名曰脫脚大凡水之為病多喘促氣之為病多脹滿喘促屬肺脹滿屬脾也以其人素有水氣濕邪故受孕有脹滿之症兒未成形被水浸漬其胎每致損壞成形尚可調治故在五六月後有是症者多有生育者也

子腫子氣子滿脚皺脚證治 茯苓導水湯 妊娠腫滿與子氣水氣濕邪脾肺間水氣侵胎喘難臥濕氣傷胎

脹不堪均宜茯苓導水治香瓜積腹四苓攢秦砂蘇陳脹加枳腿脚防已喘亭漆 註 妊娠水腫脹滿子氣皺脚脫脚等症皆由水氣濕邪傷於脾肺為病也若水氣盛而浸胎則必喘而難臥若濕氣盛而傷胎則脹滿難堪皆宜用茯苓導水湯治之方用木香木瓜枳榔大腹皮白朮茯苓猪苓澤瀉桑皮砂仁蘇葉陳皮以和脾肺而利水濕脹甚者加枳殼以破結腿脚腫者加防己以利下濕喘者加苦葶應以泄上水也

子煩證治 知母飲 孕婦時煩名子煩胎熱乘心知母痊子苓知母苓者草犀熱參虛膏湯煎 註 孕婦別無他熱

惟時時心煩者名曰子煩由胎中鬱熱上乘於心也宜用知母飲即子苓知母麥冬茯苓黃耆甘草熱甚者加犀角氣

虛加人參口渴加石膏煎服

子懸胎上逼心證治 紫蘇飲 胸膈脹滿子懸名喘甚由胎上逼心紫蘇飲用歸芍芍陳腹蘇甘虛入參 註 孕婦

胸膈脹滿名曰子懸更加喘甚者名曰胎上逼心俱宜紫蘇飲即當歸川芎白芍陳皮大腹皮蘇梗葉甘草虛者加人

參煎服

子痼證治 羚羊角散 鈎藤湯 暴仆抽搐不識人須臾自醒子痼名羚羊角散防獨舌五加棗草意苡仁茯苓

木香羚羊角抽搐鈎藤湯寄生人參茯苓神歸桔梗口喝肢廢中風成 註 孕婦忽然顛仆抽搐不省人事須臾自醒少頃

復如好人謂之子痼乃肝心二經風熱所致宜用羚羊角散即防風獨活杏仁酸棗仁五加皮甘草薏苡仁茯苓木香

羚羊角也抽搐甚者用鈎藤湯乃鈎藤寄生人參當歸茯苓神桔梗也若口眼喎斜半身不遂則已成中風廢症當參

風門治之

子嗽證治 枳殼二陳湯 桔梗湯 妊娠欬嗽名子嗽陰虛痰飲感風寒痰飲二陳加枳桔風寒桔梗湯可安紫

蘇桔梗麻桑杏赤苓天冬合貝前久嗽陰虛宜清潤麥味地黃湯自痊 註 妊娠欬嗽謂之子嗽嗽久每致傷胎有陰虛

火動痰飲上逆有感冒風寒之不同因痰飲者用二陳湯加枳殼桔梗治之因感冒風寒者用桔梗湯即此蘇葉桔梗
麻黃桑白皮杏仁赤茯苓天冬百合川貝母前胡也若久嗽陰虛宜滋陰潤肺以清潤之用六味地黃湯治之
地黃湯 方見首卷

轉胞證治 舉胎四物湯 阿膠五苓散 飲食如常煩不臥不得小便轉胞稱舉胎救急丹漢法四物升麻參朮陳

服後探吐吐再服不應阿膠入五苓 註 妊娠胎壓胞系了戾不得小便飲食如常心煩不得臥者名曰轉胞宜用丹溪

舉胎法令穩婆香油塗手舉胎起則尿自出以暫救其急然後以四物湯加升麻人參白朮陳皮煎服服後以指探吐

吐後再服再吐如此三四次則胎舉而小便利矣如不應則是有飲用五苓散加阿膠以清利之 四物湯 方見首卷

子淋證治 加味五淋散 子淋頻數窘澀疼五淋梔苓歸芍甘甘草再加生地澤車前滑石木通等 註 孕婦小便

頻數窘澀點滴疼痛名曰子淋宜五淋散即黑梔赤茯苓當歸白芍黃芩甘草加生地澤瀉車前子滑石木通以清熱

而利水則小便自通矣

激經胎漏尿血總括 妊娠經來名激經胎漏下血腹不疼若是傷胎腹必痛尿血漏血要分明 註 婦人受孕之後

仍復行經者名曰激經為血有餘若孕婦無故下血或下黃汁豆汁而腹不痛者謂之胎漏若其胎已傷而下血者其

腹必疼孕婦又有尿血一證腹亦不痛然與胎漏之症又不同蓋尿血出於溺孔漏血出自人門三者俱下血而各不

同治者不可不詳辨也

激經胎漏尿血證治 阿膠湯 黃耆湯 銀芩酒 加味四物湯 激經無病不須治子大能食經自停胎漏下

血多因熱四物阿膠梔側苓或下黃汁豆汁樣黃耆糯米苕根銀若是尿血膀胱熱四物血餘共茅根 註 激經無他症

相兼者不須用約其胎壯子大能食其血而經自停若胎漏下血多屬血熱宜阿膠湯清之其方即四物湯加阿膠黑

梔側柏葉黃芩也或漏下黃汁或如豆汁甚多者其胎乾枯必倚而墮宜用黃芩湯即黃芩二兩糯米一合煎服或銀

芩酒即苕麻根紋銀煎酒服若尿血則是膀胱血熱宜四物湯加血餘白茅根以涼之 四物湯 方見首卷

胎不安小產墮胎總括 氣血充實胎自安衝任虛弱損胎原暴怒房勞傷肝腎疾病相干跌撲顛五月成形名小
產未成形像墮胎言無故至期數小產須慎胎為慾火煎 註 孕婦氣血充足形體壯實則胎氣安固若衝任二經虛損

則胎不成實或因暴怒傷肝房勞傷腎則胎氣不固易致不安或受孕之後患生他疾干犯胎氣致胎不安者亦有之或因跌撲築礎從高墮下以致傷胎墮胎者亦有之然小產墮胎亦自有別五七月已成形象者名曰小產三月未成形象者謂之墮胎以上小產墮胎皆出有因若懷胎三五月無故而胎自墮至下次受孕亦復如是數數墮胎即謂之滑胎多因房勞太過慾火煎熬其胎因而不安不可不慎者也

胎不安小產墮胎證治

加味聖愈湯 加味佛手散

十聖散

加味芎藭湯

益母丸

胎傷腹痛血未下聖

愈湯加杜續砂下血腹痛佛手散膠艾杜續赤芍加十全續縮減苓桂因病傷胎十聖跌撲芎藭調益母怒勞道遙地黃佳 妊娠胎傷若腹痛不下血者宜用聖愈湯加杜仲續斷砂仁安之若下血腹痛者宜用佛手散加阿膠斷艾杜仲續斷白朮條芩安之若因母病以致傷胎欲墮者宜十聖散加十全大補湯減茯苓肉桂加續斷砂仁若因跌撲築礎傷胎欲墮者宜芎藭湯調益母丸服之芎藭湯即川芎當歸也若暴怒房勞傷肝傷腎以致胎動不安者宜道遙散地黃湯治之 聖愈湯 佛手散 道遙散 地黃湯 方俱見首卷

墮胎下血不止血瘀不出證治

獨參湯

回生丹

墮胎暴下血不止面黃唇白獨參湯惡血不出凝脹痛回生

益母酌相當

妊娠胎墮後血暴下不止面黃唇白者名脫榮宜用獨參湯峻補其氣以生其血所謂無形能生有形

也若惡血瘀滯不行腹脇脹痛者宜於回生丹益母丸酌其虛實緩急相當而用之

回生丹

見產後實方

子死腹中總括

子死腹中湏急下舌青腹痛冷如冰時久口中穢氣出寒熱峻緩詳斟平 凡一應傷胎子死腹中者湏當急下勿使上奔心胸然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷如冰久之口中有穢氣出者方可議下然猶必審

其人之虛實寒熱或宜寒下熱下峻下緩下隨其宜而施之

子死腹中證治

佛手散 平胃散加芒硝方

下胎緩劑佛手散峻劑平胃加芒硝宜熱宜寒湏細審產婦虛實

莫溷淆

孕婦子死腹中宜下者緩下用佛手散峻下用平胃散加芒硝或宜寒下或宜熱下湏細細詳審而投之蓋

以產母之虛實或緩或峻不可溷淆輕率以致誤也

佛手散

方見首卷

辯子母存亡

妊娠一切垂危候母子存亡可預推面赤舌青必子死面青舌赤母命危面舌俱青口吐沫子母俱

亡二命虧

凡妊娠一切凶危之候欲知母子存亡者當于孕婦面舌之色定之若面赤舌青則其子必死面青舌赤

則其母必亡若面古二者俱見青色口角兩邊流涎者則子母二命俱不能保也

胎前癰疽

妊娠有病當攻下其大半而止之經云有故而無殞與病適當又何疑

凡孕婦素有癰疽瘰癧或

有新病應攻下者俱攻其大半餘俟其自消不可盡攻經云有故無殞言約雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又何疑于有妊必不可攻之說耶

胎不長證治

八珍湯 六君子湯 胎萎不長失滋養氣血不足宜八珍脾虛胃弱六君子穀化精微氣血生

妊娠五六月胎萎不長由于妊母稟賦虛弱若屬氣血兩虛者宜用八珍湯若脾虛胃弱者宜用六君子湯但便飲食強壯俾水穀運化精微則氣血日生而胎自長矣 八珍湯 六君子湯 方俱見首卷

子瘖證治

子瘖聲啞細無音非謂絕然無語聲九月胎盛阻其脈分晚之後自然通 註妊娠九月孕婦聲啞細啞

不響謂之子瘖非似子啞絕然無語也蓋少陰之脈終於舌本九月腎脈養胎至其時胎盛阻遏其脈不能上至舌本故散音細啞待分娩之後腎脈上通其音自出矣

子啼腹內鐘鳴證治

黃連煎 腹內鐘鳴與哭子啼之症出偶然空房鼠穴土能治黃連煎湯亦可捐 孕婦

腹內有鐘聲或嬰兒在內啼哭者名曰子啼古書雖載其症然不經見或偶然有之古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯名黃連煎飲之自愈

臟燥證治

甘麥大棗湯 臟燥無故自悲傷象若神靈大棗湯甘草小麥與大棗方出金匱效非常 註孕婦無故

時時傷悲哀痛若神靈驚悸者名曰臟燥宜用金匱甘麥大棗湯服之其方即甘草小麥大棗三味煎服其效非常也

鬼胎總括

邪思情感鬼胎生腹大同於懷子形豈緣鬼神能交接自身血氣結而成 註鬼胎者因其人思想不遂

情志相感自身血氣凝結而成其腹漸大如懷子形狀古云實有鬼神交接其說似屬無據婦人石瘕腸覃二證亦俱如懷孕之狀由氣血凝結而成則可知其必無是理矣

腸覃石瘕證治

香稜丸 腸覃石瘕氣血分寒客腸外客子門二症俱如懷子狀辨在經行經不行石瘕吳茱湯

最效腸覃香稜丸若神丁木茴香川棟子青皮廣茂蟲三稜 註經云寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫

瘕而內著惡氣乃起瘕肉乃生始如雞卵稍以益大如懷子狀按之則堅推之則移月事以時下石瘕生於胞中寒氣

客於子門子門閉塞氣不得通惡血當下不下血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下由經文觀之二症雖皆如懷子狀腸胃氣病而血不病故月事以時石瘕先氣病而後血病故月事不來也石瘕宜吳茱湯腸胃宜香稜丸即木香丁香茴香川棟子青皮廣茂三稜醋煮麵糊為丸也 吳茱湯方見首卷

胎前母子盛衰

母盛子衰胎前病母衰子盛產後殃子母和平無衰盛坦然分娩不煩忙 此言觀孕婦與所懷

之胎有盛衰之辨也若妊母氣血壯盛而胎元弱者胎前必多病若孕婦衰弱而胎元壯實則產後其母必多病若子母俱和平無偏盛偏衰則胎前產後均平安無疾可坦然無憂也

胎前有餘詳不足產後不足審有餘產後惟多虧損病胎前子母盛衰知 註古云胎前無不足產後無有餘此言其常也然胎前雖多有餘之證亦當詳察其亦有不足之時產後雖多不足之病亦當詳審其每挾有餘之症也欲知產後常多虧損之故于胎前子母盛衰求之可預知也

胎前門彙方

保生湯

人參

甘草

各二錢半

白朮

香附子

烏藥

橘紅

各五錢 右劉為末每服三錢薑五片煎服

加味六君湯

人參

白朮

土炒

茯苓

陳皮

半夏

各一錢五分製

甘草

五錢

藿香葉

枇杷葉

各一錢炙 縮砂仁

枳殼

各八分炒

右劉加生薑煎服

加味溫膽湯

陳皮

半夏

茯苓

各一錢炙

甘草

五分

枳實

竹如

黃芩

各一錢炙

黃連

八分

麥冬

根一錢

右劉薑煎服

加味平胃散

厚朴

姜汁炒

蒼朮

米泔浸

陳皮

甘草

炙

人參

各一錢

右為末每服三錢加薑煎服

延胡四物湯

當歸

川芎

白芍

熟地

各七錢五分

延胡索

二兩酒煮

右劉水煎服

加味膠艾四物湯

當歸

熟地

阿膠

白芍

各二錢炙

杜仲

五錢

川芎

斷艾

各八分

右加葱白三寸大豆淋酒

煎服

蜜硝煎

蜂蜜

芒硝

右煎溶化服

加味甘歸飲

川芎

當歸

人參

吳茱萸

阿膠

斷艾

甘草

各五分

右劉為末水煎服