

3

若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯
若腹大滿不通者可與小承氣湯微利胃氣勿令大泄
勿令大泄下蓋因脈遲故也

陽明病潮熱大便秘者可與大承氣湯不硬者不可與之若
不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹
中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭
硬後必澀不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水
則喘其後發熱者必大便秘而少也以小承氣湯和之不轉
失氣者慎不可攻也

陽明病潮熱
卷二



3

若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯
若腹大滿不通者可與小承氣湯微利胃氣勿令大泄
勿令大泄下蓋因脈遲故也

陽明病潮熱大便秘者可與大承氣湯不硬者不可與之若
不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹
中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭
硬後必澀不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水
則喘其後發熱者必大便秘而少也以小承氣湯和之不轉
失氣者慎不可攻也

陽明病

卷二

七



柯云此必因脉之遲弱即潮熱倘不足據又立談法如
胃無燥屎而攻之胃家虛脹故不能食雖復潮熱便秘
而少者以攻後不食故也要知不轉矢氣者即渴欲飲
水尚不可與況攻乎以小承氣湯爲和即以小承氣爲
試仍與小承氣爲和總是慎用大承氣耳

陽明病諸語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣
湯一升腹中轉矢氣者更服一升若不轉矢氣者勿更與之
也明日不大便脉反微滑者裏虛也爲難治不可更與承氣湯



所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人而
摸床惕而不安微喘直視脈滑者生濇者死微者但
語大承氣湯主之若一服利止後服

六次其實其氣其也

既云實則譫語矣乃其用治遲徊審諦始以和法為攻
法候服藥後重辨脈症不致徑情急攻即攻之又一服
利止後服何其鄭重耶可見所謂實者乃邪氣實也邪
氣實正氣未有不虛者況津液為邪所耗而至於諸語
方寸幾於無主其虛為何如哉邪實不可不下正虛不



可大下，斟酌於邪正之間，以權宜而善其治，良工苦要當三複於聖言矣。喻註

陽明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕則譫語。小承氣湯主之。若一服譫語止，更莫復服。

此汗多胃燥，非同實治也。

汗多是胃燥之因，便硬是譫語之根。一服譫語止，大便雖未利而胃濡可知矣。

下利譫語者，有燥屎也，亦小承氣湯。

下利則熱不結，胃不實，何得譫語耶？此必內有燥屎故。



宜小承氣微動其結耳

汗出譫語者，以有燥屎在胃中，此為風也，須下之。此是為太陽病，風邪之傳也。
下之，下之若早，語言必亂，表虛裏實故也。下之則愈。此是為太陽病，風邪之傳也。

過經乃可下之，必是太陽之邪已過陽明之經而入陽明之腑，乃可下之，非謂必待十二三日之後也。
陽明病譫語有潮熱，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也，宜大承氣湯下之。若定食者，但硬耳。



反不能食，此必熱傷胃中津液，氣化不能下行，燥屎
攻於胃之故也。

陽明病下之，心中懊憹而煩，胃中有燥屎者，可攻之。宜大承
氣湯，腹微滿，初頭硬後必溏，不可攻之。

病人不大便五六日，繞臍痛煩燥，發作有時者，此有燥屎故
也。

病人小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘冒不能臥者，有
燥屎也。亦大承氣湯。

此症不宜妄動，必以手按之，臍腹有鞭塊，當宜下之。



方可攻之何也。乍難乍易故也。

大下後六七日不大便，煩不解，腹滿痛者，此有燥屎也。然者，以本有宿食故也。宜大承氣湯。

脈滑而數者，有宿食也。當下之，宜大承氣湯。

腹滿不減，減不足言，當下之，宜大承氣湯。

二陽併病，太陽證罷，但發潮熱，手足濇然汗出，大便難而語者，下之則愈，宜大承氣湯。

先渴二陽併病，見太陽未罷時，便有可下之症，發汗不解，腹滿痛者，急下之，宜大承氣湯。



陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

程云此等之下皆爲救陰而設不在奪實奪食之下有緩救陰之下不可緩

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏症大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

急在目中不了了睛不和上以陽明之脈絡於目絡中

之邪且盛則在經之盛更可知故惟有急下之而已

少陰病得之二三日不大便口燥咽乾者急下之宜大承氣

湯



病纔二三日，卽口燥咽乾，則腎水之不足，土供可知矣。至五、六日而始下，必枯槁難回矣。故以急下以救腎也。

少陰病，自利清水，色純青，心下必痛，口乾舌燥者，急下之，宜大承氣湯。

全在口乾燥上，見熱傷陰液也。若口不乾燥，則自利清水，色純青，形色雖有可疑，未必急許以大承氣湯也。陽邪傳白上焦，其人心下必痛，口必乾燥，設係陰邪，必心下滿而不痛，口中和而不燥，必無此枯槁之象，故宜



急下以救陰也。喻註

少陰病六七日，腹脹不大便者，急下之，宜大承氣湯。

喻嘉言曰：少陰有急下三法以救腎水，一本經水竭，一

木邪涵水，一土邪凌水。陽明亦有急下三法以救津液，

一汗多津越於外，一腹滿津結於內，一眼睛不慧津枯

於中。合兩經下法以觀病情生理，如身在冰壺，服飲上

劑矣。此註最精，亦熟讀之。

調胃承氣湯

大黃 貳兩
炙甘草 貳兩
芒硝 半斤



右三味，以水三升煮取一升，去滓，內芒硝更上，微煮，令沸，少少溫服。

大承氣湯

大黃

肆兩

厚樸

半斤

枳實

伍枚

芒硝

叁合

水一斗，先煮二物，取五升，去滓，內大黃煮二升，去滓，內芒硝，上火微二三沸，分溫再服，得下，餘勿服。

小承氣湯

大黃

肆兩

厚樸

貳兩

枳實

叁枚

水四升，煮取一升二合，分溫三服，初服湯，當大便不利。



者盡飲之若得大便秘服

少陽脉症

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

口咽目三者不可謂之表又不可謂之裏是表之入裏裏之出表處所謂半表半裏也三者能開能闔開之可見闔之不見恰合樞機之象故兩耳爲少陽經絡出入之地苦乾眩者皆相火上走空竅而爲病也柯註透快太陽主表頭項痛爲提綱陽明主裏胃家實爲提綱

少陽病半表半裏之位又特揭口苦咽乾目眩爲辨
奇而至當也

傷寒病脈弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不可發汗發汗

則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而燥

少陽症全從脈弦細上見

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下

則悸而驚

少陽惟亦和解若吐之則虛其陽而悸下之則虛其陰

程註



傷寒三日少陽脉小者欲已也

少陽病欲解時從寅至辰上

太陽與少陽併病脉眩頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞
硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則譫語
若譫語不止當刺期門

太陽少陽併病心下硬頭項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞
慎勿下之

上條言不可汗此條言不可下總見一有少陽便當禁
之

太陽少陽併病而反下之成結胸心下硬下利不止水瀉
下其人心煩

若不知禁戒而反下之邪氣內陷定成結胸而心
硬矣然不止此也必寒阻於下而下利不止熱隔於
上而其人心煩上下阻隔水漿將何以下乎

柴胡湯症

傷寒五六日中風往來寒熱_{中表}胸膈苦滿_{半裡}不欲飲食心煩
喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心中
悸小便不利或不渴身有微熱或咳者小柴胡湯主之

傷寒論卷二



修治胃氣

卷二

五句 擇和陽音通之用

血弱氣虛，腠理開邪氣因入，與正氣相搏，結於脇下，正邪分

二句 擇和陽音通之用

此下兩句 擇和陽音通之用

爭往來寒熱，體作有時，默默不欲食，飲藏腑相連，其痛必下

邪高痛下，故使嘔也。

小柴胡湯

柴胡 半斤

半夏 半升

人參

甘草

黃芩

生薑

各參 大棗 拾貳

兩枚

以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，

日三服。

若胸中煩而不嘔者，去半夏，人參，加橘薑黃一枚。

