

聖濟總錄

吳錫瑣著

大法重校聖濟總錄卷第七十九

水病門

水腫統論

論曰內經謂腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類上下溢於皮膚而為附腫附腫者聚水而生病也其狀目裏上微腫若新卧起然頸脉微動時作欬嗽股冷膚腫口苦舌乾不得正偃僵則欬清水不得卧而驚而欬甚則小便黃溢以手按腫處隨手而起如裹水之狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者可治微細者難醫水病有不可治者五脅黑傷肝一也缺盆平傷心二也臍出傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之氣內槁五陽之氣不得宣通如是則水道不利飲濕攻脾散於肌肉而為水腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾腎氣虛不能制水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時作咳嗽不得安卧小便黃溢以手按腫處隨手而起是也

治水病不限年月深淺洪腫大喘幾不能度日防已飲方

防已

一分

大戟

炒

木香

赤茯苓去皮  
黑海蛤

作三片摻藥末在內用濕紙裹慢火煨令香熟先煮葱白三莖令熟細切將  
葱與粟米同煮粥一椀先食粥一半方食腰子藥後再食粥令盡臨卧服如  
至五更大便并小便下赤黃惡物乃驗

治水氣腫滿奪命丸方

大戟

炒半分

苦葶藶

生半兩一半熟

澤瀉

一分

右四味搗羅為末煮粟肉和丸梧桐子大若四肢腫者名為順水溫漿水下  
三丸星月上時服至天曉利下惡物若四肢瘦腹腫者名為逆水煎苦葫蘆  
子陳廻湯下三丸小便頻快是效三日後服補藥礬石丸

治水病補藥礬石丸方

白礬

半兩

雄黃

研各

丹砂

研各

右三味搗羅為末粟米飯和丸菉豆大丹砂為衣每服五丸至七丸食前生

薑湯下日二

治水氣腫滿檳榔散

檳榔

生二枝

郁李人

去皮

芫花

炒

甘遂

炒

續隨子

木通

剉各

海蛤

一錢

陳橘皮

焙去白

商陸

各一

右九味搗羅為散每服一錢七溫酒調下臨卧服至五更取下惡物為驗  
治水腫久不差大戟丸方

大戟炒

陳橘皮去白焙

巴豆七粒去皮大麥內

各一分

炒熟不用大麥

右三味搗羅為末用大麥麪糊丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下空心日晚服

治水腫腹滿二氣湯方

牽牛子半兩生用

甘遂微炒一錢

右二味麞搗篩分作二服每服水一盞煎至五分放溫細呷不計時

治水腫大黃湯方

大黃剉碎

炒二兩醋桂皮去龜

甘草剉

人參

細辛去苗葉各一兩

桑根白皮剉二兩

炒失黃色

甘草剉

人參

細辛去苗葉各一兩

右六味麞搗篩每服用水三盞藥五錢匕入棗二枚擘破同煎至九分  
入白鶲一匙頭更煎一沸溫服日三利小便三五升即差

治水腫及支滿汗飲芫花湯方

芫花炒黃

大黃剉碎

炒一錢

甘遂炒

甘草剉

大戟去皮微炒各一兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同煎至九分下芒消半

錢匕更煎一沸去滓溫服以利為度

治水氣面目浮腫因虛勞脚氣所致鼈甲湯方

鼈甲

去裙爛醋  
炙焦二兩

人參

當歸切  
苗去皮半兩

當歸

培

枳殼

各二兩  
去瓢炒

甘草

炙半兩

桃人

七枝湯去皮  
浸白欖榔枝

大黃

剉碎  
炒

右八味麤擣篩先用小便二盞浸藥三錢已經半日前取七分去滓溫服以差為度婦人病狀同者加牛膝半兩

治水腫利小便郁李人丸方

郁李人

湯浸去皮尖  
微炒參分

海藻

洗去  
鹹炒

桂

各半兩  
去麤皮

大黃

剉碎  
炒

葶苈

紙上炒令紫色  
各一兩一分

黃連

去頭  
半兩

木通

剉

石韋

去毛  
各一分

松蘿

分參

右九味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十五丸日三稍增以知為度治水腫麝香丸方

麝香

研半  
分

芫花

炒黃  
分

甘遂

微炒去  
皮半兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大強壯人酒下一十五丸老弱人十九丸治水腫利小便商陸丸方

商陸微久  
兩半一  
芒消研  
西一

甘遂微  
炒

大黃剉碎  
醋炒

芫花炒微

蕘花炒各  
參分

麝香研  
錢四

豬苓去黑皮  
一兩

右八味搗羅為末鍊蜜梧桐子大每服米飲下五丸日三服以微利為度華佗方酒客虛熱當風飲冷腹冷脹滿加麝香豬苓各一兩

治水腫眠卧不得防已丸方

防已

海蛤研  
一兩

葶藶一斗  
蒸熟

杏仁六十枚  
皮尖炒別搗湯浸去

甘遂六十枚  
炒微

甘遂一分  
炒微

右五味先將葶藶杏仁一處拌和後以三味搗羅為末再研勻入棗肉和丸梧桐子大每服米飲下二十丸漸加至二十五丸以微利為度其疾不過五六日即差

治水腫久不差藁本丸方

藁本去苗  
上

草薢炒  
一分

大戟微  
炒

蜀椒去目及頭口  
者炒出汗

澤漆微  
炒

巴豆去皮心  
炒出油盡

赤小豆微  
炒

澤瀉各半  
雨

甘遂微  
炒

牽牛子炒熟  
一分

連翹微  
炒

半兩

右十一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下一丸加至二丸服後小便多白色即住

治水腫桑白皮丸方

桑根白皮

取上有白根者北陰下  
根白皮剉炙黃二兩

郁李人

湯去皮炒商陸微  
火

葶藶

紙上炒令紫色牽牛子熟

巴豆

清水煮一日去皮心  
膜出油盡各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服茶湯下十五丸利三五行見效即止

治水腫檳榔丸方

檳榔

微炮裂去皮剉

吳茱萸

水浸暴乾炒厚朴

去粗皮塗薑汁炙

乾姜

防已

甘草

炙各一兩

葶藶

紙上炒

杏仁

浸去皮尖

雙人炒

椒目

炒剉微去皮

赤茯苓

去黑皮洗去鹹汁

黃耆

炒剉

麻黃

去根節炒

桔梗

去皮剉

白术

炒剉微去皮洗去鹹汁

海藻

各一兩半

桂皮

右十七味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十九日三稍增至十五丸未知加至二十五丸得大小便利為驗此方兼療老小虛腫大病後客腫作喘

治水氣腫滿服商陸豆方

生商陸

切如赤小豆與商陸等分

鯽魚

參枝去腸存鱗

右三味將二味實魚腹中以綿縛之水三升緩煮豆爛去魚只取一味空腹食之以魚汁送下甚者過二日再為之不過三劑

治水氣逐氣散方

白商陸去皮薄切暴乾

右一味搗羅為散用黃穎魚三枚大蒜三瓣菉豆一合水一升同煮以豆爛為度先食豆飲汁送下又以汁調下藥散二錢止水氣內消

十水

論曰十水之病腫從脚起上氣而效名為白水其根在肺腫從面目起名為青水其根在肝腫從腹起名為黃水其根在脾腫從腳趺起名為黑水其根在腎腫從心起名為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去乍來其根在大腸腫從頭上起至足名為垂水其根在膽腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹起名為裏水其根在少腸凡此十水生於藏府各從其根究其所本則肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤於內氣耗於外形不可與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺肺氣孤危腎為水害子不救母故陰精損於內陽氣減於外三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之法備見於內經故曰平治權衡去菀陳莝微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保

巨氣乃平也

治水腫十水丸方

椒目

微炒治  
白水

大戟

炒治  
青水

甘遂

麸炒治  
黃水

玄參

治黑  
水

葶苈

炒治  
赤水

芫花

醋炒治  
氣水

赤小豆

治垂  
水

桑根白皮

火剉治  
石水

澤瀉

治風  
水

巴豆

去心皮膜研  
出油治裏水

右一十味等分隨病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮壓去油搗  
研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸米飲下以水下為度未下日三服既  
下當節飲但得食乾物耳

又十水丸方

大戟

炒治  
清水

葶苈

炒治  
赤水

甘遂

炒治  
黃水

藁本

去苗土  
治白水

連翹

梗治  
黑水

芫花

炒令焦  
水

澤漆

葉治  
風水

桑根

白皮  
火剉治

白皮

石水

巴豆

去皮心  
油治裏水

赤小豆

水  
治氣

右一十味等分隨證所主倍之搗羅為細末鍊蜜丸如小豆大每服三丸至  
五丸米飲下日三人弱者以意節之

治十種水病百方不愈而目四肢俱腫氣息喘急寢卧不得小便漸澀腹脹氣

悶水不入口垂命欲死者舊名葶藶散賜名神助散方

板目微炒  
三兩

豬苓去黑皮  
兩

澤瀉各四兩

牽牛炒令香  
五兩

苦葶藶紙上炒  
六兩

右五味搗羅為散每服三錢匕以葱白三莖漿水一盞煎取半盞入清酒半盞攪勻稍熱調下空心服良久即熟煮漿水葱白粥二盞更入清酒一盞攪勻面東熱吃令盡至午後小便或大便通利喘定腫減隔日再服百日消盡

治十種水氣檳榔丸方

檳榔炮剉  
三箇

大戟剉炒  
半兩

牽牛子炒  
炒各

滑石碎

海蛤

瞿麥穗

旋復花

甘遂一分

右八味搗羅為末用軟飯和丸如菉豆大每服七丸至十九丸煎商陸湯下若作散每服一錢匕亦煎商陸湯調下如取利動繼服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶炒  
各一分

杏人不去皮  
各一錢

右二味搗研為細末麪糊和丸如小豆大每服十五丸煎杏人湯下

治十種水病三消丸方

朴消色青白者  
熟二兩

芒消色青者  
一兩

消石色青白燒之有金色者  
同上二味研令極細  
各

犀角 鎏

椒目

微炒各一兩 摘羅為  
末合三消重研令匀

草庵 紙上炒

葛粉子一兩炒各

杏仁

去皮尖雙人炒二兩以上三  
味別搗末更與諸藥合搗干杵

右八味用大棗十一枚煮熟去皮核炒令水脉泣盡和為劑或鞭即添少許  
熟蜜杵千下為丸如小豆大每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十九以  
利為度不宜食飽衝冒霜寒并單衣服受風冷雖夏中亦宜就溫禁食鹹味  
難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近生產房室等事惟得喫粳米粟米慈薤  
生薑橘皮禁鹽一年永不發動

治十種水病大海藻湯方

海藻

洗去  
鹹焙

芫花

炒焦

豬苓

去黑

連翹

澤漆

炒

郁李仁

去皮尖  
雙人研

陳橘皮

洗去  
湯浸

大戟

炒

桑根白皮

剉

白蒺藜

炒各  
兩  
蓬本

去苗  
土

昆布

洗去  
鹹焙

防已

炒

葶苈

炒  
去皮尖

甘遂

炒

杏仁

去皮尖  
雙人  
炒各半兩

檳榔

煨剉  
七枚

右一十八味麞搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一棗大柏碎同煎至八分  
去滓空腹溫服日三以利為度

治十種水氣偏身洪腫氣喘小便赤澀檳榔湯方

檳榔煨剉  
三枚

牽牛子炒  
半

葶藶隔紙  
炒

桑根白皮炙剉各  
一兩

防已

豬苓去黑皮  
各三分

右八味麞搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓空

心溫服日三以利為度

治十種水氣防已檳榔丸方

防已

檳榔煨剉

郁李人去皮尖炒  
研各三方

葶藶紙上炒  
半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服十九至二十九丸空心用後方

葶藶湯下

葶藶湯方

葶藶子炒  
炙

桑根白皮

百合剉各一  
兩

右三味麞搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分下前藥日三以小便利為度  
若鼓氣微結加甘遂一兩

治十水大黃丸方

大黃炒  
半兩

消石

大戟去皮  
炒

甘遂炒  
各一兩

芫花醋炒  
半兩

椒目炒出汗 莩蔴炒各一分

右七味搗羅為末，鍊蜜和丸，如小豆大。每服一丸，空心桑根白皮湯下。日再漸增以知為度。

治十種水氣木香湯方

木香

陳橘皮

湯浸去白焰

白术

桑根白皮

桂去麌皮半兩

木通

剉炒三分

右六味麌搗篩別用牽牛子二兩於鐵錠內以紙襯手攬乘熱搗羅為末。每服以前藥末三錢，匕同牽牛末一錢半，七水一盞半煎至八分去滓，五更溫服。平明時喫熱生薑茶粥次，用蕪荑桑根白皮各一分，煮白羯羊肉半斤，爛熟與喫。

治十種水氣神妙湯方

懷香子炒

烏藥

湯浸去白焰

青橘皮

湯浸去白焰

高良薑各一分

右四味麌搗篩每服五錢，匕用童子小便半盞，酒一盞同煎至一盞去滓，稍熱服不拘時。

治十水定喘急防已丸方

防已

陳橘皮  
湯浸去白焰

大戟  
炒

苦葶藶  
紙上炒各半兩

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸溫熟水下不拘時治十種水氣腹脹比聖餅子方

大戟

甘遂  
各一兩

右二味生搗羅為細末每服一錢匕以大麥麪一兩新水和作餅子燒熟每五更徐徐爛嚼茶下移時小便多是効未退再服

治十種水氣四石丸方

滑石

井泉石  
研

寒水石  
研

硇砂

研細水和作餅子用濕麪四兩  
裹藥餅燒紫色去麪各二錢

白丁香  
半兩

續隨子人  
錢

右七味搗研為末麪糊丸如梧桐子大每服五丸生薑湯下第一日三服第二日四服第三日五服以利為度利已以次藥補之

取下水氣補藥木香丸方

木香

青橘皮  
湯浸去白焰

蓬莪茂  
錢

右三味同為末麪糊丸如菜豆大每服十九丸白湯下

治十種水氣靈寶丸方

滑石  
好白者  
二兩

膩粉  
一兩

右二味先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜濃汁成膏和丸如菉豆大每服七丸五更空心溫米飲下日只一服服至五七日覺臍腹撮痛小便多為效忌鹽一百日覺效便服補脾胃藥

治十種水氣大通三焦此方神仙經中所載天台山金壇石室中鑄紀但令人忘口無不差者再蘇丸方

大戟  
炒

甘遂  
炒

巴豆  
去心  
炒出油  
膜

炒出  
盡

乾薑  
炒

桂皮  
去  
麌

大黃  
剉炒各半兩

春大麥  
炒兩半

炒出  
盡

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆每服十九丸空心茶下以利為度治氣水心下痞緊喘息氣急大腸秘滯鼈甲飲方

鼈甲  
去裙  
肉

醋  
糊

訶黎勒皮  
煨

郁李人  
研

赤茯苓  
去黑皮各一  
兩半

桑根白皮  
炒

吳茱萸  
湯洗  
焙乾

各一  
兩

檳榔  
剉四

右七味麌搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五

里再服

治氣水頭面俱腫四肢無力小便濇海蛤丸方

海蛤

研一  
兩半

消石

研二  
兩

葶藶

微炒研一  
兩半

杏人

炒黃研一  
兩

湯去皮尖雙人

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服十九食前煎木通湯下日

二服

治氣水四肢不和面目浮腫小便濇氣急促檳榔飲方

檳榔

剉五  
枝

桑根白皮

炒陳橘皮  
白焙

防已

湯去皮  
焙

郁李人

研各一  
兩半

木通

剉二  
兩

右七味麌搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五

里再服

治氣水面目浮腫胸滿短氣小便不利桑白皮飲方

桑根白皮

炒赤芍藥

郁李人

研

百合

各一  
兩半

木通

剉二  
兩

右六味麌搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

涌水

論曰內經言肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴

灌灌如囊裹漿水然也夫腎為肺之子而主水大腸為肺之府而為傳道之官  
肺受寒邪宜傳於腎腎受寒邪則其水閉鬱而不流且無所歸故客於大腸而  
不下夫水性流下今乃客於大腸不得宣通宜其證涌溢如囊裹漿也

治涌水腹中動搖作水聲兼瘦飲腹胸脹滿旋復花丸方

旋復花

桂皮去麤

枳實去瓢炒

人參各一兩

乾薑炮

芍藥

白术各二兩

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心

烏頭炮裂去

礬石各二兩

細辛去苗葉

大黃剉炒

黃芩去黑心

草薑隔紙炒

厚朴去麤皮

薑汁炙

吳茱萸湯浸

洗炒

茺蔚醋浸半日

炒焦陳橘皮湯浸去白皮

焙各一兩甘遂分

右二十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸酒下日二不知稍加丸數以知為度

治涌水腹滿大黃附子丸方

大黃剉炒

旋復花

附子炮裂去

赤茯苓去黑皮

椒目

桂皮去麤

茺蔚醋浸

細辛去苗葉炒

狼毒各二兩

乾薑炮

芍藥

枳實去麤

細辛去苗葉炒

右十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸熟水下漸增之早晚

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)