

傷寒雜證謨

景岳全書

卷八十九



景岳全書卷之八須集 傷寒典

會稽 張介賓 會卿著

古吳 竇超 梧朝生氏訂

傷寒 下

溫病暑病 三十三

溫病暑病之作本由冬時寒毒內藏故至春發爲溫病至夏發爲暑病此以寒毒所化故總謂之傷寒仲景曰發熱不惡寒而渴者溫病也暑病則尤甚矣蓋暑病者卽熱病也是雖與寒證不同然亦因時而名非謂其病必皆熱也此外如夏月中暑者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

亦謂之暑病則又非寒毒蓄留之證在仲景即名之爲中暍後
詳暑證門所當參閱

一溫病暑病之治宜從涼散固其然也然必表裏俱有熱證方
可治用清涼若值四時寒邪客勝感冒不正之氣表邪未解
雖外熱如火而內無熱證可據者不得以溫暑之名執以爲
熱而槩用涼藥

一冬有非時之煖或君相客熱之令而病熱者名曰冬溫此與
冬月正傷寒大異法宜涼解此舍時從證也

若夏有寒者其
宜溫亦然

素問刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑傷寒
論曰脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑此二論之言

傷寒傷暑者非卽溫病暑病之謂蓋單指夏月感觸時氣
所當辨其爲寒爲暑而寒則宜溫暑則宜清也身寒者言受
寒憎寒身熱者言受熱發熱非曰身冷者方是傷寒身熱者
乃是傷暑也但此二論則一曰氣盛氣虛一曰脉盛脉虛詞
若異而理則一也故凡察氣者當在形色察脉者當在本元
合而觀之則見理精矣

發班三十四

發班證輕則如疹子重則如錦紋其致此之由雖分數種然總
由寒毒不解而然如當汗不汗則表邪不解當下不下則裏邪
不解當清不清則火盛不解當補不補則無力不解或下之太

早則邪陷不解或以陽證誤用溫補則陽亢不解或以陰證誤用寒涼則陰凝不解凡邪毒不解則直入陰分鬱而成熱乃生液涸血枯斑見肌表此實毒邪固結營衛俱劇之證也但斑有微甚勢有重輕輕者細如蚊迹或先紅而後黃重者成粉成片或先紅而後赤輕者只在四肢重者乃見胸腹輕者色淡而隱重者色紫而顯若見黑斑或大便自利或短氣或二便不通十死九矣凡病傷寒而汗下溫清俱不能解及足冷耳聾煩悶欬嘔者便是發斑之候

一成無已曰大熱則傷血熱不散裏實表虛熱邪乘虛出於皮膚而爲斑也慎不可發汗若汗之重令開泄更增斑爛也自

後諸家所述皆同此說予則以爲不然蓋凡傷寒之邪本自
外而入深入不解則又自內而出此其表裏相乘勢所必至
原非表虛證也但使內外通達則邪必由表而解矣卽如犀
角地黄湯乃治斑之要藥人知此湯但能涼血清毒而不知
此湯善於解表散邪若用之得宜則必通身大汗熱邪頓解
何爲不可汗耶由此言之則凡脉數無汗表證具在者必須
一凡治發斑須察表裏如瘟疫不解熱入血室舌焦煩熱發斑
者犀角地黄湯○內外俱熱陽明狂躁大渴發斑者白虎湯
或加入參○陽毒赤斑狂言見血者陽毒升麻湯○疫癘發
斑大熱而燥者三黃石膏湯○火鬱於經寒邪不解脉仍滑

數而發斑者一柴胡飲○陽明外邪陽毒不解者升麻湯○
脾腎本虛外邪不解而發斑者五柴胡飲○陽明表邪不解
溫熱發斑者柴胡白虎煎○溫熱毒盛咽痛發斑者玄參升
麻湯○陰虛水虧血熱發斑者玉女煎○陰虛血燥大熱大
渴發斑者歸葛飲○內虛外實陰盛格陽發斑者大溫中飲
○太陽陽明惡熱大便秘結邪毒在府發斑者調胃承氣湯
一凡本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解予常用大
溫中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪達多有見
赤斑風餅隨汗而出隨出隨沒頃刻即愈活者多人矣凡寒
毒爲斑即此可見使內托無力則此毒終無出期日深日甚

難乎免矣此理甚微不可不察

發黃三十五

凡發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹滿不痛或大便實而渴甚脉來沉實有力皆溫熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃自退矣然黃有陰證及諸治法俱詳黃疸門宜參用之

仲景曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之則爲結胸若不結胸但頭汗出小便不利身必發黃也○曰陽明病無汗小便不利心中懊惱者身必發黃○陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭

汗出身無汗際頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之○曰傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者爲陽明病也○曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之○傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

孫真人曰黃疸脉浮者當以汗解之宜桂枝加黃耆湯

發狂三十六

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂而實非狂此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡實熱之狂本屬陽明

蓋陽明爲多氣多血之經陽邪傳入胃府熱結不解因而發狂
內經陽明脈解篇曰胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其
惡火者熱甚則惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡
人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋
者以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣
而走者以熱盛於身也其妄言罵詈不避親疎而歌者以陽盛
爲邪也又曰陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂又曰邪入於陽
則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令神志昏亂若此此陽狂
也然傷寒病至發狂是爲邪熱已極使非峻逐火邪則不能已
故但察其大便鞭結或腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承

氣或涼膈散六一順氣湯之類下之可也如無脹滿堅實等證

而惟胃火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其愈

一如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不

解熱結膀胱其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外

已解但小腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯○又曰太陽

病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人如狂者以熱

在下焦少腹當鞭滿少便自利者下其血乃愈抵當湯主之

按此二條以太陽熱邪不解隨經入府但未至發狂故曰如

狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

一近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失

志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失精
而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其
本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證
如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之
氣內無胸腹之結滑實之脈雖或不時躁擾而禁之則止口
多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則口
無焦渴察其下則便無鞭結是皆精氣受傷神魂不守之證
此與陽極爲狂者反如冰炭而時醫不能察但見錯亂便謂
陽狂妄行攻瀉必致殺人凡治此者須辨陰陽其有虛而挾
邪者邪在陽分則宜補中益氣湯之類邪在陰分則宜補陰

益氣煎之類虛而無邪者在陽分則宜四君八珍十全大補
湯大補元煎之類在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之
類陰虛挾火者宜加減一陰煎二陰煎之類陽虛挾寒者宜
理中湯回陽飲八味湯右歸飲之類此方治之宜大畧如此
而變證之異則有言不能傳者能知意在言表則知所未
一凡身有微熱或面赤戴陽或煩燥不寧欲坐臥於泥水中然
脉則微弱無力此陰證似陽也名爲陰躁蓋以陽虛於下則
氣不歸原故浮散於上而發躁如狂速當溫補其下命門煖
則火有所歸而病當自愈若醫不識此而誤用寒涼者必死
一發狂下利譫語者不治○狂言反目直視者爲腎絕死○汗

出後輒復熱狂言不食者死

風濕三十七

仲景論曰太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺其人
小便不利大便反快但當利其小便○曰濕家之爲病一身盡
痛發熱身色如熏黃○濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向
火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸
中有寒渴欲得水而不能飲目燥煩也○濕家下之額上汗出
微喘小便不利者死利不止者亦死
論曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫
云此可發汗汗之病不愈者何也曰發其汗汗大出者但風

氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也○濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈○病者一身盡疼發熱日晡所劇者



論曰傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之○若其人大便鞭小便自利者桂枝湯去桂加白朮主之○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

結胸三十八

仲景曰病有結胸其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也○曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也○曰結胸脉浮大者不可下下之即死○曰結胸證悉具煩躁者死亦論曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者未解也醫反下之胃中空虛陽氣內陷心下因鞅而爲結胸大陷胸湯主之○曰太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞅滿而痛不可近者大陷胸湯主之○按此二條皆言太陽表證未解

因誤下之而成結胸也

論曰傷寒五六日嘔而發熱者此柴胡湯證具而以他藥下之其柴胡證仍在者當復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯○按此一條以少陽表證未解因誤下之而成結胸也

論曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不入其人煩心○按此一條以太陽少陽併病二經表邪未解亦因誤下而成結胸也

論曰陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止