

痘科類編 卷四

S 2551

748

痘科類編釋意卷之四

革集

痘症變態多端疹則收斂稍易然疹之甚者凶危亦不
少減于痘况疹者痘之末疾故翟氏于痘症之後附馬
氏疹科纂要疹子之名惟北直稱之吾浙杭諸郡曰瘡
浙西嘉禾與江左蘇松曰沙子江右湖廣曰麻山陝曰
膚瘡糠瘡名雖不同其症則一但疹在痘前者痘後必
復疹惟痘後者方爲結局

約齋補

附疹科纂要

目錄

麻疹通論 一

麻疹證治大畧 二

麻疹潮熱症治 三

麻疹出後傷風 四

麻疹汗渴飲水 五

麻疹出後煩躁 六

麻疹出後譫語 七

麻疹出後喘嗽 八

麻疹喉痛失音 九

麻疹嘔吐腹痛 十

麻疹出後泄瀉 十一

麻疹出後痢疾 十二

麻疹出後便血 十三

麻疹飲食瘡毒 十四

麻疹後蓋痘疹 十五

疫癘發癰夾疹 十六

傷寒發癰癰疹 十七

孕婦麻疹發癰 十八

痘水痘症治

十九

附聶久吾治疹大法

經野堂

附麻疹四忌

二十一

附高士宗論治疹

二十二

益都翟

良定

武林約齊

疹科纂要

麻疹通論

大嬰兒麻疹固與痘瘡大不相同亦與癰疹癰疹並不相

同蓋麻疹亦屬胎毒乃係六腑蘊蓄積熱發自脾肺二經

或受風寒或傷飲食時氣感觸煽動心火燔燥肺金肺主

皮毛故其邪發于皮膚之上出為細疹遍身皆占

麻疹初起急治

麻疹出後傷風

四

麻疹汗渴飲水

麻疹出後煩躁

六

麻疹出後露語

麻疹出後喘嗽

八

麻疹喉痛失音

麻疹喉吐腹痛

十

麻疹出後泄瀉

麻疹出後痢疾

十二

麻疹出後驚風

麻疹出後食積

十四

麻疹四忌

州高士宗簡

二十二

水壅壅

州聶人音

二十

十六

痘科類編釋意卷之四

革集

綠野堂

邯山馬之騏纂

武林約齋爾定裴經校訂重鐫

益都翟良定

疹科纂要

麻疹通論一

夫嬰兒麻疹固與痘瘡大不相同亦與癍疹癰疹並不相同蓋麻疹亦屬胎毒乃係六腑蘊蓄積熱發自脾肺二經或受風寒或傷飲食時氣感觸煽動心火燔爍肺金肺主皮毛故其邪發于皮膚之上出爲細疹徧身點點紅色甚

則疊腫有小顆粒隨出隨沒沒則又出俗名糠瘡又曰麩瘡其症初發熱時畧類風寒其實大異亦與痘症相似但痘瘡自裏而出于五臟臟屬陰其病本深難出難收故有形有漿麻疹自表而出于六腑腑屬陽其病本淺易出易收故有形無漿然多實熱無寒又有戰慄似寒者乃熱極生陰反作寒狀耳切不可作寒症治之雖較痘瘡爲易然倏忽變化其症急速自初出一二日以及愈後月餘虛者百日皆不可以其易而忽也經曰痘前疹後信哉

若初生嬰兒未及滿月或百日內外或未生痘瘡之先徧

身發出紅點如粟米狀滿月內外名爲爛衣瘡百日內外及未生痘瘡之先名爲瘙疹蓋兒在母腹中爲陰血之氣薰蒸已久生後忽遇陽風一逼遂發此疹不治自愈

若痘瘡愈後起居不節飲食過度外感風寒痘愈數日之後身忽畧熱徧身卽出紅點大小不一亦如粟米之狀作癢愈抓愈盛如雲成片名爲雲頭疹又名蓋痘疹非眞疹也勿以爲眞疹而畏之

若天行疫病大人小兒感之大便秘結熱氣流于胃中忽發紅痧隱于皮膚之內有色點而無顆粒如蚊蚤之迹錦

紋之狀者無頭且平名曰發癰其症有陽毒陰毒之殊總皆熱毒所致非真疹也不可與疹同治無顆粒係陽明之癰法當清解誤用發散如火上澆油熱勢外烈多致枯焦紫黑而死

若感冒時氣頗類傷寒俗名紅眼汗病係心火爍乎肺金紅點隱于皮膚之間發則多癢或不仁者是有風濕之殊色紅者火也亦皆熱毒所致其症多屬于脾狀隱隱然故名曰癰疹非真疹也亦不可與疹同治

麻疹症治大畧 二

麻疹爲實熱之症屬在于肺其發也多因風熱兼痰而作浮于皮膚有小顆粒隨出隨沒沒則又出故雖值寒天亦不可重加衣被而過于熱恐毒入咽喉令其聲啞麻疹不出致有變症爲害不小治療之法宜清肺火降痰主乎解散惟以發表出透爲妙汗之卽愈亦有可下者但忌認作傷寒妄汗妄下汗之則增其熱爲鼻衄爲欬血爲口瘡咽痛爲目赤痛爲煩躁爲大小便不通下之則虛其裏爲滑泄爲滯下多致不救慎之慎之故初熱時先宜發散次清

利次清熱次補血蓋發散則風熱解清利則肺金清清熱則心火瀉免致金受火尅則症自輕然麻疹屬陽熱甚則陰分受損血多虛耗必宜滋養陰血此首尾所以當瀉心火清肺金散風熱滋陰血爲主不可少動其氣宜通聖散一百九

一 中消息用之如人參白朮半夏一切燥悍之藥皆不可用卽升麻升動陽氣上冲亦不可多用蓋麻疹標屬陰而本屬陽也蓋麻疹未愈輕用溫熱燥悍之劑多致牙齦腫爛雖氣血虛弱亦必待麻疹愈後方用補虛養血調理脾胃之藥斯乃萬無一失不則毒氣壅遏頓生奇禍不可

不慎此治麻疹之大端也

不與否同

否則毒氣壅遏

此言麻疹之毒氣壅遏於肺，則肺氣不宣，而咳嗽不止。若不早治，則毒氣入於心包，則神志昏迷，甚至死亡。此言治麻疹之大端，在於清肺解毒，使毒氣有出路，而不致壅遏於內。此言治麻疹之大端，在於清肺解毒，使毒氣有出路，而不致壅遏於內。

麻疹潮熱症治 三

麻疹初發時畧類傷寒而又迥異也蓋其憎寒壯熱頭痛
臉赤目赤額紅身體疼痛此畧類也至于火熱太盛多咳
嗽噴嚏鼻流清涕眼光如水眼胞浮腫眼角生眵眼淚汪
汪惡心乾嘔恒欲飲水或痰涎吐瀉不思飲食大便急而
小便澁則皆熱之所致爲迥異耳然有熱一二日而出者
有發熱五六日而出者或有發熱七八日而出者症候未
明疑似之際但覺潮熱卽宜升麻葛根湯 二 加紫蘇葱白
一根煎服或參蘇飲 三 去人參半夏陳皮腹痛仍用陳皮

加砂仁煎服被蓋微表之得汗自頭至足方漸漸減去衣
被則皮膚通暢腠理開豁自無留毒而疹易出矣若有未
出亦不可再表

既表之後卽宜謹避風寒勿食生冷戒忌酒肉雞魚一切
腥葷等物如外犯風寒內傷腥冷輕則癰疹生痰嗽成驚
搐重則皮毛閉塞毒氣難出遂變紫黑而死矣

如食酒肉雞魚腥葷等物則毒入脾胃必主麻疹後生瘡
癰下流大腸爲泄瀉自痢等症流入小腸則小水赤澀爲
血痢等症俗謂白痢屬冷血痢屬熱者非也戒之戒之

麻疹未出時發熱吐瀉交作三日內出耳後項上腰腿先
出一日出三次二日再出三次見點紅活顯露形小明淨
頂尖不長隨出隨沒三四日方收者順症也不治自愈

麻未出時發熱乾霍亂身體極熱欲出不出隱伏皮內發
不透快者險也宜升麻葛根湯 二大寒加麻黃即出

麻未出時發熱喘促者險宜三拗湯 百五加煨過石膏茶

葉名五虎湯治之

麻未出時發熱面先青黑乃毒氣攻心者逆宜內托散 百五

六 消毒湯 百五以解之不然則必死

身體極熱隱伏不出或帶紫色不明或不突起與肉一平
或一二日就沒喘嗽下痢者逆速宜解表急則用麻黃湯
百五 以發之胡荽酒 四十 以擦之緩則用升麻葛根湯 二
八 加石膏黃芩以解之

麻疹正出時身猶大熱宜升麻葛根湯 二 加黃芩地骨皮

治之若以手摹之疹色白起手卽紅者血虛宜養榮湯 百五

九 主之

正出色紅者火盛宜化癰湯 百六 主之或人參白虎湯 七

六

色紫赤乾灰燥暗大渴飲水不止乃火盛毒熾宜六一散

二百解之或四物湯九去地黃加紅花黃芩進之或黃連

麥門冬湯百六亦可大熱不退加柴胡黃芩升麻葛根牛蒡

子元參

色紫黑乃內外熱甚而血結者逆必須急速解表宜麥冬

湯一百二五生地黃散百六升麻葛根湯二或荆防敗毒散五

加梔子仁或雙解散十有痰加杏仁無汗加麻黃若其色

變黑者宜黃連杏仁湯百六主之或山梔子湯百六化癰

湯百六速解治之緩則不及矣故曰初發赤白者生黑紫