

亥21
1-7

醫學叢書

產寶諸方一卷



產寶譜方



光緒四年秋日
葉濠波署檢



原序

按產後禁忌調護之法載諸古方固非一條要以作
勞爲大戒蓋百日之內筋脈未續血氣未充凡遷徙
次舍換易牀榻乘虛起行理髮盥面小則貽終身之
疾大則有不測之禍故遠者百日近者一月皆須極
加調護毋大喜怒毋縱笑語毋極思慮務令安靜以
養血氣正如新種之木根土未附一經動搖不復發
生必不得已而遷徙動作猶須旬日之外爲庶幾焉
世因有深山窮谷及田野之人飲食藥餌不繼甚至
汲水浣兒躬自襁褓此皆平日異稟少飲而善飯故



雖氣血少耗而根本自強然不可爲常也王卿月序
大率治病先論其所主男子調其氣女人調其血氣
血人之神也不可不謹調護然婦人以血爲基本氣
血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則
水火相刑月水如期謂之月信血凝成孕此乃調變
之常其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外
感風寒內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮
衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難
于子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽
致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃癥血涸不



流而搏結腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後爽期雖
通而或多或少或寡究病之源蓋本於此



欽定四庫全書

產寶諸方

提要

臣等謹按產寶諸方一卷不著撰人名氏
宋史藝文志不載惟陳振孫書錄解題有
之自明以來諸家書目亦罕有著錄者今
檢永樂大典所載尙得七十餘方又十二
月產圖一篇與振孫所記並合蓋卽宋時
之原本又別有序論一首王卿月序一首
皆殘缺當亦原書之佚簡也其方於保產



之法頗爲賅備而原第爲永樂大典所亂
已不可復考謹詳加釐訂以類分排首調
經養血次安胎次胎中諸病次催生次產
後次雜病仍爲一卷其中所引各方多爲
後人所承用如人參飲子一方與朱震亨
所製之達生散雖品味多寡不同而以大
腹皮爲君人參爲輔命意無異知震亨實
本此而增損之又如張元素以枳殼白朮
爲束胎丸後人以爲不宜於藜藿之軀易
以白朮黃芩相沿至今爲便產良藥而不

知亦本是書所載之枳殼湯又今時治產
後血風有所謂舉卿古拜者核其所用惟
荊芥一味卽此書之青金散蓋荊芥主治
風素問東方主風而肝屬于木平肝木卽
所以助肺金故以青金爲名後人竊用其
方而又翻切荊芥字音詭名以炫俗耳凡
此類皆可以證古今傳授之由惟所用多
降氣破血之品辛熱震動之劑則古人稟
厚可受攻伐有未可槩施於後來者此則
神而明之存乎其人矣乾隆五十年二月



恭校上

此藥膏可以治古今一切瘡毒之由生而用之
式而又難財難求者皆能治之茲引其
傳以與頑金姑以青金為治人藥其
藥素問東方主風而用風干木平風水負
風其一如明也膏之青金者其味在土而
舒血風膏用脂舉舉古者皆慈其用用藥
吸衣木是膏用薄之味藥也又今却命重

產寶諸方

產圖

口月吉方位

三月壬位安產吉

丙位藏衣吉

四月庚位安產吉

甲位藏衣吉

五月丙位安產吉

壬位藏衣吉

乾天德藏衣吉

六月甲位安產吉

庚位藏衣吉

七月壬位安產吉

丙位藏衣吉

八月庚位安產吉

甲位藏衣吉



艮天德藏衣吉

九月丙位安產吉

壬位藏衣吉

十月甲位安產吉

庚位藏衣吉

十一月壬位安產吉

丙位藏衣吉

巽天德藏衣吉

壬位藏衣吉

十二月庚位安產吉

甲位藏衣吉

溫經湯

治女人曾經小產成帶三十六病腹脹唇

口乾日晚發熱小腹急痛手足煩熱大腸不調時泄

痢經脈不勻久不懷妊方

吳茱萸

沸湯洗三次
焙乾秤三兩

當歸

川芎

人參

白芍藥

各二兩

麥門冬

三兩半去心焙乾

桂

去皮研末

阿膠

炒白

牡丹皮

去心

甘草

炙各一兩

半夏

沸湯洗七次切焙二兩半

右爲粗末每服二錢水一盞薑五片煎至七分去

滓空心溫服忌生冷滑物

八珍散

治脾弱血虛心怯多因盜汗無力進食養

氣益衛產前後可服

白朮

人參

蓮肉

去皮心

甘草

炙各一兩

白茯苓

烏藥



白扁豆

各二兩

熟地黄

一兩半

右爲細末每服二錢水一盞薑三片大棗一個煎

至七分空心服加黃耆八錢尤妙

油錢散 治婦人血風

五加皮

牡丹皮

芍藥

各半兩

當歸

羌活

各一兩

右爲末每服一錢水一盞銅錢一文蘸油入銚內

煎七分溫服

千金散

治婦人赤白帶下

百草霜

一兩

龍骨

一錢

白石脂

二錢

右爲末空心溫酒調二錢

振振丸 治婦人經虛蓄冷積聚成瘕成塊月候不

調時作諸疾因而凝滯半產不實以至絕產

生地黃汁一升

生艾汁一升銀石器內同熬成膏

牛膝末半兩酒浸

當歸末一兩

乾漆炒烟盡取末半兩

右三味爲末取一半入膏內再熬令稠入餘末和

擣丸如桐子大每服三十粒麝香溫酒下食前日

三服半月效

勝灸丹 子宮虛冷累月經年半生瘀血內泊

艾葉二兩

吳茱萸二兩揀淨

蒼朮二兩剉



陳皮二兩

右用醋三斤同浸一伏時鍋中慢火煮候爛卽入
白杵令勻如未爛時添醋以爛爲度丸如桐子太
空心溫酒飲下三十粒晚再服

羊肉地黃湯 補中益氣

生地黃三合切

桂心

當歸

甘草炙

川芎

人參

右㕮咀每服三錢用羊肉汁一盞煎至六分去滓
溫服空心下

治中丸 治脾胃寒濕飲食不消酸心嘔逆泄利腸

腹痛

白朮

人參

白茯苓

神麴

炒

麥蘖

肉桂

乾薑

炮

右等分爲末蜜丸梧桐子大三十九丸空心米湯下

前胡散

治脾虛心下有結氣不能服溫藥者宜服

此

半夏

湯洗七次切

陳皮

各六兩

白茯苓

前胡

枳殼

麩炒赤去瓢

甘草

炙各三兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至六分去滓熱服

